

IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive

Unité d'évaluation de programmes de prévention - UEPP

Résultats de l'enquête 2011 auprès des usagers des structures à bas-seuil en Suisse

*Stéphanie Locicero, Sophie Arnaud, Gabriel Füglistaler,
Françoise Dubois-Arber, Jean-Pierre Gervasoni*

Raisons de santé 199a – Lausanne 2012

Etude financée par : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Berne,
Contrat n° : 10.007502/204.0001/-810

Citation suggérée : Locicero S, Arnaud S, Füglistaler G, Gervasoni J-P, Dubois-Arber F, Résultats de l'enquête 2011 auprès des usagers des structures à bas seuil en Suisse. Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2012. . (Raisons de santé, 199a).

Remerciements : Nos remerciements vont aux collaborateurs des structures à bas seuil ayant participé à l'étude, les nombreuses personnes qui ont accepté de répondre au questionnaire.

Date d'édition : Juin 2012

Nom du dossier : M:\IMS\UEPP\COMMUN\Bas-seuil\Enquete 2011\Rapport 2011\RdS 199 a Bas-seuil

TABLE DES MATIERES

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Introduction..... | 5 |
| 1.1 | Méthode pour l'enquête clientèle | 5 |
| 1.2 | Contenu du document | 7 |
| 2 | Structures participantes par canton et caractéristiques des usagers ayant refusé de participer..... | 9 |
| 3 | Caractéristiques sociodémographiques des usagers..... | 11 |
| 4 | Consommation de substances | 13 |
| 4.1 | Consommation de substances au cours de la vie | 13 |
| 4.2 | Caractéristiques de consommation de substances au cours du dernier mois..... | 14 |
| 5 | Indicateurs de pratique d'injection | 17 |
| 6 | Indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH, du VHB et du VHC..... | 19 |
| 6.1 | Partage de seringues et de matériel..... | 19 |
| 6.2 | Activité sexuelle et comportement préventif | 21 |
| 7 | Indicateurs de l'état de santé..... | 23 |
| 8 | Incarcération en lien avec la drogue et consommation en prison..... | 29 |
| 9 | Annexe : Le questionnaire | 31 |
| 10 | Références bibliographiques..... | 45 |

1 INTRODUCTION

De 1987 à 2003, la Suisse a disposé d'un dispositif d'évaluation continu étendu qui comprenait une évaluation de certaines interventions, un monitoring de programmes et un monitoring des comportements dans plusieurs populations. Dès 2004, l'évaluation en continu a laissé la place à la poursuite du monitoring des comportements (et de certaines interventions), sous la forme d'un système de surveillance de deuxième génération correspondant aux exigences de la situation d'une épidémie de type concentré^a, telle que la connaît la Suisse^b. Ce système allie une composante biologique, représentée en Suisse par la surveillance du VIH/sida menée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les cantons, à une composante comportementale représentée par les diverses enquêtes répétées dans les populations d'importance pour le VIH/sida³.

Ce système a deux fonctions principales :

- Suivre l'évolution de la situation des nouveaux cas de VIH et anticiper, par la surveillance des comportements, l'évolution future ;
- Contribuer à orienter la politique de lutte contre le VIH en Suisse.

Depuis 1993, l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) a développé une étude nationale sur les centres à bas seuil (SBS) mettant à disposition du matériel d'injection stérile. Ces structures, apparues à la fin des années 80, visent la réduction des dommages liés à la consommation des drogues.

Ce rapport présente le volet comportemental du système de surveillance pour la population des usagers de drogues dans les structures à bas seuil d'accessibilité. Deux approches complémentaires ont été développées. La première consiste à recueillir de façon continue de l'information sur la distribution de matériel de prévention (monitoring des seringues/aiguilles et préservatifs) ¹. La deuxième (**enquête clientèle**), qui fait l'objet de ce rapport, s'intéresse aux comportements et caractéristiques de la clientèle fréquentant les structures à bas-seuil.

Dans le présent rapport, on entend par centre à bas seuil d'accès, toute structure caractérisée par une facilité d'accès pour les usagers de drogues, où l'anonymat est respecté, comportant un programme d'échange de seringues/aiguilles et possédant - ou pas- un local d'injection ou d'inhalation.

1.1 METHODE POUR L'ENQUETE CLIENTELE

L'enquête auprès de la clientèle des SBS a déjà été menée à cinq reprises (1993, 1994, 1996, 2000 et 2006) ²⁻⁷. Elle a été répétée durant l'été et l'automne 2011 (excepté pour le canton de Zurich où l'enquête s'est déroulée en décembre) avec la même méthodologie que lors des enquêtes précédentes.

Toute SBS remettant du matériel stérile d'injection aux consommateurs de drogues est en principe éligible pour l'enquête. Pour l'enquête 2011, ont été retenues les SBS qui déclaraient un nombre de seringues distribuées supérieur à 1500 par mois^c. Le nombre de structures incluses dans l'enquête a

^a Prévalence de moins de 1% dans la population générale (femmes enceintes) et de plus de 5% dans une ou plusieurs populations spécifiques (en Suisse HSH, UDI).

^b Ce système permet aussi de répondre aux exigences de suivi de la Déclaration des Nations Unies sur le VIH/sida (UNGASS).

^c Excepté pour le canton de Vaud où les structures sont suivies par ailleurs dans le cadre d'un mandat d'évaluation du dispositif cantonal de lutte contre la toxicomanie (en continue depuis 1996).

sensiblement augmenté au cours du temps. Leur nombre est ainsi passé de 13 en 1993 à 19 en 2011. Plus de la moitié des SBS impliquées sont pourvues de locaux d'injection.

La récolte de données a eu lieu dans chaque structure durant 5 jours consécutifs. Un à deux enquêteurs, formés pour la circonstance, proposaient à tout usager fréquentant la structure de participer à l'enquête en remplissant le questionnaire. Les intervenants travaillant dans les structures pouvaient parfois faciliter l'approche des usagers.

Le questionnaire utilisé a été adapté et complété au fil des vagues d'enquête. Les questions posées fournissent des indications sur :

- les caractéristiques sociodémographiques des usagers des SBS (sexe, âge, formation) ;
- l'insertion sociale (sources de revenu et logement) ;
- la consommation de substances au cours de la vie et au cours du dernier mois (produits consommés, durée de la consommation, mode principal de consommation, etc.) ;
- la pratique de l'injection (fréquence) et le partage du matériel servant à l'injection (aiguille, et autre matériel), y compris lors de séjours en prison ;
- l'activité sexuelle, l'exercice de la prostitution et l'usage de préservatifs ;
- l'état de santé (perçu) et le statut sérologique pour le VIH, le VHC et le VHB.

La première partie du questionnaire (caractéristiques sociodémographiques, consommations, pratique de l'injection) était entièrement administrée par l'enquêteur ; la seconde partie (partage du matériel, activité sexuelle, usage du préservatif et insertion sociale) était, en principe, remplie par le répondant (ou par l'enquêteur si le répondant en faisait la demande), et la dernière partie (sur l'état de santé) était uniquement remplie par le répondant (sans contrôle subséquent des réponses par l'enquêteur). Une fois le questionnaire rempli, l'enquêteur devait donner son appréciation quant à la fiabilité des indications relevées. Les questionnaires non-valides ont été par la suite exclus des analyses.

En 2011, les cantons ont pu proposer des questions supplémentaires. Celles-ci ont été, après discussion, insérées dans le questionnaire et leur analyse fait partie d'un chapitre à part, disponible uniquement pour chaque canton concerné.

En raison d'échantillons de relativement petites tailles au niveau de l'analyse par structures, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Pour la plupart des tendances commentées, nous n'avons pas effectué de tests statistiques. Lorsqu'un test statistique a été réalisé, principalement pour l'analyse des évolutions, cela a été mentionné dans le texte.

1.2 CONTENU DU DOCUMENT

Ce document présente les premiers résultats de l'enquête 2011 auprès de la clientèle des structures à bas-seuil. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux qui décrivent les valeurs pour chaque canton et dont la dernière colonne reprend systématiquement le résultat au niveau national, afin que chaque canton puisse se situer par rapport à la moyenne suisse. Un document exposant les tendances observées depuis 1993 sera disponible ultérieurement.

Les tableaux sont organisés de la manière suivante :

| | | |
|-------------------|---|----|
| Tableau 1 | Structures participantes par canton : type de structure et nombre de questionnaires valides remplis en 2011 | 9 |
| Tableau 2 | Fréquentation des SBS au cours du dernier mois en 2011 (en %)..... | 10 |
| Tableau 3 | Caractéristiques sociodémographiques des usagers ayant refusé de participer à l'enquête 2011..... | 10 |
| Tableau 4 | Caractéristiques sociodémographiques, clientèle des SBS en 2011 (en %)..... | 11 |
| Tableau 5 | Consommation de substances au cours de la vie (en %) et âge à la première consommation, clientèle des SBS en 2011..... | 13 |
| Tableau 6 | Caractéristiques de consommation au cours du dernier mois et proportion en traitement de substitution, clientèle des SBS en 2011 (en %)..... | 14 |
| Tableau 7 | Indicateurs de pratique d'injection, clientèle des SBS en 2011 (en %)..... | 17 |
| Tableau 8 | Indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : partage de seringues et de matériel, clientèle des SBS en 2011 (en %)..... | 20 |
| Tableau 9 | Indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : activité sexuelle et comportement préventif, clientèle des SBS en 2011 (en %) | 21 |
| Tableau 10 | Indicateurs de l'état de santé, clientèle des SBS en 2011 (en %) | 24 |
| Tableau 11 | Santé psychique et physique, clientèle des SBS 2011 (en %) | 26 |
| Tableau 12 | Maltraitance physique par un parent, par un partenaire, clientèle des SBS 2011 (en %) | 27 |
| Tableau 13 | Incarcération en relation avec la drogue et consommation en prison, clientèle des SBS, 2011 (en %)..... | 29 |

2 STRUCTURES PARTICIPANTES PAR CANTON ET CARACTERISTIQUES DES USAGERS AYANT REFUSE DE PARTICIPER

Dix neuf structures réparties dans huit cantons ont participé à l'enquête 2011 (**Tableau 1**). La plupart se trouvent en Suisse alémanique. Il n'y en a aucune dans la région italophone du pays. Douze d'entre elles possèdent un local d'injection. Environ trois personnes abordées sur cinq (59%) ont accepté de répondre au questionnaire ce qui représente au final 773 questionnaires valides.

Tableau 1 Structures participantes par canton : type de structure et nombre de questionnaires valides remplis en 2011

| Cantons | | Centres | N centres (avec local d'injection : LI) | N questionnaires | Taux de participation |
|---------------------------|----|--|---|------------------|-----------------------|
| BÂLE | BS | K&A I, II und III (Bâle) | 3 LI | 128 | 59 % |
| BERNE | BE | Kontakt und Anlaufstelle (Berne) ; Cactus (Bienne) | 2 LI | 138 | 63 % |
| GENÈVE | GE | BIPS (bus) + Quai 9 (Genève) | 1 + 1 LI | 66 | 66 % |
| LUCERNE | LU | Kontakt und Anlaufstelle (Lucerne) | 1 LI | 53 | 43 % |
| ST-GALL | SG | « Blauer Engel » / Katharinenhof (St-Gall) | 1 | 35 | 53 % |
| SOLEURE | SO | K&A Perspektive (Soleure) | 1 LI | 47 | 70 % |
| VAUD | VD | Passage + Distribus (Lausanne) ; Entrée de Secours (Morges) ; Action Communautaire et Toxicomanie (Vevey) ; Zone Bleue (Yverdon) | 5 | 148 | 62 % |
| ZÜRICH | ZH | K&A Kaserne K&A Selnau K&A Oerlikon K&A Brunau | 4 LI | 158 | 47% |
| Total = 19 centres | | | | 773 | 59% |

Environ deux répondants sur cinq (36.4%) ont fréquenté les structures 1 à 4 fois par semaine et un tiers y est allé tous les jours (34.0%) (**Tableau 2**).

Tableau 2 Fréquentation des SBS au cours du dernier mois en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Tous les jours | 39.8 | 39.9 | 25.8 | 41.5 | 34.3 | 27.7 | 30.4 | 30.4 | 34.0 |
| 1-4 fois par semaine | 33.6 | 31.2 | 40.9 | 35.8 | 25.7 | 40.4 | 38.5 | 40.5 | 36.4 |
| 1-3 fois en tout | 26.6 | 26.1 | 31.8 | 18.9 | 31.4 | 25.5 | 28.4 | 27.3 | 27.2 |
| Non réponses | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 3.8 | 8.6 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 2.5 |

Sur les 1320 personnes abordées dans les SBS, 547 ont refusé de participer à l'enquête soit un taux de participation précédemment mentionné de 59%. Ce taux est inférieur aux années précédentes^d, certains usagers ont évoqué une certaine lassitude concernant les nombreuses enquêtes auxquelles ils sont soumis. Les refus proviennent majoritairement de personnes d'origine masculine (76.4%) et âgées de plus de 30 ans (72.8%). 7% des personnes n'ont pas pu être interrogés pour des raisons de compréhension linguistique (**Tableau 3**).

Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques des usagers ayant refusé de participer à l'enquête 2011

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 92 | 82 | 33 | 69 | 32 | 20 | 91 | 128 | 547 |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Femmes | 78.3 | 73.2 | 87.9 | 85.5 | 71.9 | 80.0 | 70.3 | 74.2 | 76.4 |
| Hommes | 20.7 | 26.8 | 12.1 | 14.5 | 28.1 | 20.0 | 29.7 | 24.2 | 23.0 |
| Non réponses | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 |
| Classes d'âge approximatif | | | | | | | | | |
| < 20 ans | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 20 à 29 ans | 26.1 | 34.1 | 30.3 | 17.4 | 31.2 | 15.0 | 30.8 | 13.3 | 24.1 |
| 30 à 40 ans | 35.9 | 19.5 | 39.4 | 24.6 | 12.5 | 40.0 | 47.3 | 36.7 | 33.1 |
| > 40 ans | 33.7 | 43.9 | 21.2 | 55.1 | 50.0 | 45.0 | 19.8 | 48.4 | 39.7 |
| Non réponses | 3.3 | 2.4 | 6.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
| Raison du refus d'interview | | | | | | | | | |
| Refus de répondre au questionnaire | 85.9 | 82.9 | 75.8 | 92.8 | 100 | 95.0 | 91.2 | 78.9 | 86.1 |
| Interruption en cours d'interview | 3.3 | 13.4 | 24.2 | 2.9 | 0.0 | 5.0 | 2.2 | 9.4 | 7.1 |
| Ne comprend pas le français/l'allemand | 10.9 | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 11.7 | 6.8 |

^d 1994 : 76% ; 1996 : 81% ; 2000 : 69% ; 2006 : 66%.

3 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES USAGERS

Le tableau 4 présente les caractéristiques sociodémographiques des répondants à l'enquête SBS 2011.

La très grande majorité des personnes interrogées est de sexe masculin (78.9%). Elles ont en moyenne 38.9 ans et les deux tiers ont 35 ans et plus (67.5%). Les cantons de Berne, Genève et Lucerne ont la proportion la plus importante des moins de 25 ans. L'âge médian des usagers est passé de 26 ans en 1993 à 40 ans en 2011^e.

Quasiment les trois quart des usagers sont de nationalité suisse (72.8%), mais il faut noter la situation particulière du canton de Genève où trois personnes sur cinq accueillies par les structures sont de nationalité étrangère (60.6%).

Concernant l'état civil, l'immense majorité des répondants est célibataire, séparée ou divorcée (88.2%). Le tiers des interviewés a un ou des enfants (34.7%).

Quatre répondants sur sept ont fait un apprentissage ou une école professionnelle (57.7%) et le quart s'est arrêté à l'école obligatoire (24.2%).

La grande majorité des répondants (78.9%) a principalement habité dans un domicile fixe privé au cours du dernier mois. Mais plus de 10% des usagers sont sans domicile fixe dans les cantons de Genève (16.7%), Lucerne (11.3%) et Vaud (16.2%).

La source principale de revenu au cours du dernier mois est, par ordre d'importance, l'aide sociale (44.4%), les assurances (AI, chômage, AVS : 34.5%) et la famille (22.1%).

Tableau 4 Caractéristiques sociodémographiques, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | CH |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Sexe* | | | | | | | | | |
| Femmes | 25.0 | 21.7 | 21.2 | 24.5 | 11.4 | 14.9 | 18.2 | 21.5 | 20.8 |
| Hommes | 75.0 | 77.5 | 78.8 | 73.6 | 88.6 | 85.1 | 81.8 | 78.5 | 78.9 |
| Age | | | | | | | | | |
| Tous les répondants | | | | | | | | | |
| Age moyen | 40.3 | 37.2 | 34.1 | 39.2 | 41.6 | 41.0 | 36.6 | 42.4 | 38.9 |
| Age médian | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 37.5 | 43.0 | 39.0 |
| Age min-max | 21-61 | 18-59 | 18-51 | 18-67 | 24-63 | 24-56 | 19-59 | 20-62 | 18-67 |
| Classe d'âge* | | | | | | | | | |
| <25 ans | 6.3 | 12.3 | 13.6 | 11.3 | 2.9 | 2.1 | 6.8 | 3.2 | 7.4 |
| 25-34 ans | 18.0 | 27.5 | 37.9 | 24.5 | 14.3 | 21.3 | 33.8 | 16.5 | 24.6 |
| 35 ans et plus | 75.0 | 60.1 | 48.5 | 64.2 | 82.9 | 76.6 | 59.5 | 78.5 | 67.5 |
| Nationalité^a | | | | | | | | | |
| Suisse | 83.6 | 76.1 | 39.4 | 86.8 | 68.6 | 83.0 | 66.9 | 74.1 | 72.8 |
| Etrangère | 16.4 | 23.9 | 60.6 | 13.2 | 31.4 | 17.0 | 33.1 | 25.9 | 27.2 |

^e Tendances statistiquement significatives (Test de Kruskal-Wallis, p<0.01)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Etat civil * | | | | | | | | | |
| Célibataire | 70.3 | 62.3 | 75.8 | 75.5 | 51.4 | 55.3 | 68.2 | 57.6 | 64.9 |
| Marié, pacsé | 6.3 | 15.9 | 12.1 | 1.9 | 14.3 | 12.8 | 4.7 | 10.8 | 9.6 |
| Séparé, divorcé | 21.1 | 17.4 | 12.1 | 22.7 | 34.3 | 31.9 | 25.0 | 28.5 | 23.3 |
| Veuf | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
| Dernière formation/école terminée | | | | | | | | | |
| Aucune | 4.7 | 2.2 | 9.1 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | 6.1 | 3.2 | 4.1 |
| Scolarité obligatoire | 18.0 | 23.9 | 24.2 | 28.3 | 20.0 | 19.1 | 32.4 | 22.8 | 24.2 |
| Apprentissage, école professionnelle | 62.5 | 60.9 | 51.5 | 62.3 | 71.4 | 66.0 | 48.0 | 55.7 | 57.7 |
| Maturité | 4.7 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 2.1 | 5.4 | 5.1 | 4.0 |
| Ecole professionnelle supérieure, Université | 8.6 | 8.0 | 12.1 | 3.8 | 5.7 | 8.5 | 6.8 | 12.0 | 8.7 |
| Non réponses | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Lieu d'habitation principal dernier mois | | | | | | | | | |
| Domicile fixe privé | 77.3 | 81.9 | 69.7 | 81.1 | 88.6 | 89.4 | 70.3 | 83.5 | 78.9 |
| Sans domicile fixe | 8.6 | 6.5 | 16.7 | 11.3 | 2.9 | 6.4 | 16.2 | 4.4 | 9.3 |
| En institution | 5.5 | 4.3 | 3.0 | 7.5 | 5.7 | 2.1 | 2.0 | 5.7 | 4.4 |
| En prison | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| Autre lieu | 3.9 | 4.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.1 | 4.4 | 5.0 |
| Non réponses | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| A des enfants | 40.6 | 34.1 | 37.9 | 30.2 | 34.3 | 38.3 | 33.8 | 30.4 | 34.7 |
| Source de revenu dernier mois ^b | | | | | | | | | |
| Travail à temps plein | 18.0 | 21.0 | 7.6 | 9.4 | 0.0 | 21.3 | 12.2 | 17.1 | 15.1 |
| Travail à temps partiel (régulier) | 15.6 | 13.0 | 16.7 | 15.1 | 20.0 | 27.7 | 10.1 | 20.3 | 16.0 |
| Intérim, travail temporaire (irrégulier) | 11.7 | 13.0 | 21.2 | 17.0 | 11.4 | 10.6 | 2.0 | 22.8 | 13.5 |
| Assurances (AI, chômage, AVS) | 37.5 | 24.6 | 34.8 | 47.2 | 68.8 | 29.8 | 25.0 | 39.2 | 34.5 |
| Aide sociale (assistance publique) | 35.2 | 57.2 | 39.4 | 34.0 | 22.9 | 48.9 | 51.4 | 43.0 | 44.4 |
| Famille, amis, compagnon | 25.0 | 20.3 | 39.4 | 26.4 | 22.9 | 14.9 | 18.9 | 17.7 | 22.1 |
| Fait la manche | 7.8 | 7.2 | 25.8 | 7.5 | 5.7 | 4.3 | 17.6 | 7.6 | 10.7 |
| Prostitution | 3.9 | 5.8 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.7 | 3.9 |
| Revenus illégaux y compris deal | 20.3 | 21.7 | 24.2 | 17.0 | 14.3 | 8.5 | 19.6 | 12.0 | 17.9 |

Base : tous les répondants

* : Les non-réponses ne sont pas présentées.

^a Les doubles nationalités 'suisse-autre' sont comptabilisées dans la nationalité 'suisse'.

^b Plusieurs réponses possibles.

4 CONSOMMATION DE SUBSTANCES

4.1 CONSOMMATION DE SUBSTANCES AU COURS DE LA VIE

Le tableau 5 présente le type de substances consommées au cours de la vie, ainsi que l'âge moyen des répondants lors de leur première consommation.

Quasiment la totalité des répondants a consommé, au moins une fois au cours de la vie, de l'héroïne (97.0%), de la cocaïne (95.9%) ou du cannabis (94.3%). En général, le cannabis et l'alcool sont les premières substances à avoir été consommées puisque les répondants avaient en moyenne 14 ans la première fois, contre respectivement 18.4 ans et 17.3 ans pour l'héroïne et la cocaïne. Les répondants Saint-Gallois sont les plus jeunes en termes d'âge moyen à la première consommation pour une majorité de substances.

Tableau 5 Consommation de substances au cours de la vie (en %) et âge à la première consommation, clientèle des SBS en 2011

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Héroïne | 98.4 | 99.3 | 98.5 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 92.6 | 96.2 | 97.0 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 18.7 | 19.4 | 17.9 | 19.5 | 13.0 | 17.4 | 18.4 | 19.0 | 18.4 |
| Cocaïne | 100.0 | 96.4 | 90.9 | 96.2 | 94.3 | 91.5 | 97.3 | 94.3 | 95.9 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 18.2 | 16.6 | 17.9 | 18.8 | 14.8 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 17.3 |
| Crack, free-base | 42.2 | 40.6 | 48.5 | 66.0 | 45.7 | 59.6 | 62.8 | 48.7 | 50.6 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 23.8 | 19.2 | 22.3 | 21.0 | 17.8 | 22.6 | 21.0 | 27.6 | 22.4 |
| Cocktail, Speedball (mélange héroïne+ cocaïne) | 85.9 | 66.7 | 54.5 | 85.5 | 71.4 | 66.0 | 67.6 | 61.4 | 67.5 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 22.2 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 15.3 | 21.4 | 19.7 | 24.0 | 21.2 |
| Benzodiazépines prescrites ou non | 80.5 | 68.8 | 72.7 | 73.6 | 85.7 | 91.5 | 75.0 | 63.9 | 73.7 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 24.5 | 22.0 | 25.8 | 19.3 | 19.3 | 23.6 | 20.2 | 25.1 | 22.9 |
| Méthadone (au noir, non prescrite) | 58.6 | 46.4 | 74.2 | 37.7 | 25.7 | 51.1 | 51.4 | 34.2 | 48.0 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 24.8 | 22.3 | 24.1 | 21.8 | 15.3 | 24.0 | 22.8 | 26.9 | 23.7 |
| Amphétamines et /ou ecstasy | 68.0 | 57.2 | 72.7 | 54.7 | 57.1 | 66.0 | 75.7 | 53.8 | 63.5 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 20.0 | 16.6 | 18.5 | 18.5 | 17.0 | 18.8 | 18.7 | 21.1 | 19.0 |
| Cannabis | 98.4 | 90.6 | 95.5 | 94.3 | 91.4 | 95.7 | 98.0 | 90.5 | 94.3 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 14.0 | 13.1 | 14.5 | 15.0 | 12.3 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.0 |
| Alcool | 90.6 | 87.0 | 83.3 | 92.5 | 94.3 | 95.7 | 91.2 | 92.4 | 90.4 |
| Age moyen 1 ^{ère} consommation | 13.1 | 13.9 | 13.4 | 13.5 | 13.0 | 14.1 | 13.9 | 12.8 | 13.5 |

Base : tous les répondants.

Age : en années.

4.2 CARACTERISTIQUES DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES AU COURS DU DERNIER MOIS

Le tableau 6 présente les caractéristiques de consommation des répondants au cours du dernier mois ainsi que le type de traitement de substitution suivi par les consommateurs d'héroïne en traitement.

Au cours du dernier mois, la moitié des répondants a consommé à la fois de l'héroïne et de la cocaïne (50.1%). Une personne sur sept n'a consommé ni héroïne ni cocaïne (14.2%). Les cantons de Saint-Gall et Vaud ont la proportion la plus importante d'usagers n'ayant consommé aucune de ces deux substances, mais on remarque également qu'ils ont la proportion la plus importante d'usagers en traitement à la méthadone. Cela tend à montrer que de nombreux usagers fréquentent les SBS de ces cantons alors qu'ils ne sont plus consommateurs, probablement à la recherche de contacts sociaux.

Les trois quart des répondants ont consommé de l'héroïne (76.5%) et trois sur cinq de la cocaïne (59.3%) au cours du dernier mois. Le canton de Saint-Gall se distingue des autres cantons par sa consommation de substances très en-dessous de la moyenne suisse excepté pour les benzodiazépines, le cannabis et l'alcool. Le canton de Bâle est très au-dessus de la moyenne suisse concernant la consommation de cocktail, avec près de la moitié des répondants concernés (47.7%). De même, le canton de Genève est très au-dessus de la moyenne nationale concernant la consommation de méthadone non prescrite, avec deux répondants sur cinq concernés (42.4%). Près d'un répondant sur cinq (18.8%) a consommé du crack au cours du dernier mois.

L'héroïne est la substance la plus consommée de manière régulière (48.6%). Les usagers sont un tiers à consommer plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour de la cocaïne (30.0%). Le canton de Vaud se démarque par une consommation régulière bien en-dessous de la moyenne nationale quelle que soit la substance (héroïne, cocaïne, crack ou cocktail). Le mode de consommation principal est le sniff pour l'héroïne (sauf sur le canton de Vaud où l'injection est largement préférée) et l'injection pour la cocaïne.

Parmi les consommateurs d'héroïne au cours de la vie, le traitement de substitution principal est la méthadone par voie orale. Trois répondants sur cinq environ y ont recours (56.1%).

Tableau 6 Caractéristiques de consommation au cours du dernier mois et proportion en traitement de substitution, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | CH |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Consommation au cours du dernier mois^a | | | | | | | | | |
| Pas d'héroïne ni de cocaïne | 7.0 | 5.8 | 10.6 | 16.9 | 40.0 | 12.8 | 31.1 | 7.0 | 14.2 |
| Seulement de l'héroïne | 22.7 | 29.7 | 28.8 | 32.1 | 40.0 | 51.1 | 18.9 | 20.3 | 26.4 |
| Seulement de la cocaïne | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 2.9 | 4.3 | 10.8 | 16.5 | 9.2 |
| Héroïne et cocaïne | 62.5 | 58.0 | 54.5 | 45.3 | 17.1 | 31.9 | 38.5 | 56.3 | 50.1 |
| Héroïne | 85.1 | 87.7 | 83.3 | 77.3 | 57.1 | 83.0 | 57.5 | 76.5 | 76.5 |
| Cocaïne | 70.3 | 64.4 | 60.6 | 51.0 | 20.0 | 36.1 | 49.4 | 72.8 | 59.3 |
| Crack, free-base | 20.2 | 19.5 | 18.1 | 28.3 | 2.9 | 14.9 | 13.5 | 23.5 | 18.8 |
| Cocktail, Speedball (mélange héroïne+ cocaïne) | 47.7 | 38.4 | 13.6 | 22.7 | 2.9 | 12.8 | 19.0 | 34.8 | 29.0 |
| Benzodiazépines prescrites ou non | 55.5 | 53.5 | 45.5 | 51.0 | 57.2 | 65.9 | 52.1 | 43.0 | 51.6 |

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Consommation au cours du dernier mois^a | | | | | | | | | |
| Méthadone (au noir, non prescrite) | 30.5 | 19.5 | 42.4 | 11.4 | 0.0 | 12.7 | 13.5 | 10.8 | 18.5 |
| Amphétamines et /ou ecstasy | 14.9 | 17.4 | 13.6 | 7.5 | 0.0 | 10.6 | 12.2 | 3.8 | 11.0 |
| Cannabis | 68.0 | 65.1 | 62.2 | 47.3 | 60.0 | 74.4 | 70.9 | 46.2 | 61.7 |
| Alcool | 60.1 | 70.3 | 57.6 | 64.2 | 77.1 | 80.8 | 70.3 | 55.7 | 65.1 |
| Consommation régulière^b | | | | | | | | | |
| Héroïne | 57.0 | 67.4 | 54.5 | 54.7 | 48.6 | 59.6 | 25.7 | 39.2 | 48.6 |
| Cocaïne | 42.2 | 37.0 | 19.7 | 22.6 | 2.9 | 10.6 | 20.3 | 41.8 | 30.0 |
| Crack, free-base | 9.4 | 9.4 | 4.5 | 11.3 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 7.6 | 6.7 |
| Cocktail, Speedball (mélange héroïne+ cocaïne) | 21.1 | 14.5 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 6.4 | 4.1 | 19.0 | 11.8 |
| Mode de consommation principal^c | | | | | | | | | |
| Héroïne : injection | 30.1 | 26.9 | 33.3 | 27.6 | 17.6 | 7.1 | 52.6 | 22.6 | 28.2 |
| inhalation | 12.3 | 37.6 | 47.2 | 44.8 | 23.5 | 35.7 | 18.4 | 37.1 | 31.4 |
| sniff | 56.2 | 31.2 | 19.4 | 27.6 | 58.8 | 53.6 | 26.3 | 37.1 | 38.0 |
| Cocaïne : injection | 33.3 | 45.1 | 38.5 | 33.3 | 100 | 60.0 | 76.7 | 48.5 | 47.0 |
| inhalation | 33.3 | 29.4 | 15.4 | 66.7 | 0.0 | 40.0 | 3.3 | 21.2 | 25.9 |
| sniff | 31.5 | 19.6 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 27.3 | 23.7 |
| Traitement de substitution^d | | | | | | | | | |
| Méthadone par voie orale | 54.8 | 42.3 | 63.1 | 39.2 | 80.0 | 44.7 | 67.2 | 60.5 | 56.1 |
| Buprénorphine par voie orale | 3.2 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | 7.9 | 5.1 |
| Héroïne sous prescription médicale (i.v) | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.6 | 3.2 |
| Morphine par voie orale | 7.1 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 5.9 | 3.2 |

^a Base : tous les répondants.

^b Consommation régulière = plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour. Base : tous les répondants.

^c Parmi les répondants ayant consommé régulièrement ces substances au cours du dernier mois.

^d Parmi les répondants ayant consommé de l'héroïne au cours de leur vie (inclus les répondants qui ne sont pas en traitement actuellement mais qui l'ont été au cours de leur vie).

5 INDICATEURS DE PRATIQUE D'INJECTION

Le tableau 7 présente les indicateurs de pratique d'injection de la clientèle des SBS en 2011.

Un peu plus des deux tiers des personnes interrogées se sont injecté des drogues au cours de leur vie (70.2%). Elles sont deux sur cinq à l'avoir également fait au cours du dernier mois (36.9%). Le nombre moyen d'années de pratique de l'injection est de 17.1 ans, et les répondants avaient en moyenne 22.4 ans au moment de leur première injection.

En 2011, un répondant sur quatorze est un nouvel injecteur (7.3%), c'est à dire qu'il a commencé à s'injecter des drogues au cours des deux dernières années. C'est dans le canton de Genève que l'on observe la proportion la plus importante de nouveaux injecteurs (16.3%). Le lieu d'injection le plus courant reste le domicile de la personne (50.2%), suivi du local d'injection (40.7%). Le canton de Vaud a la plus importante proportion de consommateurs s'injectant dans les lieux publics (15.1% vs. 6.7% au niveau Suisse). Ceci est probablement dû en partie au fait qu'il n'y a pas de local d'injection dans les structures de ce canton.

Quatre injecteurs sur cinq se procurent les seringues neuves au sein des structures ou lors de programmes de distribution (76.8%). Notons que les vaudois sont une forte proportion à se procurer des seringues en pharmacie (32.1%). Le canton de Bâle a la proportion la plus importante de consommateurs se procurant des seringues neuves dans la rue ou auprès d'autres consommateurs (17.0% vs. 3.5% au niveau Suisse).

En moyenne, les répondants ont réalisé 15.8 injections lors de la semaine précédant l'enquête^f.

Tableau 7 Indicateurs de pratique d'injection, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Injection de drogue^a | | | | | | | | | |
| Au cours de la vie | 71.9 | 71.0 | 68.2 | 75.5 | 85.7 | 76.6 | 63.5 | 68.4 | 70.2 |
| Au cours du dernier mois | 36.7 | 46.4 | 48.5 | 28.3 | 14.3 | 19.1 | 35.8 | 38.0 | 36.9 |
| Années de pratique d'injection^b | | | | | | | | | |
| Moyenne | 18.5 | 15.4 | 11.1 | 17.8 | 19.4 | 19.4 | 15.4 | 19.7 | 17.1 |
| Médiane | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 |
| Age moyen à la 1 ^{ère} injection | 22.9 | 22.2 | 23.7 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 22.3 | 22.4 |
| Nouveaux injecteurs^c | 3.3 | 12.5 | 16.3 | 5.0 | 0.0 | 2.9 | 8.9 | 5.8 | 7.3 |
| Lieu d'injection le plus fréquent^d | | | | | | | | | |
| Domicile, endroit privé | 44.7 | 31.3 | 65.6 | 26.7 | 100.0 | 33.3 | 75.5 | 48.3 | 50.2 |
| Lieu public, dehors | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 0.0 | 11.1 | 15.1 | 1.7 | 6.7 |
| Local public | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 1.8 |
| Local d'injection | 48.9 | 60.9 | 25.0 | 66.7 | 0.0 | 55.6 | 1.9 | 50.0 | 40.7 |

^f Il se peut que ce chiffre soit légèrement surestimé car certaines personnes ont répondu avoir eu 150 injections en une semaine, chiffre qui paraît peu probable.

| | Cantons | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | CH |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Lieu d'acquisition des seringues neuves (le plus souvent)^d | | | | | | | | | |
| Structures, prog. de distribution | 72.3 | 84.4 | 78.1 | 73.3 | 80.0 | 77.8 | 67.9 | 80.0 | 76.8 |
| Automate, distributeur | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 5.6 |
| Pharmacies | 8.5 | 1.6 | 18.8 | 6.7 | 0.0 | 11.1 | 32.1 | 6.7 | 11.9 |
| Rue, auprès de consommateurs | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Non réponses | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Nombre d'injections dernière semaine^d | | | | | | | | | |
| Moyenne | 20.8 | 12.4 | 15.1 | 19.0 | 26.6 | 9.7 | 13.9 | 16.8 | 15.8 |
| Médiane | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| Min-max | 0-150 | 0-100 | 0-70 | 0-100 | 2-56 | 1-30 | 0-70 | 0-100 | 0-150 |

^a Base : tous les répondants.

^b Base : parmi les répondants ayant consommé par injection au moins une fois dans leur vie. Note : années de pratique d'injection = Age du répondant - âge de première injection. Les répondants injecteurs au cours de leur vie, mais qui ont arrêté, sont donc comptabilisés. Il se peut alors que la moyenne (et médiane) soit un peu surévaluée par rapport à la valeur réelle du nombre d'années d'injection.

^c Pourcentage de répondants ayant commencé à s'injecter des drogues au cours des 2 dernières années. Base : injecteurs au cours de la vie.

^d Base : parmi les répondants ayant consommé par injection au cours du dernier mois (1 seule réponse possible).

6 INDICATEURS D'EXPOSITION AU RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH, DU VHB ET DU VHC

6.1 PARTAGE DE SERINGUES ET DE MATERIEL

Le tableau 8 présente les indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et de l'hépatite C pour les usagers des SBS ayant déjà consommé des substances par injection au cours de leur vie ou au cours du dernier mois.

Deux consommateurs sur cinq se sont déjà injectés, au cours de leur vie, avec une seringue utilisée par une autre personne (39.4%). Ce nombre chute à une personne sur vingt concernant le dernier mois (4.9%). La tendance observée depuis 1993 est stable pour ces deux variables au niveau national^g.

Moins d'un injecteur sur vingt a également donné, au cours du derniers mois, une seringue à une autre personne après l'avoir utilisée (4.6%).^h

Au cours du mois précédant l'enquête, environ un quart des répondants a utilisé des cuillères usagées (22.8%) et la même proportion a utilisé du matériel d'inhalation ou de sniff usagé (26.4%). Seule l'utilisation d'un filtre usagé montre une tendance à la baisse depuis 2006 (17.3% vs. 10.2% en 2011).

Trois répondants sur cinq ont le plus souvent pratiqué l'injection seul au cours du dernier mois (57.9%).

^g 1993 : 39.1% ; 1994 : 37.1% ; 1996 : 43.3% ; 2000 : 44.6% ; 2006 : 42.7% (pas de différences significatives observées, $p=0.062$).

^h Nombre de personnes concernées : BE : N=2 ; GE : N=5 ; SG : N=1 ; SO : N=1 ; VD : N=4.

Tableau 8 Indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : partage de seringues et de matériel, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | CH |
| Effectif : | | | | | | | | | |
| injecteurs au cours de la vie | 92 | 98 | 45 | 40 | 30 | 36 | 94 | 108 | 543 |
| Utilisation d'une seringue usagée | | | | | | | | | |
| Au cours de la vie ^a | 34.8 | 36.7 | 42.2 | 40.0 | 33.3 | 36.1 | 48.9 | 38.9 | 39.4 |
| Au cours du dernier mois ^b | 2.1 | 10.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 4.9 |
| Don d'une seringue à quelqu'un d'autre après l'avoir utilisée au cours du dernier mois ^b | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 0.0 | 20.0 | 11.1 | 7.5 | 0.0 | 4.6 |
| Utilisation de matériel d'injection usagé au cours du dernier mois ^b | | | | | | | | | |
| Cuillère | 17.0 | 28.1 | 28.1 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 22.6 | 21.7 | 22.8 |
| Filtre | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 8.3 | 10.2 |
| Coton pour désinfecter | 2.1 | 3.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 3.2 |
| Eau de javel pour laver le matériel ou préparer le produit | 12.8 | 12.5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 8.3 | 10.5 |
| Utilisation de matériel d'inhalation et/ou sniff usagé au cours du dernier mois ^c | | | | | | | | | |
| N | 29 | 33 | 14 | 12 | 9 | 6 | 18 | 30 | 151 |
| % | 26.9 | 29.7 | 31.1 | 30.0 | 33.3 | 14.6 | 21.2 | 25.9 | 26.4 |
| Injection seul(e) ou à plusieurs au cours du dernier mois (le plus souvent) ^b | | | | | | | | | |
| Seul(e) | 44.7 | 53.1 | 53.1 | 60.0 | 40.0 | 77.8 | 58.5 | 73.3 | 57.9 |
| A plusieurs | 29.8 | 29.7 | 21.9 | 33.3 | 20.0 | 22.2 | 18.9 | 23.3 | 25.3 |
| Les deux | 25.5 | 17.2 | 25.0 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 22.6 | 3.3 | 16.8 |

^a Base : répondants injecteurs au cours de la vie. Note : Q22 : « Vous êtes-vous déjà, au cours de votre vie, injecté avec une seringue/aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre ? »

^b Base : répondants injecteurs au cours du dernier mois.

^c Base : répondants ayant inhalé ou sniffé des drogues au cours du dernier mois.

6.2 ACTIVITE SEXUELLE ET COMPORTEMENT PREVENTIF

Le tableau 9 présente les indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et de l'hépatite C du point de vue de l'activité sexuelle et des comportements préventifs.

Un peu moins de la moitié des répondants a eu des relations sexuelles avec un partenaire stable au cours des 6 derniers mois (47.1%). Ils sont plus des deux tiers à ne pas avoir utilisé systématiquement le préservatif avec ce type de partenaire (69.2%). Pour un quart des usagers, le partenaire stable consomme ou a consommé des drogues par injection (23.9%).

Un tiers des répondants a eu des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel au cours des 6 derniers mois (31.0%). Trois sur cinq ont systématiquement utilisé le préservatif avec ce type de partenaire (58.8%).

Les usagers ont eu, en moyenne, 3.3 partenaires sexuels au cours des douze derniers mois. Environ un répondant sur cinq n'a eu aucun partenaire (19.7%) et moins d'un répondant sur dix a eu plus de six partenaires au cours de la même période (9.3%). Quasiment un usager sur deux n'a pas utilisé de préservatif lors du dernier rapport sexuel, le type de partenaire n'étant pas connu.

Environ un usager sur six s'est prostitué au cours de la vie (16.0%), 2.5% des usagers hommes se sont prostitués contre 13.7% des usagers femmes au cours des six derniers mois. Un peu plus du tiers des personnes qui se sont prostituées n'a pas utilisé systématiquement le préservatif avec leurs clients (36.3%).

Tableau 9 Indicateurs d'exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : activité sexuelle et comportement préventif, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Partenaire stable | | | | | | | | | |
| Relations sexuelles avec part. stable, 6 derniers mois | 43.8 | 50.7 | 56.1 | 49.1 | 31.4 | 42.6 | 50.7 | 43.7 | 47.1 |
| Utilisation du préservatif ^a | | | | | | | | | |
| Parfois/jamais | 73.2 | 70.0 | 73.0 | 76.9 | 54.5 | 80.0 | 72.0 | 56.5 | 69.2 |
| Toujours | 25.0 | 28.6 | 27.0 | 19.2 | 45.5 | 20.0 | 25.3 | 36.2 | 28.0 |
| Non réponses | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0 | 2.7 | 7.3 | 2.8 |
| Le partenaire stable consomme ou a consommé des drogues par injection ^a | 19.6 | 20.0 | 43.2 | 23.1 | 45.5 | 10.0 | 29.3 | 15.9 | 23.9 |
| Partenaire(s) occasionnel(s) | | | | | | | | | |
| Relations sexuelles avec part. occasionnel, 6 derniers mois | 30.5 | 33.3 | 34.8 | 22.6 | 28.6 | 38.3 | 36.5 | 24.1 | 31.0 |
| Utilisation du préservatif ^b | | | | | | | | | |
| Parfois/jamais | 43.6 | 32.6 | 43.5 | 33.3 | 30.0 | 44.5 | 42.6 | 34.2 | 38.8 |
| Toujours | 51.3 | 63.0 | 52.2 | 66.7 | 70.0 | 55.6 | 57.4 | 63.2 | 58.8 |
| Non réponses | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.5 |
| Nombre de partenaires sexuels, 12 derniers mois | | | | | | | | | |
| Moyenne | 2.0 | 4.5 | 4.7 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 2.8 | 3.3 |
| Médiane | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Aucun | 22.7 | 15.9 | 18.2 | 22.6 | 34.3 | 14.9 | 12.8 | 24.7 | 19.7 |
| 1 part. | 31.3 | 27.5 | 30.3 | 32.1 | 28.6 | 38.3 | 34.5 | 32.3 | 31.7 |
| 2 à 5 part. | 28.1 | 33.3 | 24.2 | 28.3 | 25.7 | 31.9 | 32.4 | 24.1 | 28.8 |
| ≥ 6 part. | 4.7 | 11.6 | 13.6 | 5.7 | 8.6 | 6.4 | 13.5 | 7.6 | 9.3 |
| Non réponses | 13.3 | 11.6 | 13.6 | 11.3 | 2.9 | 8.5 | 6.8 | 11.4 | 10.5 |
| Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel | | | | | | | | | |
| Non | 48.4 | 42.0 | 53.0 | 43.4 | 37.1 | 48.9 | 49.3 | 39.2 | 45.1 |
| Oui | 42.2 | 51.4 | 39.4 | 43.4 | 60.0 | 44.7 | 47.3 | 52.5 | 47.7 |
| Non réponses | 9.4 | 6.5 | 7.6 | 13.2 | 2.9 | 6.4 | 3.4 | 8.2 | 7.1 |
| Prostitution | | | | | | | | | |
| Au cours de la vie | 15.6 | 14.5 | 12.1 | 22.6 | 20.0 | 6.4 | 13.2 | 21.5 | 16.0 |
| Au cours des 6 derniers mois | | | | | | | | | |
| Hommes | 1.0 | 3.7 | 1.9 | 5.1 | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Femmes | 18.8 | 20.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.8 | 13.7 |
| Utilisation de préservatifs avec les client(e)s ^c | | | | | | | | | |
| Parfois/jamais | 50.0 | 30.0 | 50.0 | 41.7 | 28.6 | 33.3 | 15.0 | 41.1 | 36.3 |
| Toujours | 45.0 | 70.0 | 37.5 | 50.0 | 71.4 | 33.3 | 75.0 | 58.8 | 58.9 |
| Non réponses | 5.0 | 0.0 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 33.3 | 10.0 | 0.0 | 4.8 |

Sauf mention contraire, base de calcul : tous les répondants.

^a Base : avoir eu une relation sexuelle avec un partenaire stable au cours des 6 derniers mois.

^b Base : avoir eu une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel au cours des 6 derniers mois.

^c Base : répondants qui se sont prostitués au cours de la vie.

7 INDICATEURS DE L'ETAT DE SANTE

Le tableau 10 présente les indicateurs de l'état de santé de la clientèle des structures à bas-seuil en 2011.

Parmi les usagers qui se sont injecté des drogues au cours de leur vie, un peu plus de un sur dix a eu un abcès au cours des six derniers mois (11.6%), les cantons de Bâle, Genève, Vaud et Zürich ayant une proportion supérieure à la moyenne nationale. On note tout de même une nette amélioration avec des valeurs en-dessous de l'enquête de 2006 (23.6%)ⁱ.

Deux consommateurs par injection sur cinq ont fait une overdose (41.1%) et le nombre moyen d'overdoses est de 3.4 au cours de la vie.

Neuf usagers sur dix ont fait un test pour le VIH au cours de la vie (90.7%) et un peu plus de la moitié au cours des douze derniers mois (54.9%). Parmi les répondants ayant fait un test, 7.6% (N=53) rapportent être séropositifs et quatre sur cinq sont actuellement en traitement pour le VIH (81.1%).

Huit consommateurs sur dix ont fait un test pour l'hépatite B au cours de la vie (80.2%) et la moitié au cours des douze derniers mois (50.8%). Un répondant sur neuf a été testé positif au VHB (11.8%) lors du dernier test. La moitié des usagers des structures étudiées est vaccinée pour le VHB (49.5%). De bonnes pratiques de vaccinations sont observées dans les cantons de Berne (54.3%), Genève (69.7%) et Vaud (54.7%).

Huit consommateurs sur dix ont fait un test pour l'hépatite C au cours de la vie (81.1%) et un peu moins de trois sur cinq au cours des douze derniers mois (55.2%). Un tiers des répondants a été testé positif au VHC lors du dernier test. Parmi eux, un sur huit a été ou est actuellement en traitement pour le VHC (13.4%).

ⁱ Tendance statistiquement significative ($p=0.000$).

Tableau 10 Indicateurs de l'état de santé, clientèle des SBS en 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectifs | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Abcès en lien avec l'injection^a | | | | | | | | | |
| Au cours des 6 derniers mois | 16.3 | 6.1 | 22.2 | 7.5 | 6.7 | 0.0 | 14.9 | 12.0 | 11.6 |
| Overdoses | | | | | | | | | |
| Au cours de la vie ^a | 43.0 | 37.0 | 30.3 | 45.3 | 51.4 | 59.6 | 43.9 | 36.1 | 41.1 |
| Nombre d'overdoses ^b | | | | | | | | | |
| Moyen | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 3.4 |
| Médian | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min-max | 1-20 | 1-20 | 1-17 | 1-6 | 1-12 | 1-12 | 1-20 | 1-50 | 1-50 |
| Overdoses ayant nécessité une ambulance/hospitalisation ^b | | | | | | | | | |
| Moyen | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
| Médian | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Min-max | 0-20 | 0-12 | 0-15 | 0-3 | 0-12 | 0-7 | 0-19 | 0-10 | 0-20 |
| Test VIH et résultats | | | | | | | | | |
| Consommateurs testés au cours de la vie ^c | 89.8 | 92.8 | 90.9 | 92.5 | 94.3 | 89.4 | 90.5 | 88.6 | 90.7 |
| Consommateurs testés 12 derniers mois ^c | 50.8 | 57.2 | 66.7 | 47.2 | 60.0 | 57.4 | 58.8 | 48.1 | 54.9 |
| Résultat du dernier test VIH ^d | | | | | | | | | |
| VIH-positif | 6.1 | 6.3 | 3.3 | 2.0 | 12.1 | 2.4 | 10.4 | 11.4 | 7.6 |
| VIH-négatif | 92.2 | 93.0 | 95.0 | 91.8 | 87.9 | 97.6 | 87.3 | 85.0 | 90.3 |
| Non réponses ou ne sait pas | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | 2.2 |
| Actuellement en traitement pour le VIH^e | | | | | | | | | |
| 71.4 | 87.5 | 50.0 | 100 | 100 | 100 | 71.4 | 87.5 | 81.1 | |
| Test VHB et résultats | | | | | | | | | |
| Consommateurs testés au cours de la vie ^c | 76.6 | 80.4 | 80.3 | 83.0 | 82.9 | 78.7 | 80.4 | 81.6 | 80.2 |
| Consommateurs testés 12 derniers mois ^c | 45.3 | 51.4 | 51.5 | 56.6 | 54.3 | 55.3 | 51.4 | 50.0 | 50.8 |
| Résultat du dernier test VHB ^f | | | | | | | | | |
| VHB -positif | 12.2 | 9.9 | 7.5 | 20.5 | 10.3 | 18.9 | 8.4 | 13.2 | 11.8 |
| VHB -négatif | 82.7 | 85.6 | 92.5 | 72.7 | 89.7 | 78.4 | 88.2 | 81.4 | 84.2 |
| Non réponses ou ne sait pas | 5.1 | 4.5 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | 4.1 |
| Consommateurs vaccinés pour le VHB ^g | | | | | | | | | |
| Oui | 46.1 | 54.3 | 69.7 | 35.8 | 45.7 | 34.0 | 54.7 | 44.9 | 49.5 |
| Non | 32.8 | 31.9 | 18.2 | 49.1 | 34.3 | 40.4 | 33.1 | 37.3 | 34.0 |
| Non réponses ou ne sait pas | 21.1 | 13.8 | 12.1 | 15.1 | 20.0 | 25.6 | 12.2 | 17.7 | 16.4 |

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectifs | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Test VHC et résultats | | | | | | | | | |
| Consommateurs testés au cours de la vie ^c | 81.3 | 79.0 | 80.3 | 88.7 | 88.6 | 80.9 | 79.7 | 80.4 | 81.1 |
| Consommateurs testés 12 derniers mois ^c | 49.2 | 56.5 | 56.1 | 62.3 | 57.1 | 55.3 | 58.8 | 52.5 | 55.2 |
| Résultat du dernier test VHC ^g | | | | | | | | | |
| VHC -positif | 32.7 | 32.1 | 32.1 | 36.2 | 16.1 | 39.5 | 36.4 | 31.5 | 32.9 |
| VHC -négatif | 61.5 | 66.1 | 67.9 | 61.7 | 83.9 | 57.9 | 57.6 | 61.4 | 63.0 |
| Non réponses ou ne sait pas | 5.7 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 7.1 | 4.1 |
| A été ou est actuellement en traitement pour le VHC ^g | | | | | | | | | |
| Oui | 16.3 | 15.6 | 1.9 | 10.6 | 19.4 | 10.5 | 8.5 | 18.9 | 13.4 |
| Non | 70.2 | 62.4 | 58.5 | 72.3 | 80.6 | 73.7 | 72.0 | 67.7 | 68.6 |
| Non réponses | 13.5 | 22.0 | 39.6 | 17.0 | 0.0 | 15.8 | 19.5 | 13.4 | 18.0 |

^a Base : répondants ayant consommé par injection au cours de leur vie.

^b Base : répondants ayant eu au une overdose au cours de leur vie.

^c Base : tous les répondants.

^d Base : répondants ayant fait un test VIH au cours de leur vie.

^e Base : répondants séropositifs.

^f Base : répondants ayant fait un test VHB au cours de leur vie.

^g Base : répondants ayant fait un test VHC au cours de leur vie.

Le tableau 11 présente l'état de santé psychique et physique des usagers des structures à bas-seuil en 2011.

Un peu moins d'un tiers des répondants suit actuellement une psychothérapie (30.4%). Les consommateurs ont reçu en moyenne 1.7 fois de l'aide ou un traitement pour un problème émotionnel ou psychologique au cours de leur vie en tant que patient ambulatoire et en moyenne 2.1 fois en tant que patient hospitalisé ou résidant dans une institution ou un centre thérapeutique.

Un quart des usagers qualifient leur état de santé actuel comme plutôt ou très mauvais (26.2%) et deux sur cinq perçoivent leur état de santé psychologique ou émotionnel actuel comme plutôt ou très mauvais (38.3%). Presque un tiers des répondants pense avoir besoin d'une aide ou d'un traitement pour des problèmes personnels, psychologiques ou émotionnels (30.5%). La moitié des usagers qualifient leur consommation de substances psychotropes comme assez ou très problématique (50.3%).

^j Mais au vu du fort taux de non-réponses à ces deux questions (32.7%), on peut supposer que les répondants les ont mal compris.

Tableau 11 Santé psychique et physique, clientèle des SBS 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Suit actuellement une psychothérapie | | | | | | | | | |
| Oui | 31.3 | 20.3 | 28.8 | 41.5 | 8.6 | 23.4 | 31.8 | 41.1 | 30.4 |
| Non | 55.5 | 59.4 | 68.2 | 54.7 | 91.4 | 76.6 | 64.2 | 58.2 | 62.4 |
| Non réponses | 13.3 | 20.3 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.6 | 7.2 |
| Nombre de fois où le consommateur a reçu une aide, un traitement pour un problème émotionnel ou psychologique | | | | | | | | | |
| En tant que patient ambulatoire | | | | | | | | | |
| Nombre moyen | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Nombre médian | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min-max | 0-40 | 0-10 | 0-50 | 0-10 | 0-3 | 0-7 | 0-50 | 0-24 | 0-50 |
| En tant que patient hospitalisé ou en institution | | | | | | | | | |
| Nombre moyen | 1.9 | 1.5 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| Nombre médian | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min-max | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-70 | 0-90 | 0-90 |
| Etat de santé physique perçu actuellement | | | | | | | | | |
| Très/plutôt bon | 67.9 | 72.4 | 65.1 | 69.8 | 62.9 | 68.1 | 65.6 | 64.6 | 67.3 |
| Très/plutôt mauvais | 26.6 | 21.0 | 30.3 | 26.4 | 34.3 | 25.5 | 23.7 | 29.8 | 26.2 |
| Non réponses ou ne sait pas | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 6.4 | 10.9 | 5.7 | 6.5 |
| Etat de santé psychologique ou émotionnel perçu actuellement | | | | | | | | | |
| Très/plutôt bon | 60.1 | 55.1 | 56.0 | 49.0 | 42.8 | 51.1 | 57.5 | 55.1 | 55.2 |
| Très/plutôt mauvais | 35.1 | 38.4 | 34.9 | 49.1 | 45.7 | 46.8 | 33.8 | 38.6 | 38.3 |
| Non réponses ou ne sait pas | 4.7 | 6.5 | 9.1 | 1.9 | 11.4 | 2.1 | 8.8 | 6.3 | 6.5 |
| A besoin d'une aide ou d'un traitement pour des problèmes personnels, psychologiques ou émotionnels | | | | | | | | | |
| Pas du tout/un peu | 64.8 | 63.8 | 50.0 | 58.5 | 71.4 | 61.7 | 52.7 | 60.8 | 59.9 |
| Passablement/beaucoup | 28.9 | 28.9 | 33.3 | 35.9 | 25.7 | 25.5 | 35.2 | 28.5 | 30.5 |
| Non réponses ou ne sait pas | 6.2 | 7.3 | 16.7 | 5.7 | 2.9 | 12.8 | 12.1 | 10.8 | 9.6 |
| Qualification de la consommation de substances psychotropes | | | | | | | | | |
| Très/assez problématique | 51.6 | 51.5 | 62.1 | 58.5 | 25.8 | 44.7 | 48.7 | 49.3 | 50.3 |
| Peu/pas problématique | 38.2 | 31.8 | 27.3 | 35.8 | 62.8 | 42.5 | 43.9 | 39.2 | 38.6 |
| Non réponses ou ne sait pas | 10.2 | 16.6 | 10.6 | 5.7 | 11.4 | 12.7 | 7.4 | 11.4 | 11.0 |

Base : tous les répondants.

Environ un tiers des répondants (33.9%) a été maltraité physiquement - battu(e), agressé(e) sexuellement - par un parent au cours de la vie (Tableau 12). Parmi eux, 123 ont mentionné avoir été maltraité par leur père, 35 par leur mère, 34 par les deux parents et 22 par les beaux-parents.^k Certains

^k Huit usagers ont été maltraités par leur frère ou leur sœur, 6 par un oncle, une tante ou un cousin, 5 par un grand-parent, 4 par un ami de leurs parents et 1 personne dans un orphelinat.

usagers ont été maltraités par plusieurs parents (à la fois par leur père et leur frère par exemple). La très grande majorité des répondants maltraités par un de leurs parents (81.6%) a subi assez souvent, voire très souvent, ces violences.

Un quart des usagers (24.2%) a été maltraité physiquement - battu(e), agressé(e) sexuellement - par un partenaire au cours de la vie (Tableau 12). Deux répondants sur cinq (40.1%) ont déclaré avoir été maltraités une seule fois ou assez souvent (38.0%) au cours de leur vie.

Parmi la totalité des répondants à l'enquête SBS 2011, cent usagers (12.9%) ont été à la fois maltraités par un de leurs parents et par un partenaire. Les usagers des cantons de Bâle, Genève et Vaud sont particulièrement concernés.

Tableau 12 Maltraitance physique par un parent, par un partenaire, clientèle des SBS 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectif | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Maltraitance par un parent | | | | | | | | | |
| Oui | 38.3 | 26.8 | 40.9 | 35.8 | 42.9 | 36.2 | 32.4 | 31.6 | 33.9 |
| Non | 56.2 | 70.3 | 56.1 | 64.2 | 54.3 | 63.8 | 65.5 | 62.7 | 62.7 |
| Non réponses | 5.5 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 3.4 |
| Fréquence de la maltraitance ^a | | | | | | | | | |
| une fois | 14.3 | 13.5 | 11.1 | 10.5 | 13.3 | 5.9 | 8.3 | 26.0 | 14.1 |
| assez souvent | 42.9 | 54.1 | 51.9 | 52.6 | 40.0 | 35.3 | 39.6 | 34.0 | 43.1 |
| très souvent | 42.9 | 24.3 | 33.3 | 31.6 | 46.7 | 41.2 | 52.1 | 34.0 | 38.5 |
| non réponses | 0.0 | 8.1 | 3.7 | 5.3 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 6.0 | 4.2 |
| Maltraitance par un partenaire | | | | | | | | | |
| Oui | 25.8 | 23.9 | 30.3 | 22.6 | 25.7 | 23.4 | 29.1 | 16.5 | 24.2 |
| Non | 67.2 | 71.7 | 65.2 | 75.5 | 74.3 | 70.2 | 69.6 | 77.8 | 71.5 |
| Non réponses | 7.0 | 4.3 | 4.5 | 1.9 | 0.0 | 6.4 | 1.4 | 5.7 | 4.3 |
| Fréquence de la maltraitance ^b | | | | | | | | | |
| une fois | 36.4 | 39.4 | 40.0 | 58.3 | 22.2 | 72.7 | 37.2 | 34.6 | 40.1 |
| assez souvent | 39.4 | 42.4 | 30.0 | 16.7 | 55.6 | 9.1 | 39.5 | 50.0 | 38.0 |
| très souvent | 24.2 | 12.1 | 25.0 | 25.0 | 22.2 | 18.2 | 20.9 | 7.7 | 18.7 |
| non réponses | 0.0 | 6.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 3.2 |
| Maltraité par un parent <u>et</u> un partenaire | 15.6 | 12.3 | 16.7 | 11.3 | 8.6 | 12.8 | 14.9 | 9.5 | 12.9 |

^a Base : répondants maltraités au cours de leur vie par un parent.

^b Base : répondants maltraités au cours de leur vie par un partenaire.

8 INCARCERATION EN LIEN AVEC LA DROGUE ET CONSOMMATION EN PRISON

Le tableau 13 présente les données concernant les séjours en prison en lien avec la drogue ainsi que les caractéristiques de consommation en prison.

Un quart des usagers a eu un contrôle de police en relation avec la drogue (24.5%) au cours du dernier mois. Berne et Genève sont les cantons où les usagers ont été le plus contrôlés.

Ils sont la moitié à avoir été incarcérés pour un motif en relation avec la drogue au cours de leur vie (51.7%) et un sur cinq au cours des deux dernières années (19.0%). Berne, Saint-Gall et Soleure sont les cantons ayant effectué le plus d'incarcérations sur cette période.

Parmi les usagers incarcérés au cours des deux dernières années, environ un sur huit a pratiqué l'injection une à plusieurs fois en prison (12.2%). Seuls des répondants du canton de Zurich ont déclaré avoir utilisé une seringue usagée en prison (6.7%). Environ trois quart des personnes incarcérées au cours de leur vie sont restées plus d'un mois en prison pour des faits liés à la drogue (72.5%).

Tableau 13 Incarcération en relation avec la drogue et consommation en prison, clientèle des SBS, 2011 (en %)

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Effectifs | 128 | 138 | 66 | 53 | 35 | 47 | 148 | 158 | 773 |
| Contrôle de police durant le dernier mois en relation avec la drogue^a | | | | | | | | | |
| Oui | 18.8 | 40.6 | 31.8 | 15.1 | 20.0 | 14.9 | 19.6 | 23.4 | 24.5 |
| Non | 80.5 | 57.2 | 66.7 | 84.9 | 80.0 | 85.1 | 80.4 | 75.9 | 74.8 |
| Non réponses | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| Incarcération en lien avec la drogue^a | | | | | | | | | |
| Au cours de la vie | 46.9 | 50.0 | 51.5 | 50.9 | 60.0 | 59.6 | 54.1 | 51.3 | 51.7 |
| Au cours des 2 dernières années (2009 et 2010) | 12.5 | 25.4 | 18.2 | 18.9 | 28.6 | 23.4 | 15.5 | 19.0 | 19.0 |
| Injection de drogue ou autre substance en prison (en 2009 - 2010)^b | | | | | | | | | |
| Oui, une seule fois | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 4.3 | 6.7 | 2.7 |
| Oui, plusieurs fois | 25.0 | 11.4 | 8.3 | 0.0 | 10.0 | 18.2 | 4.3 | 3.3 | 9.5 |
| Non, jamais | 68.8 | 88.6 | 91.7 | 100.0 | 90.0 | 63.6 | 91.3 | 86.7 | 85.7 |
| Utilisation d'une seringue usagée en prison^b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.4 |

| | Cantons | | | | | | | | CH |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | BS | BE | GE | LU | SG | SO | VD | ZH | |
| Période la plus longue passée en prison^c | | | | | | | | | |
| 1 jour/une nuit | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 7.4 | 4.8 |
| Jusqu'à 2 semaines | 11.7 | 10.1 | 5.9 | 18.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 4.9 | 8.5 |
| Jusqu'à 1 mois | 13.3 | 13.0 | 2.9 | 18.5 | 16.3 | 4.8 | 16.3 | 9.9 | 12.5 |
| Plus d'1 mois | 68.3 | 73.9 | 85.3 | 55.6 | 73.8 | 81.0 | 73.8 | 75.3 | 72.5 |
| Non réponses | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 |

^a Base : tous les répondants.

^b Base : Répondants incarcérés en 2009-2010. Les non-réponses ne sont pas représentées.

^c Base : Répondants incarcérés en prison au cours de la vie, en lien avec la drogue.

9 ANNEXE : LE QUESTIONNAIRE

Enquête nationale auprès de la clientèle des centres à bas seuil d'accès

Questionnaire 2011



L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne, sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique, fait une enquête auprès des usagers de ce centre. Nous nous intéressons à votre santé, à votre situation de vie quotidienne et la consommation de drogues. Notre but est de mieux comprendre les besoins des usagers et d'améliorer les services. Nous vous serions très reconnaissants si vous participiez à cette enquête. L'anonymat est garanti et toutes les réponses sont confidentielles.

- 1 Vous êtes
 O₁ un homme
 O₂ une femme

2 Quelle est votre année de naissance ? 1 9

- 3 Quelle est votre nationalité ?
 O₁ suisse
 O₁ étrangère

4 Si étrangère, laquelle ? _____

- 5 Quel est votre état civil ?
 O₁ célibataire
 O₂ marié(e), pacsé(e) ou en union libre
 O₃ séparé(e)
 O₄ divorcé(e)
 O₅ veuf(ve)

- 6 Avez-vous des enfants ?
 O₁ oui
 O₂ non

7 Si oui, combien avez-vous d'enfants ?

8 Avez-vous déjà consommé ces substances au cours de **votre vie**? (Questions 8.1 à 8.9)

Si oui

A quel âge avez-vous, **pour la première fois**, consommé ces substances ?

(Une réponse par ligne pour chacune des 2 colonnes)

| | | Consommation durant la vie | | Age à la première consommation (-1=inconnu) |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | oui | non | |
| 8.1 | Héroïne (seule) | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.2 | Cocaïne (seule)..... | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.3 | Crack, free-base..... | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.4 | Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne)..... | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.5 | Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, Valium®, etc.) | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.6 | Méthadone (au noir, non prescrite) | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.7 | Amphétamines et/ou ecstasy | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.8 | Cannabis | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8.9 | Alcool | <input type="radio"/> O ₁ | <input type="radio"/> O ₂ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

9 A quelle fréquence, avez-vous consommé durant le **dernier mois** (30 derniers jours)?

(Une réponse par ligne)

| | | Plusieurs fois par jour | Chaque jour | Plusieurs fois par semaine | Occasionnellement | Jamais |
|-----|--|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 9.1 | Héroïne (seule) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.2 | Cocaïne (seule) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.3 | Crack, free-base..... | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.4 | Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.5 | Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, Valium®, etc.) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.6 | Méthadone (au noir, non prescrite) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.7 | Amphétamines et/ou ecstasy | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.8 | Cannabis | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| 9.9 | Alcool | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |

10 Si vous consommez ces substances, comment les avez-vous **principalement** consommées durant le **dernier mois** (30 derniers jours)?

(Une réponse par ligne)

| | | injecté | Inhalé (fumé, chassé le dragon) | sniffé | avalé |
|------|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 10.1 | Héroïne (seule) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 10.2 | Cocaïne (seule) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 10.3 | Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne) .. | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 10.4 | Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, Valium®, etc.)..... | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 10.5 | Méthadone (au noir, non prescrite) | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 10.6 | Amphétamines et/ou ecstasy | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |

11 Suivez-vous **actuellement** un traitement de substitution ou autre traitement pour consommation de drogue ?

- O₁ oui
O₂ non

Si oui, quel traitement suivez-vous **actuellement** ?
Depuis **combien de temps** suivez-vous ce traitement ?
Quelle dose recevez-vous **actuellement** par jour ?

| Type de traitement | Durée | | Dose actuelle par jour |
|---|-------|------|------------------------|
| Méthadone par voie orale..... | année | mois | mg ou ml/cc |
| Buprénorphine (Subutex®, Temgesic®) par voie orale..... | année | mois | mg |
| Héroïne par voie orale..... | année | mois | mg |
| Héroïne par voie intraveineuse..... | année | mois | mg |
| Morphine par voie orale..... | année | mois | mg |
| Autre, lequel..... | année | mois | |

12 Avez-vous déjà suivi un traitement auparavant ?

- O₁ oui
O₂ non

Si oui, lequel et combien ?

12.1 Sevrage..... nbre de fois

12.2 Séjour résidentiel..... nbre de fois

12.3 Traitement de substitution..... nbre de fois

13 Suivez-vous actuellement une psychothérapie ?

- O₁ oui
O₂ non

14 Combien de fois avez-vous reçu une aide, un traitement pour un problème émotionnel ou psychologique ?

14.1 En tant que patient ambulatoire..... nbre de fois

14.2 En tant que personne hospitalisée ou résidant dans une institution/un centre thérapeutique..... nbre de fois

15 Vous êtes-vous déjà, **au cours de votre vie**, injecté des drogues ?

- O₁ oui
O₂ non



Si non, prière de passer à la question 28

16 Si oui, à quel âge vous êtes-vous injecté pour la **première fois** des drogues ? ans

17 Est-ce que vous vous êtes injecté des drogues durant le **dernier mois** (30 derniers jours) ?

- O₁ oui
O₂ non




Si non, prière de passer à la question 22

18 Si oui, dans quel lieu vous êtes-vous injecté le plus souvent durant le **dernier mois** (30 derniers jours) ?
(Une seule réponse)

- O₁ à domicile, dans un endroit privé
O₂ dans un lieu public, dehors
O₃ dans un local public (café, pub, wc)
O₄ dans un local d'injection

- 19 Vous êtes-vous injecté le plus souvent seul(e) ou à plusieurs durant le **dernier mois** (30 derniers jours) ?
(Une seule réponse)
- ₁ seul(e)
₂ à plusieurs
₃ les deux
- 20 Où vous êtes-vous procuré le plus souvent les seringues neuves durant le **dernier mois** (30 derniers jours)?
(Une seule réponse)
- ₁ structure / programme de distribution de seringues
₂ automate, distributeur de seringues
₃ pharmacies
₄ dans la rue, auprès d'autres consommateurs
- 21 Combien d'injections vous êtes vous fait durant la **dernière semaine** (les 7 derniers jours) ?
□□□□ injections

**La suite du questionnaire peut être remplie
par le consommateur lui-même ou la consommatrice elle-même**

- 22 Vous êtes-vous déjà, au **cours de votre vie**, injecté avec une seringue / aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre ?
- ₁ oui
₂ non
-  Si non, prière de passer à la question 24
- 23 Si oui vous êtes-vous injecté durant le **dernier mois** (30 derniers jours), avec une seringue / aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre?
- ₁ oui
₂ non
- 24 Durant le **dernier mois** (30 derniers jours), avez-vous donné votre seringue / aiguille à quelqu'un d'autre après l'avoir utilisée ?
- ₁ oui
₂ non
- 25 Durant le **dernier mois** (30 derniers jours), vous est-il arrivé d'utiliser du matériel servant à l'injection déjà utilisé par quelqu'un d'autre ?
(une réponse pour chaque ligne)
- | | | oui | non |
|------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 25.1 | même cuillère | <input type="radio"/> ₁ | <input type="radio"/> ₂ |
| 25.2 | même filtre | <input type="radio"/> ₁ | <input type="radio"/> ₂ |
| 25.3 | même coton pour désinfecter | <input type="radio"/> ₁ | <input type="radio"/> ₂ |
| 25.4 | même eau pour laver le matériel ou préparer le produit | <input type="radio"/> ₁ | <input type="radio"/> ₂ |

26 Avez-vous eu un abcès ou une infection en rapport avec l'injection de drogues pendant **les 6 derniers mois** ?

- O₁ oui
- O₂ non

27 Si oui, avez-vous eu un abcès ou une infection en rapport avec l'injection de drogues pendant **le dernier mois** (30 derniers jours) ?

- O₁ oui
- O₂ non

28 Est-ce que vous avez inhalé et/ou sniffé des drogues durant le **derniers mois** (30 derniers jours) ?

- O₁ oui
- O₂ non



Si non, prière de passer à la question 31

29 Si oui, dans quel lieu avez-vous inhalé et/ou sniffé des drogues le plus souvent durant le **dernier mois** (30 derniers jours) ?

(Une seule réponse)

- O₁ à domicile, dans un endroit privé
- O₂ dans un lieu public, dehors
- O₃ dans un local public (café, pub, wc)
- O₄ dans un local d'inhalation

30 Durant le **dernier mois** (30 derniers jours), vous est-il arrivé d'utiliser du matériel servant à l'inhalation et/ou au sniff (paille, billet, embout, pipe ...) déjà utilisé par quelqu'un d'autre ?

- O₁ oui
- O₂ non

31 Avez-vous déjà eu une overdose au cours de **votre vie**?

- O₁ oui
- O₂ non



Si non, prière de passer à la question 34

32 Si oui, combien au **total** avez-vous eu d'overdose(s) ?






□□□ overdose(s)


33 Si oui, combien ont nécessité un appel d'ambulance et/ou une hospitalisation ?

□□□ overdose(s)

34 Avez-vous eu un contrôle de police durant le **dernier mois** (30 derniers jours) en relation avec la drogue ?

- O₁ oui
- O₂ non

- 35 *Etes-vous déjà, au cours de **votre vie**, allé(e) en prison pour un motif en relation avec la drogue (consommation ou trafic)?*
- O₁ oui
O₂ non  Si non, prière de passer à question 40
- 36 *Au cours des années **2009 et 2010**, êtes-vous allé(e) en prison ?*
- O₁ oui
O₂ non  Si non, prière de passer à question 39
- 37 *Au cours des années **2009 et 2010**, lorsque vous étiez en prison vous êtes-vous injecté de la drogue ou d'autres substances ?*
- O₁ oui, une seule fois
O₂ oui, plusieurs fois
O₃ non  Si non, prière de passer à question 39
- 38 *Au cours des années **2009 et 2010**, lorsque vous étiez en prison vous êtes-vous injecté avec une seringue/aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre ?*
- O₁ oui, une seule fois
O₂ oui, plusieurs fois
O₃ non, jamais
- 39 *Quelle est la période la plus longue que vous ayez passé en détention ?*
- O₁ moins de 24 heure – une nuit
O₂ entre 2 et 14 jours (jusqu'à deux semaines)
O₃ entre 15 et 30 jours (jusqu'à 1 mois)
O₄ plus de 30 jours
- 40 *Au cours des **6 derniers mois** avez-vous eu des relations sexuelles avec un/e partenaire stable ?*
- O₁ oui
O₂ non  Si non, prière de passer à la question 43
- 41 *Si oui, avez-vous utilisé des préservatifs avec ce/cette partenaire stable ?*
- O₁ oui, toujours
O₂ oui, parfois
O₃ non, jamais
- 42 *Ce/cette partenaire stable consomme-t-il (elle) ou a-t-il (elle) consommé des drogues par injection ?*
- O₁ oui
O₂ non
- 43 *Au cours des **6 derniers mois** avez-vous eu des relations sexuelles avec un(e) ou des partenaire(s) occasionnel(le)s ?*
- O₁ oui
O₂ non  Si non, prière de passer à la question 45

- 44 *Si oui, avez- vous utilisé des préservatifs avec ce(s)/cette partenaire(s) occasionnel(le/s) ?*
- O₁ oui, toujours
O₂ oui, parfois
O₃ non, jamais
- 45 *Vous êtes-vous déjà, au cours de **votre vie**, prostitué(e) ?*
- O₁ oui
O₂ non
-  Si non, prière de passer à la question 48
- 46 *Si oui, vous êtes-vous prostitué(e) ces **6 derniers mois** ?*
- O₁ oui
O₂ non
- 47 *Avez-vous utilisé des préservatifs avec les client(e)s?*
- O₁ oui, toujours
O₂ oui, parfois
O₃ non, jamais
- 48 *Au cours des **12 derniers mois**, combien de partenaire sexuel(le)s (tous les types de partenaires) avez-vous eu au total?*
- partenaires sexuel(le)s
- 49 *Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre **dernier** rapport sexuel ?*
- O₁ oui
O₂ non
- 50 *Où avez-vous habité **principalement** durant le **dernier mois** (30 derniers jours) ?*
(Une seule réponse)
- O₁ domicile fixe privé (chambre, appartement, etc.)
O₂ sans domicile fixe (changements fréquents, Armée du Salut, rue, etc.)
O₃ en institution
O₄ en prison
O₅ autres, à préciser: _____
- 51 *Quelles ont été vos sources de revenus **ce dernier mois** (30 derniers jours) ?*
(une réponse pour chaque ligne)
- | | | oui | non |
|------|--|----------------|----------------|
| 51.1 | travail à plein temps | O ₁ | O ₂ |
| 51.2 | travail à temps partiel (régulièrement) | O ₁ | O ₂ |
| 51.3 | intérim, travail temporaire (irrégulièrement) | O ₁ | O ₂ |
| 51.4 | assurances (AI=assurance invalidité, chômage, AVS) | O ₁ | O ₂ |
| 51.5 | aide sociale (assistance publique) | O ₁ | O ₂ |
| 51.6 | famille, amis, compagnon | O ₁ | O ₂ |

- 51.7 faire la manche O₁ O₂
- 51.8 prostitution O₁ O₂
- 51.9 revenus illégaux y compris deal O₁ O₂

52 Quelle est la **dernière** école ou formation que vous avez terminée ?
(une seule réponse)

- O₁ scolarité obligatoire
 O₂ apprentissage, école professionnelle
 O₃ maturité
 O₄ école professionnelle supérieure, université
 O₅ aucune

53 Si aucune, pour quelle raison ?
(une seule réponse)

- O₁ abandon de l'école obligatoire
 O₂ renvoyé de l'école obligatoire

54 Est-ce que vous voudriez être aidé pour votre travail ou d'autres problèmes que vous rencontrez actuellement à l'école ou aux cours ?

- O₁ oui
 O₂ non
 O₃ non concerné

55 Pendant votre temps libre, consacrez-vous du temps aux personnes suivantes ?
(une réponse par ligne)

| | | Pas du tout | Un peu | Passablement | Beaucoup |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 55.1 | vos amis qui consomment de la drogue ou de l'alcool..... | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 55.2 | vos amis qui ne consomment rien..... | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| 55.3 | vous-même..... | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |

56 Combien d'ami(e)s vraiment proches avez-vous ?













□□□□ ami(e)s

57 Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conflits familiaux ?
(une seule réponse)

- O₁ jamais
 O₂ parfois
 O₃ assez souvent, avec qui ? précisez _____
 O₄ très souvent, avec qui ? précisez _____
 O₅ non concerné

- 58 *Au cours du **dernier mois** (30 derniers jours) à quelle fréquence êtes-vous venu dans cette structure ?*
(une seule réponse)
- O₁ tous les jours ou presque
 - O₂ 1 à 4 fois par semaine
 - O₃ 1 à 3 fois en tout
- 59 *Comment qualifiez-vous votre état de santé physique **actuellement** ?*
(Une seule réponse)
- O₁ très bon
 - O₂ plutôt bon
 - O₃ plutôt mauvais
 - O₄ très mauvais
 - O₅ je ne sais pas
- 60 *Comment qualifiez-vous votre état de santé psychologique ou émotionnel **actuellement** ?*
(Une seule réponse)
- O₁ très bon
 - O₂ plutôt bon
 - O₃ plutôt mauvais
 - O₄ très mauvais
 - O₅ je ne sais pas
- 61 *Dans quelle mesure pensez-vous avoir besoin d'une aide ou d'un traitement pour des problèmes personnels, psychologiques ou émotionnels ?*
(Une seule réponse)
- O₁ pas du tout
 - O₂ un peu
 - O₃ passablement
 - O₄ beaucoup
 - O₅ je ne sais pas
- 62 *Comment qualifiez-vous votre consommation de substances psychotropes ?*
(Une seule réponse)
- O₁ très problématique
 - O₂ assez problématique
 - O₃ peu problématique
 - O₄ pas problématique du tout
 - O₅ je ne sais pas

A partir d'ici, l'enquêteur ne regardera pas si vous avez répondu aux questions

- 63 *Est-ce qu'il vous est arrivé d'être maltraité(e) physiquement – battu(e), agressé(e) sexuellement – par un parent ?*
 O₁ oui 
 O₂ non 
Si oui, précisez par quel parent : _____
- 64 *Est-ce arrivé...*
 O₁ une fois
 O₂ assez souvent
 O₃ très souvent
- 65 *Est-ce qu'il vous est arrivé d'être maltraité(e) physiquement – battu(e), agressé(e) sexuellement – par un(e) partenaire ?*
 O₁ oui 
 O₂ non 
- 66 *Si oui, est-ce arrivé...*
 O₁ une fois
 O₂ assez souvent
 O₃ très souvent
- 67 *Avez-vous déjà fait un test pour le sida / VIH ?*
 O₁ oui 
 O₂ non 
 O₃ ne sais pas 
 **Si non, prière de passer à la question 71**
- 68 *Si oui, avez-vous fait un test pour le sida/VIH au cours des **12 derniers mois** ?*
 O₁ oui
 O₂ non
- 69 *Quel est le résultat de votre **dernier** test sida / VIH ?*
(une seule réponse)
 séropositif (porteur du virus) O₁
 séronégatif (non-porteur du virus) O₂
 ne sais pas, ne veux pas répondre O₃
- 70 *Etes-vous **actuellement** en traitement pour votre séropositivité*
(traitement antirétroviraux ou multithérapie) ?
 O₁ oui
 O₂ non
- 71 *Avez-vous déjà été testé(e) pour l'hépatite **B**?*
(une seule réponse)
 O₁ oui 
 O₂ non 
 O₃ ne sais pas 
 **Si non ou ne sais pas, prière de passer à la question 74**
- 72 *Si oui, avez-vous fait un test au cours des **12 derniers mois** ?*
 O₁ oui
 O₂ non

73 Quel a été le résultat du **dernier** test de l'hépatite **B**?
(une seule réponse)

- O₁ positif (porteur du virus)
- O₂ négatif (non-porteur du virus)
- O₃ ne sais pas, ne veux pas répondre

74 Avez-vous été vacciné(e) contre l'hépatite **B** ?

- O₁ oui
- O₂ non
- O₃ ne sait pas



Si non, prière de passer à la question 76

75

Si oui, combien de doses avez-vous déjà reçues ?

- O₁ 1 dose
- O₂ 2 doses
- O₃ 3 doses et plus
- O₄ ne sais pas

76

Avez vous déjà été testé(e) pour l'hépatite **C**?

- O₁ oui
- O₂ non
- O₃ ne sais pas

77

Si oui, avez-vous fait un test au cours des **12 derniers mois** ?

- O₁ oui
- O₂ non

78

Quel a été le résultat du **dernier** test de l'hépatite **C**?

- O₁ positif (porteur du virus)
- O₂ négatif (non-porteur du virus)
- O₃ ne sais pas, ne veux pas répondre

79

Avez-vous été ou êtes-vous actuellement en traitement pour votre hépatite **C** ?

- O₁ oui
- O₂ non

**Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions,
nous vous rappelons que l'anonymat est garanti et
que toutes les réponses sont confidentielles.**

**Vous pouvez utiliser cette page pour
nous écrire vos commentaires !**

La dernière page du questionnaire est à remplir par l'enquêteur

E/0 Canton/Ville : _____

E/1 Nom de la structure

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> ₁ Le Passage | <input type="radio"/> ₁₂ K&A Heuwaage, Basel |
| <input type="radio"/> ₂ Entrée de Secours | <input type="radio"/> ₁₃ K&A Luzern |
| <input type="radio"/> ₃ Action Communautaire Toxicomanie | <input type="radio"/> ₁₄ Blauer Engel |
| <input type="radio"/> ₄ Zone Bleue | <input type="radio"/> ₁₅ Tagesraum Schaffhausen |
| <input type="radio"/> ₅ Distribus | <input type="radio"/> ₁₆ Perspektive Anlaufstelle |
| <input type="radio"/> ₆ Quai9 | <input type="radio"/> ₁₇ K&A Kaserne, Zürich |
| <input type="radio"/> ₇ Bips GE | <input type="radio"/> ₁₈ K&A Oerlikon, Zürich |
| <input type="radio"/> ₈ K&A Hodlerstrasse Bern | <input type="radio"/> ₁₉ K&A Brunau, Zürich |
| <input type="radio"/> ₉ Cactus | <input type="radio"/> ₂₀ K&A Selnau, Zürich |
| <input type="radio"/> ₁₀ K&A Spitalgasse, Basel | <input type="radio"/> ₂₁ Stadtärztlicher Dienst Bus |
| <input type="radio"/> ₁₁ K&A Wiesenkreisel, Vasel | <input type="radio"/> ₂₂ |

E/2 Nom de l'enquêteur _____

E/3 Date jour mois 2 0 1 1

E/4 Jour de semaine lun ₁ mar ₂ mer ₃ jeu ₄ ven ₅ sam ₆ dim ₇

E/5 Durée estimée de l'interview minutes

E/6 *Appréciation par l'enquêteur de la fiabilité des réponses*

- ₁ fiable
₂ non fiable

E/7 *L'enquêteur a rempli le questionnaire avec le répondant :*

- ₁ partie une (jusqu'à la question 21)
₂ partie deux (jusqu'à la question 62)
₃ partie trois (jusqu'à la fin)

Merci pour votre collaboration

10 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 Arnaud S, Jeannin A, Dubois-Arber F. Estimating national-level syringe availability to injecting drug users and injection coverage: Switzerland, 1996-2006. *Int J Drug Policy*. 2011 May;22(3):226-32. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21600753>
- 2 Benninghoff F. Monitoring des structures à bas seuil d'accès mettant à disposition du matériel d'injection en Suisse 1993-1999. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive; 2000.
- 3 Benninghoff F. Monitoring der niederschweligen Einrichtungen mit Injektionsmaterial in der Schweiz 1993-1999. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive; 2000.
- 4 Benninghoff F, Morency P, Geense R, Huissoud T, Dubois-Arber F. Health trends among drug users attending needle exchange programmes in Switzerland (1994 to 2000). *AIDS Care*. 2006;18(4):371-5.
- 5 Balthasar H, Arnaud S, Gervasoni J-P, Samitca S, Schnoz D, Zobel F, et al. Résultats de l'enquête auprès de la clientèle des structures à bas seuil d'accessibilité (SBS) en Suisse (2006). Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive 2006.
- 6 Balthasar H, Huissoud T, Zobel F, Arnaud S, Samitca S, Jeannin A, et al. Evolution de la consommation et des pratiques à risques de transmission du VIH et du VHC chez les consommateurs de drogue par injection en Suisse, 1993-2006. *Bulletin de l'Office Fédéral de la Santé Publique*. 2007;45:804-9.
- 7 Dubois-Arber F, Balthasar H, Huissoud T, Zobel F, Arnaud S, Samitca S, et al. Trends in drug consumption and risk of transmission of HIV and hepatitis C virus among injecting drug users in Switzerland, 1993-2006. *Euro Surveill*. 2008;13(21):1-6.