



Lausanne, Juli 2014
Forschungsbericht Nr. 70

Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen

Luca Notari
Lydie Le Mével
Marina Delgrande Jordan
Etienne Maffli

*Dieses Projekt wurde finanziert vom Bundesamt für Gesundheit,
Vertrag Nr. 13.007075 / 204.0001-1193*

Danksagung

An dieser Stelle sei dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) für die finanzielle Unterstützung und dem Bundesamt für Statistik (BFS) für den Datenzugang gedankt. Hier sei auch Edith Bacher für das Erstellen des Layouts des Berichts gedankt.

Impressum

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. ++41 (0)21 321 29 96, mdelgrande@addictionsuisse.ch
	Etienne Maffli, Tel. ++41 (0)21 321 29 54, emaffli@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Luca Notari, Lydie Le Mével, Marina Delgrande Jordan, Etienne Maffli
Vertrieb:	Sucht Schweiz, Forschung, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. ++41 (0)21 321 29 46, Fax ++41 (0)21 321 29 40 ebacher@suehtschweiz.ch
Bestellnummer:	Forschungsbericht Nr. 70
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2014
ISBN:	978-2-88183-158-4
Zitierhinweis:	Notari, L., Le Mével, L., Delgrande Jordan, M., & Maffli, E. (2014). <i>Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen</i> (Forschungsbericht Nr. 70): Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

1 Tabak	13
<i>Anteile der Rauchenden, nach Geschlecht</i>	
<i>Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012</i>	15
<i>Anteile der Rauchenden, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012</i>	16
<i>Tabakkonsum, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	17
<i>Tabakkonsum, nach Alter</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	18
<i>Tabakkonsum, nach Alter</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	19
<i>Tabakkonsum, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	21
<i>Tabakkonsum, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	22
<i>Tabakkonsum, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	23
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-1997</i>	25
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	26
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	27
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	27
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	28
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	29
<i>Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	29
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	31
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	32
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	33

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	34
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	36
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	38
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	40
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	42
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	44
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	46
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	48
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	50
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	52
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	54
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	56
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....	58
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	61
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	62
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	63
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	65
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	66
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	67
Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012	69

<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	70
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	71
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	73
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	74
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	75
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	77
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	78
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	79
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	81
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	82
<i>Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	83
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012.....</i>	84
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	85
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012.....</i>	85
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	86
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012</i>	87
<i>Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012.....</i>	87
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	88
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	89
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	90

<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter</i>	
<i>Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	91
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion</i>	
<i>Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	93
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion</i>	
<i>Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	94
<i>Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion</i>	
<i>Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012</i>	95
<i>Passives Rauchen</i>	
<i>Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012.....</i>	96
<i>Passives Rauchen, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012.....</i>	97
<i>Passives Rauchen, nach Alter</i>	
<i>Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012.....</i>	98
<i>Passives Rauchen, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012.....</i>	99
<i>Passives Rauchen, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012.....</i>	101
<i>Passives Rauchen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012.....</i>	102
<i>Passives Rauchen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012.....</i>	103
2 Alkohol	105
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	106
<i>Anteile der täglich Alkoholkonsumierenden, nach Geschlecht</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	107
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	108
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	110
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	112
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012.....</i>	114
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	116
<i>Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012</i>	118

<i>Alkohol-Abstinenz, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	121
<i>Alkohol-Abstinenz, nach Alter</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	122
<i>Alkohol-Abstinenz, nach Alter</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	123
<i>Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	125
<i>Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	126
<i>Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012.....</i>	127
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	129
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	130
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	131
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	133
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	134
<i>Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	135
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	137
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	138
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	139
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	141
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	142
<i>Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	143
<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	145
<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012.....</i>	146

<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012</i>	147
<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012</i>	149
<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012</i>	150
<i>Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012</i>	151
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	153
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	154
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	155
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	157
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	158
<i>Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012</i>	159
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	161
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Alter</i>	
<i>Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	162
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	163
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	165
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	166
<i>Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012</i>	167
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme</i>	
<i>Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012</i>	168
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme</i>	
<i>bei 15-24-Jährigen, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012</i>	169
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012</i>	171
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter</i>	
<i>Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012</i>	172

<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012</i>	173
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012</i>	175
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012</i>	176
<i>Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012</i>	177
3 Medikamente	183
<i>Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmitteln</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	184
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	185
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	186
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	187
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	189
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	190
<i>Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	191
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	193
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	194
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	195
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	197
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	198
<i>Häufigkeit der Beruhigungsmittelleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	199
<i>Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schmerzmitteln, nach Geschlecht</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	200
<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	201

<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	202
<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	203
<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	205
<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	206
<i>Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012</i>	207
<i>Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	209
<i>Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	210
<i>Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	211
<i>Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	213
<i>Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	214
<i>Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	215
<i>Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	217
<i>Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	218
<i>Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit</i>	
<i>Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	219
4 Illegale Drogen	221
<i>Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>15-24-Jährige, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	222
<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	223
<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	224
<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	225
<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	227

<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012.....</i>	228
<i>Gebrauch von mindestens einer illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	229
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012.....</i>	235
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter</i>	
<i>Männer, Vergleich 1992-2012</i>	240
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter</i>	
<i>Frauen, Vergleich 1992-2012.....</i>	241
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012.....</i>	243
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Vergleich 1992-2012</i>	244
<i>Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Vergleich 1992-2012</i>	245
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	247
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	248
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	249
<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	251
<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	252
<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	253
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	254
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	255
<i>Ecstasygebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	255
<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	256


<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	257
<i>Ecstasygebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	257
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012.....</i>	259
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012.....</i>	260
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	261
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	263
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	264
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	265
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	266
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	267
<i>Kokaingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	267
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	268
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	269
<i>Kokaingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	269
<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012.....</i>	271
<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012.....</i>	272
<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012</i>	273
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	275
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	276
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	277

<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	278
<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	279
<i>Heroingebrauch, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	279
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	280
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	281
<i>Heroingebrauch, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	281
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	283
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	284
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	285
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	287
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012.....</i>	288
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012</i>	289
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	290
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	291
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	291
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	292
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012.....</i>	293
<i>Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion</i>	
<i>Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012</i>	293
5 Multipler Substanzgebrauch	295
<i>Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums</i>	
<i>Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012</i>	296

<i>Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus</i>	
<i>Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012</i>	298
<i>Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs</i>	
<i>Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012</i>	300
<i>Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln</i>	
<i>Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012</i>	302
<i>Häufigste Kombinationen multiples Substanzgebrauchs gemäss definierten Risikoschwellen</i>	
<i>Gesamtpopulation, Männer, Frauen, 2012</i>	304

1 Tabak


Anteile der Rauchenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

*Anteile der Rauchenden, nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012*



Frage: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

*Tabakkonsum, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Nie-Rauchende	60.6	47.5	49.3	47.6	43.3	47.4	60.9	50.3
	Ex-Rauchende	3.4	15.4	18.4	23.2	29.5	34.9	30.7	21.5
	Rauchende	36.1	37.1	32.3	29.2	27.1	17.7	8.4	28.2
	N (gewichtet)	2'829	3'377	3'625	4'119	3'062	2'428	2'145	21'584
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'596	4'321	3'263	2'846	1'956	21'591
2007	Nie-Rauchende	62.0	50.1	51.5	42.1	44.5	50.9	60.7	50.9
	Ex-Rauchende	4.4	13.3	18.9	26.6	30.4	32.6	31.4	21.2
	Rauchende	33.6	36.6	29.6	31.2	25.1	16.5	7.9	27.9
	N (gewichtet)	2'865	2'877	3'689	3'228	2'711	1'851	1'527	18'748
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'807	3'007	3'114	2'494	2'003	18'747
2002	Nie-Rauchende	57.8	51.6	45.1	39.5	44.6	54.5	64.7	49.6
	Ex-Rauchende	4.8	12.4	18.2	26.3	29.9	27.7	25.8	19.9
	Rauchende	37.4	36.0	36.7	34.1	25.4	17.9	9.5	30.5
	N (gewichtet)	2'763	3'364	3'931	3'250	2'732	2'104	1'552	19'697
	N (ungewichtet)	1'700	3'022	4'202	3'174	3'242	2'537	1'822	19'699
1997	Nie-Rauchende	52.3	48.2	39.9	39.4	46.9	55.9	63.6	47.6
	Ex-Rauchende	4.1	11.4	19.9	25.9	27.4	27.1	25.0	19.2
	Rauchende	43.6	40.4	40.2	34.7	25.7	17.0	11.4	33.2
	N (gewichtet)	1'786	2'501	2'465	2'197	1'639	1'392	1'013	12'994
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'508	1'958	1'682	1'512	1'056	12'994
1992	Nie-Rauchende	63.4	45.5	41.8	41.6	48.6	53.5	61.9	49.2
	Ex-Rauchende	5.7	16.3	22.3	26.4	26.4	28.6	27.4	20.8
	Rauchende	30.9	38.2	35.9	31.9	25.0	17.8	10.7	30.1
	N (gewichtet)	2'302	3'185	2'781	2'527	1'800	1'769	918	15'282
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'872	2'398	2'003	1'709	957	15'282

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Tabakkonsum, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Nie-Rauchende	57.1	43.3	41.6	44.0	37.2	35.5	39.7	43.0
	Ex-Rauchende	3.4	13.4	19.6	23.4	34.7	45.5	50.7	24.6
	Rauchende	39.6	43.3	38.8	32.6	28.0	19.0	9.7	32.4
	N (gewichtet)	1'440	1'708	1'814	2'084	1'535	1'156	839	10'575
	N (ungewichtet)	1'516	1'238	1'702	2'034	1'565	1'369	855	10'279
2007	Nie-Rauchende	59.8	44.2	48.0	38.6	33.8	33.9	34.8	43.4
	Ex-Rauchende	3.7	12.6	19.7	28.5	35.3	42.8	54.0	24.3
	Rauchende	36.6	43.2	32.3	32.8	30.8	23.3	11.2	32.3
	N (gewichtet)	1'476	1'419	1'843	1'620	1'343	859	599	9'158
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'422	1'399	1'008	759	8'416
2002	Nie-Rauchende	55.8	45.5	42.3	30.1	30.8	33.4	40.4	40.2
	Ex-Rauchende	4.3	12.3	17.8	30.1	38.9	42.0	44.5	23.9
	Rauchende	39.9	42.2	39.9	39.8	30.3	24.6	15.1	36.0
	N (gewichtet)	1'409	1'661	1'983	1'635	1'351	898	586	9'524
	N (ungewichtet)	857	1'361	2'059	1'448	1'408	1'064	708	8'905
1997	Nie-Rauchende	50.2	45.1	35.5	29.2	32.0	31.7	35.7	37.6
	Ex-Rauchende	(3.2)	9.8	20.1	30.2	37.2	43.8	44.4	23.3
	Rauchende	46.6	45.2	44.3	40.6	30.8	24.5	19.9	39.1
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	364	6'249
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	354	5'756
1992	Nie-Rauchende	58.2	43.8	36.1	26.9	30.6	26.6	29.4	37.6
	Ex-Rauchende	5.9	13.3	22.8	33.0	37.8	47.0	51.7	25.8
	Rauchende	35.9	42.8	41.1	40.1	31.6	26.4	18.9	36.5
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'374	1'210	859	824	391	7'357
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'395	1'091	859	677	334	6'854

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Tabakkonsum, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Nie-Rauchende	64.2	51.8	57.1	51.3	49.5	58.3	74.5	57.3
	Ex-Rauchende	3.4	17.4	17.2	23.0	24.3	25.3	17.8	18.6
	Rauchende	32.4	30.8	25.7	25.7	26.2	16.4	7.6	24.2
	N (gewichtet)	1'389	1'669	1'811	2'035	1'527	1'272	1'306	11'009
	N (ungewichtet)	1'476	1'379	1'894	2'287	1'698	1'477	1'101	11'312
2007	Nie-Rauchende	64.4	55.8	55.0	45.7	54.9	65.7	77.4	58.2
	Ex-Rauchende	5.1	13.9	18.1	24.7	25.6	23.7	16.9	18.2
	Rauchende	30.5	30.3	26.9	29.6	19.6	10.7	5.7	23.6
	N (gewichtet)	1'390	1'458	1'847	1'608	1'368	991	929	9'590
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'032	1'585	1'715	1'486	1'244	10'331
2002	Nie-Rauchende	59.9	57.6	48.0	49.1	58.1	70.2	79.4	58.4
	Ex-Rauchende	5.4	12.4	18.5	22.5	21.2	17.0	14.5	16.2
	Rauchende	34.8	30.0	33.5	28.4	20.7	12.8	6.1	25.5
	N (gewichtet)	1'355	1'703	1'948	1'615	1'381	1'206	966	10'173
	N (ungewichtet)	843	1'661	2'143	1'726	1'834	1'473	1'114	10'794
1997	Nie-Rauchende	54.4	51.2	44.4	49.5	61.5	74.0	79.2	56.8
	Ex-Rauchende	5.0	13.0	19.7	21.6	17.7	14.6	14.2	15.5
	Rauchende	40.5	35.7	35.9	28.9	20.7	11.4	6.6	27.8
	N (gewichtet)	887	1'260	1'220	1'107	826	796	649	6'745
	N (ungewichtet)	727	1'517	1'353	1'063	951	925	702	7'238
1992	Nie-Rauchende	68.8	47.0	47.3	55.2	65.1	77.0	86.1	59.9
	Ex-Rauchende	5.5	19.1	21.8	20.3	16.0	12.6	9.3	16.0
	Rauchende	25.7	33.9	30.9	24.5	18.9	10.3	4.6	24.1
	N (gewichtet)	1'138	1'649	1'407	1'318	941	945	526	7'924
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'144	1'032	623	8'428

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Tabakkonsum, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Nie-Rauchende	51.2	48.1	46.7	50.3
	Ex-Rauchende	21.3	21.8	23.1	21.5
	Rauchende	27.4	30.0	30.2	28.2
	<i>N (gewichtet)</i>	15'394	5'221	969	21'584
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'290	5'705	1'596	21'591
2007	Nie-Rauchende	51.4	48.8	53.8	50.9
	Ex-Rauchende	20.6	23.2	19.3	21.2
	Rauchende	27.9	28.0	26.9	27.9
	<i>N (gewichtet)</i>	13'484	4'409	856	18'748
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'479	5'724	1'544	18'747
2002	Nie-Rauchende	50.1	47.0	54.0	49.6
	Ex-Rauchende	19.7	20.8	17.8	19.9
	Rauchende	30.2	32.2	28.1	30.5
	<i>N (gewichtet)</i>	14'218	4'571	908	19'697
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'211	4'936	1'552	19'699
1997	Nie-Rauchende	48.7	43.5	50.3	47.6
	Ex-Rauchende	18.4	22.2	17.4	19.2
	Rauchende	32.9	34.3	32.2	33.2
	<i>N (gewichtet)</i>	9'292	3'084	618	12'994
	<i>N (ungewichtet)</i>	8'259	3'609	1'126	12'994
1992	Nie-Rauchende	50.6	45.2	46.9	49.2
	Ex-Rauchende	20.4	21.8	21.2	20.8
	Rauchende	29.0	33.0	31.9	30.1
	<i>N (gewichtet)</i>	10'970	3'595	717	15'282
	<i>N (ungewichtet)</i>	10'335	4'116	831	15'282

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Tabakkonsum, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Nie-Rauchende	43.3	43.0	38.2	43.0
	Ex-Rauchende	24.4	24.8	27.8	24.6
	Rauchende	32.3	32.2	34.0	32.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'656	2'469	451	10'575
	N (ungewichtet)	6'890	2'651	738	10'279
2007	Nie-Rauchende	43.7	41.7	47.5	43.4
	Ex-Rauchende	23.7	26.3	23.4	24.3
	Rauchende	32.6	32.0	29.1	32.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'598	2'157	403	9'158
	N (ungewichtet)	5'197	2'555	664	8'416
2002	Nie-Rauchende	40.6	38.1	44.2	40.2
	Ex-Rauchende	23.6	24.9	23.5	23.9
	Rauchende	35.9	37.0	32.3	36.0
	<i>N (gewichtet)</i>	6'983	2'117	424	9'524
	N (ungewichtet)	6'103	2'122	680	8'905
1997	Nie-Rauchende	38.5	34.1	41.0	37.6
	Ex-Rauchende	22.6	25.6	23.0	23.3
	Rauchende	38.9	40.3	35.9	39.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'532	1'440	276	6'249
	N (ungewichtet)	3'740	1'548	468	5'756
1992	Nie-Rauchende	38.7	34.9	34.4	37.6
	Ex-Rauchende	25.5	26.4	28.4	25.8
	Rauchende	35.8	38.7	37.2	36.5
	<i>N (gewichtet)</i>	5'310	1'709	338	7'357
	N (ungewichtet)	4'667	1'853	334	6'854

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.


*Tabakkonsum, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Nie-Rauchende	59.1	52.8	54.1	57.3
	Ex-Rauchende	18.3	19.1	19.0	18.6
	Rauchende	22.6	28.1	27.0	24.2
	N (gewichtet)	7'738	2'753	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'400	3'054	858	11'312
2007	Nie-Rauchende	58.9	55.7	59.4	58.2
	Ex-Rauchende	17.7	20.2	15.5	18.2
	Rauchende	23.4	24.1	25.0	23.6
	N (gewichtet)	6'886	2'252	452	9'590
	N (ungewichtet)	6'282	3'169	880	10'331
2002	Nie-Rauchende	59.3	54.6	62.6	58.4
	Ex-Rauchende	16.0	17.3	12.9	16.2
	Rauchende	24.6	28.1	24.5	25.5
	N (gewichtet)	7'235	2'454	484	10'173
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	Nie-Rauchende	58.4	51.7	57.9	56.8
	Ex-Rauchende	14.4	19.1	12.9	15.5
	Rauchende	27.2	29.2	29.2	27.8
	N (gewichtet)	4'759	1'644	342	6'745
	N (ungewichtet)	4'519	2'061	658	7'238
1992	Nie-Rauchende	61.8	54.6	58.0	59.9
	Ex-Rauchende	15.6	17.7	14.7	16.0
	Rauchende	22.6	27.8	27.2	24.1
	N (gewichtet)	5'660	1'886	379	7'924
	N (ungewichtet)	5'668	2'263	497	8'428

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
 Prozente werden gewichtet berechnet.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich Rauchende	22.7	26.5	23.5	22.2	20.8	13.4	6.7	20.4
	gelegentlich Rauchende	13.4	10.6	8.8	7.0	6.4	4.3	1.7	7.8
	Nicht-Rauchende	63.9	62.9	67.7	70.8	72.9	82.4	91.6	71.8
	N (gewichtet)	2'829	3'377	3'626	4'119	3'062	2'429	2'149	21'590
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'597	4'321	3'263	2'847	1'957	21'594
2007	täglich Rauchende	21.9	26.0	22.1	24.1	19.3	12.9	6.0	20.4
	gelegentlich Rauchende	11.7	10.6	7.4	7.1	5.8	3.6	1.9	7.4
	Nicht-Rauchende	66.4	63.4	70.4	68.8	74.9	83.5	92.1	72.2
	N (gewichtet)	2'864	2'877	3'687	3'226	2'712	1'852	1'531	18'750
	N (ungewichtet)	1'812	2'509	3'806	3'006	3'116	2'496	2'006	18'751

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich Rauchende	25.0	31.2	28.0	24.2	20.7	13.2	7.7	23.1
	gelegentlich Rauchende	14.6	12.1	10.8	8.4	7.4	5.8	(2.0)	9.3
	Nicht-Rauchende	60.4	56.7	61.2	67.4	72.0	81.0	90.3	67.6
	N (gewichtet)	1'440	1'708	1'815	2'084	1'535	1'156	839	10'576
	N (ungewichtet)	1'516	1'238	1'703	2'034	1'565	1'370	855	10'281
2007	täglich Rauchende	25.3	31.1	23.4	24.8	22.2	17.5	7.8	23.4
	gelegentlich Rauchende	11.3	12.1	8.9	8.0	8.5	5.8	(3.4)	8.9
	Nicht-Rauchende	63.4	56.8	67.7	67.2	69.2	76.7	88.8	67.7
	N (gewichtet)	1'476	1'419	1'841	1'618	1'344	860	600	9'159
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'774	1'421	1'401	1'010	761	8'420

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich Rauchende	20.2	21.7	19.0	20.1	20.9	13.5	6.0	17.8
	gelegentlich Rauchende	12.2	9.1	6.8	5.5	5.3	2.9	(1.6)	6.3
	Nicht-Rauchende	67.6	69.2	74.3	74.3	73.8	83.6	92.4	75.8
	N (gewichtet)	1'389	1'669	1'811	2'035	1'527	1'272	1'310	11'014
	N (ungewichtet)	1'476	1'379	1'894	2'287	1'698	1'477	1'102	11'313
2007	täglich Rauchende	18.3	21.1	20.9	23.4	16.5	9.0	4.8	17.6
	gelegentlich Rauchende	12.1	9.2	6.0	6.2	3.1	(1.7)	(0.9)	6.0
	Nicht-Rauchende	69.6	69.7	73.1	70.4	80.4	89.3	94.3	76.4
	N (gewichtet)	1'389	1'458	1'847	1'608	1'368	991	931	9'591
	N (ungewichtet)	889	1'379	2'032	1'585	1'715	1'486	1'245	10'331

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich Rauchende	19.6	22.1	24.5	20.4
	gelegentlich Rauchende	7.9	7.9	5.7	7.8
	Nicht-Rauchende	72.6	70.0	69.8	71.8
	<i>N (gewichtet)</i>	15'398	5'223	969	21'590
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'291	5'707	1'596	21'594
2007	täglich Rauchende	20.2	20.8	21.9	20.4
	gelegentlich Rauchende	7.7	7.2	5.0	7.4
	Nicht-Rauchende	72.1	72.1	73.1	72.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'486	4'408	856	18'750
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'482	5'725	1'544	18'751

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich Rauchende	22.3	24.3	28.3	23.1
	gelegentlich Rauchende	10.0	7.9	5.7	9.3
	Nicht-Rauchende	67.7	67.8	66.0	67.6
	N (gewichtet)	7'656	2'470	451	10'576
	N (ungewichtet)	6'890	2'653	738	10'281
2007	täglich Rauchende	23.4	23.4	23.2	23.4
	gelegentlich Rauchende	9.2	8.6	5.9	8.9
	Nicht-Rauchende	67.4	68.0	70.9	67.7
	N (gewichtet)	6'600	2'156	403	9'159
	N (ungewichtet)	5'200	2'556	664	8'420

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich Rauchende	16.8	20.2	21.2	17.8
	gelegentlich Rauchende	5.8	7.9	5.7	6.3
	Nicht-Rauchende	77.4	71.9	73.0	75.8
	N (gewichtet)	7'743	2'753	518	11'014
	N (ungewichtet)	7'401	3'054	858	11'313
2007	täglich Rauchende	17.1	18.2	20.8	17.6
	gelegentlich Rauchende	6.2	5.8	4.3	6.0
	Nicht-Rauchende	76.6	75.9	75.0	76.4
	N (gewichtet)	6'887	2'252	452	9'591
	N (ungewichtet)	6'282	3'169	880	10'331


Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Rauchen Sie täglich?'

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'


Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: Eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.3% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'


Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'


Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 1.8% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*



■ > ca. 20 Einheiten ■ ca. 20 Einheiten ■ ca. 10-15 Einheiten ■ ca. 1-5 Einheiten ■ gelegentlich Rauchende ■ Nicht-Rauchende

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: Eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten

Prozentwerte < 2.6% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteeinheiten* pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> ca. 20 Einheiten	(0.5)	1.0	1.8	2.6	2.8	1.1	-	1.6
	ca. 20 Einheiten	4.5	6.2	6.7	6.0	5.8	2.9	(1.1)	5.1
	ca. 15 Einheiten	2.7	3.8	4.0	3.4	3.2	1.7	(0.6)	3.0
	ca. 10 Einheiten	7.7	8.9	6.5	5.5	4.8	4.3	2.6	6.0
	ca. 5 Einheiten	8.0	7.1	4.8	4.5	4.2	3.4	1.9	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	3.6	3.4	2.0	2.0	1.5	1.3	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	9.1	7.4	6.5	4.7	4.7	2.8	(1.4)	5.5
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.2	73.1	82.5	91.7	71.7
	N (gewichtet)	2'736	3'234	3'479	3'953	2'931	2'352	1'976	20'661
	N (ungewichtet)	2'902	2'529	3'478	4'191	3'179	2'771	1'814	20'864
2007	> ca. 20 Einheiten	(1.4)	2.2	2.8	3.1	3.2	1.6	-	2.3
	ca. 20 Einheiten	4.1	6.2	6.2	6.8	5.3	2.8	(1.0)	5.1
	ca. 15 Einheiten	3.6	4.5	3.4	3.7	2.3	1.2	(0.7)	3.1
	ca. 10 Einheiten	6.6	7.5	5.2	5.6	4.7	3.4	1.9	5.3
	ca. 5 Einheiten	6.7	6.0	4.2	4.4	3.6	4.1	2.2	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	2.8	2.6	2.4	1.7	1.3	(1.0)	(0.7)	1.9
	gelegentlich Rauchende	7.9	8.4	5.5	5.2	4.5	2.6	(0.9)	5.4
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N (gewichtet)	2'670	2'697	3'476	3'020	2'584	1'759	1'364	17'569
	N (ungewichtet)	1'711	2'391	3'660	2'881	3'019	2'418	1'828	17'908
2002	> ca. 20 Einheiten	(2.1)	3.7	5.4	5.2	3.5	1.7	-	3.6
	ca. 20 Einheiten	5.5	8.6	9.3	8.6	5.7	2.7	(1.1)	6.7
	ca. 15 Einheiten	3.5	4.2	3.5	3.8	2.6	2.0	(1.1)	3.2
	ca. 10 Einheiten	7.8	6.7	6.7	5.0	4.0	3.7	2.2	5.5
	ca. 5 Einheiten	9.2	5.0	5.1	4.4	4.6	3.8	2.7	5.1
	ca. 1-2 Einheiten	3.7	2.8	2.1	2.3	1.4	(1.0)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	5.5	4.5	4.5	4.1	3.2	2.4	(1.1)	3.9
	Nicht-Rauchende	62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.3	69.8
	N (gewichtet)	2'600	3'161	3'729	3'079	2'599	2'007	1'389	18'564
	N (ungewichtet)	1'601	2'899	4'046	3'046	3'119	2'442	1'681	18'834

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter
 Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> ca. 20 Einheiten	2.2	4.5	7.0	7.3	4.8	2.4	(0.9)	4.7
	ca. 20 Einheiten	8.3	10.3	10.8	8.4	6.0	2.8	(2.5)	7.9
	ca. 15 Einheiten	3.7	3.4	3.1	3.7	2.6	(1.7)	-	3.0
	ca. 10 Einheiten	9.8	7.3	7.0	5.0	4.4	3.9	(2.1)	6.1
	ca. 5 Einheiten	8.3	6.8	5.2	4.8	2.9	3.3	(3.3)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	4.3	2.6	2.2	(1.4)	(1.4)	(0.8)	(0.8)	2.1
	gelegentlich Rauchende	7.3	5.6	4.8	4.0	3.0	(1.9)	(1.3)	4.4
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.8	65.4	74.9	83.1	88.5	66.7
	N (gewichtet)	1'765	2'448	2'413	2'159	1'597	1'339	948	12'670
	N (ungewichtet)	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	> ca. 20 Einheiten	2.5	5.0	6.8	5.9	5.2	2.3	-	4.6
	ca. 20 Einheiten	8.0	11.4	9.7	9.0	5.8	3.3	(1.2)	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.1	5.1	4.2	3.9	2.5	2.1	-	3.5
	ca. 10 Einheiten	7.0	6.9	6.1	5.4	4.9	3.1	(2.9)	5.6
	ca. 5 Einheiten	6.4	5.7	4.8	4.3	3.6	3.7	2.8	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.1	2.3	1.1	(0.7)	(1.2)	(1.2)	1.7
	gelegentlich Rauchende	2.0	2.2	1.8	2.4	1.7	(1.6)	-	1.9
	Nicht-Rauchende	68.9	61.6	64.3	68.1	75.6	82.7	89.5	69.9
	N (gewichtet)	2'169	3'063	2'660	2'430	1'717	1'675	830	14'542
	N (ungewichtet)	1'717	3'439	2'767	2'314	1'930	1'642	895	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> ca. 20 Einheiten	(0.7)	(1.4)	2.9	4.6	4.5	(1.5)	-	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.2	8.4	9.4	7.0	6.5	2.4	(1.9)	6.6
	ca. 15 Einheiten	3.2	4.5	4.6	4.1	3.5	(2.6)	-	3.6
	ca. 10 Einheiten	7.6	10.7	6.6	4.6	3.3	3.8	(2.9)	6.0
	ca. 5 Einheiten	7.9	7.1	4.7	4.0	3.1	3.0	(1.9)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	3.8	3.0	2.6	2.1	(1.0)	(1.4)	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	9.6	8.4	7.8	5.5	5.9	4.5	(1.4)	6.6
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.1	72.3	80.7	90.4	67.7
	N (gewichtet)	1'394	1'653	1'747	1'985	1'457	1'117	760	10'112
	N (ungewichtet)	1'475	1'203	1'648	1'958	1'515	1'326	780	9'905
2007	> ca. 20 Einheiten	(2.4)	3.5	3.9	3.6	5.4	2.9	-	3.5
	ca. 20 Einheiten	4.8	8.4	7.3	7.8	6.7	3.8	-	6.3
	ca. 15 Einheiten	5.2	5.8	4.1	3.6	(2.3)	(1.5)	-	3.7
	ca. 10 Einheiten	7.2	8.0	4.3	4.3	4.8	3.2	(2.6)	5.2
	ca. 5 Einheiten	6.0	6.3	3.7	4.4	2.9	6.4	(3.5)	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.8	2.6	2.1	(2.0)	(2.0)	(1.5)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	7.8	9.1	7.2	5.7	6.7	4.0	(1.4)	6.6
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.6	89.2	67.8
	N (gewichtet)	1'370	1'325	1'741	1'505	1'245	819	521	8'526
	N (ungewichtet)	862	1'073	1'700	1'347	1'325	968	661	7'936
2002	> ca. 20 Einheiten	(2.3)	6.2	7.6	8.5	5.0	(2.8)	-	5.5
	ca. 20 Einheiten	6.7	10.7	10.0	9.8	6.1	3.7	(1.5)	8.0
	ca. 15 Einheiten	(3.7)	5.4	3.4	4.4	3.5	(2.6)	(2.1)	3.8
	ca. 10 Einheiten	8.3	7.2	6.0	4.0	3.8	4.5	(3.0)	5.6
	ca. 5 Einheiten	9.6	3.7	5.1	3.9	4.8	5.2	(4.6)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	(3.6)	(2.7)	1.9	2.6	(1.5)	(1.1)	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.6	5.9	5.8	5.8	5.0	4.0	(1.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.2	70.2	76.0	87.1	64.4
	N (gewichtet)	1'321	1'547	1'866	1'523	1'235	827	493	8'813
	N (ungewichtet)	803	1'289	1'959	1'365	1'307	995	622	8'340

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> ca. 20 Einheiten	(2.7)	6.4	10.2	11.0	6.5	(4.4)	-	7.0
	ca. 20 Einheiten	9.7	12.7	11.5	8.5	6.5	(4.0)	(4.1)	9.2
	ca. 15 Einheiten	4.8	4.0	3.7	4.2	(3.4)	(2.2)	-	3.7
	ca. 10 Einheiten	11.4	6.6	5.7	4.2	4.9	5.0	(3.5)	6.2
	ca. 5 Einheiten	7.9	6.4	4.7	4.9	(2.8)	(4.3)	(6.4)	5.3
	ca. 1-2 Einheiten	(4.1)	2.4	(2.2)	(1.6)	-	-	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	6.2	6.6	6.2	5.9	4.4	(3.5)	-	5.6
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
	N (gewichtet)	888	1'213	1'220	1'070	783	565	333	6'071
	N (ungewichtet)	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	> ca. 20 Einheiten	(2.9)	7.3	10.1	9.5	9.0	4.6	-	7.2
	ca. 20 Einheiten	12.2	14.3	12.0	11.2	7.8	4.6	-	10.6
	ca. 15 Einheiten	(3.6)	6.0	4.9	3.9	(3.3)	(3.0)	-	4.2
	ca. 10 Einheiten	6.8	6.3	5.2	6.4	4.0	(4.5)	(4.3)	5.6
	ca. 5 Einheiten	7.3	5.2	3.7	4.2	(3.6)	(4.2)	(4.3)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	(1.5)	(1.5)	(2.6)	(1.3)	-	-	-	1.6
	gelegentlich Rauchende	(2.1)	2.3	2.5	4.0	(2.6)	(2.9)	-	2.7
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.4	63.3
	N (gewichtet)	1'090	1'461	1'279	1'148	796	762	338	6'873
	N (ungewichtet)	810	1'582	1'309	1'039	804	634	295	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteineinheiten* pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> ca. 20 Einheiten	-	-	(0.6)	(0.7)	(1.1)	(0.8)	-	0.7
	ca. 20 Einheiten	2.6	4.0	4.1	5.1	5.0	3.3	-	3.7
	ca. 15 Einheiten	(2.2)	3.1	3.4	2.7	3.0	(0.9)	-	2.4
	ca. 10 Einheiten	7.8	6.9	6.4	6.4	6.4	4.7	(2.4)	6.0
	ca. 5 Einheiten	8.0	7.0	4.9	4.9	5.2	3.8	(1.9)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	3.4	3.8	1.4	2.0	(1.9)	(1.2)	-	2.0
	gelegentlich Rauchende	8.5	6.5	5.2	3.9	3.6	(1.3)	(1.4)	4.4
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	84.0	92.5	75.6
	N (gewichtet)	1'342	1'581	1'732	1'968	1'474	1'235	1'217	10'549
	N (ungewichtet)	1'427	1'326	1'830	2'233	1'664	1'445	1'034	10'959
2007	> ca. 20 Einheiten	-	(0.8)	1.7	2.5	(1.2)	(0.5)	-	1.2
	ca. 20 Einheiten	3.4	4.0	5.1	5.8	4.0	1.9	(0.9)	3.9
	ca. 15 Einheiten	(1.9)	3.2	2.8	3.8	2.4	(0.9)	-	2.4
	ca. 10 Einheiten	6.0	6.9	-	7.0	4.6	3.6	(1.5)	5.4
	ca. 5 Einheiten	7.6	5.7	4.8	4.4	4.3	2.1	(1.4)	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	(2.9)	2.5	2.7	(1.4)	(0.7)	(0.5)	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	8.0	7.7	-	4.7	2.4	(1.3)	-	4.4
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N (gewichtet)	1'300	1'372	1'735	1'516	1'339	939	843	9'044
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'960	1'534	1'694	1'450	1'167	9'972
2002	> ca. 20 Einheiten	(1.9)	(1.4)	3.1	1.9	2.2	(1.0)	-	1.8
	ca. 20 Einheiten	4.3	6.6	8.7	7.4	5.3	2.0	(1.0)	5.6
	ca. 15 Einheiten	(3.3)	3.1	3.6	3.2	1.8	1.6	-	2.7
	ca. 10 Einheiten	7.3	6.1	7.5	6.0	4.1	3.1	(1.7)	5.5
	ca. 5 Einheiten	8.7	6.2	5.1	4.8	4.3	2.8	(1.6)	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	3.9	3.0	2.3	(1.9)	(1.3)	(1.0)	-	2.1
	gelegentlich Rauchende	5.5	3.2	3.2	2.5	1.4	(1.3)	(1.0)	2.7
	Nicht-Rauchende	65.1	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N (gewichtet)	1'280	1'614	1'863	1'556	1'364	1'180	896	9'752
	N (ungewichtet)	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Alter Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> ca. 20 Einheiten	(1.7)	2.7	3.8	3.7	3.1	(1.0)	-	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.8	7.9	10.2	8.3	5.4	(1.9)	(1.6)	6.6
	ca. 15 Einheiten	(2.7)	2.9	2.6	3.1	(1.9)	(1.3)	-	2.3
	ca. 10 Einheiten	8.1	8.0	8.4	5.7	3.9	3.2	-	6.0
	ca. 5 Einheiten	8.7	7.2	5.8	4.7	3.0	(2.6)	(1.6)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	4.6	2.8	2.3	(1.2)	(1.3)	-	-	2.0
	gelegentlich Rauchende	8.4	4.6	3.3	(2.1)	(1.7)	(0.7)	-	3.3
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
	N (gewichtet)	877	1'235	1'194	1'089	813	775	615	6'598
	N (ungewichtet)	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	> ca. 20 Einheiten	(2.1)	3.0	3.7	2.7	1.9	-	-	2.3
	ca. 20 Einheiten	3.6	8.7	7.6	7.0	4.1	(2.1)	-	5.6
	ca. 15 Einheiten	(2.5)	4.3	3.5	3.9	(1.8)	(1.4)	-	2.9
	ca. 10 Einheiten	7.3	7.5	6.9	4.5	5.7	(1.9)	(1.9)	5.6
	ca. 5 Einheiten	5.5	6.0	5.8	4.3	3.6	3.3	(1.7)	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	(2.8)	2.6	2.1	(1.0)	-	-	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	(2.0)	2.1	(1.1)	(0.9)	(1.0)	-	-	1.3
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N (gewichtet)	1'079	1'601	1'381	1'282	921	913	492	7'669
	N (ungewichtet)	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	> ca. 20 Einheiten	1.5	1.8	2.0	1.6
	ca. 20 Einheiten	4.9	5.5	6.2	5.1
	ca. 15 Einheiten	2.8	3.6	3.2	3.0
	ca. 10 Einheiten	5.9	6.2	6.3	6.0
	ca. 5 Einheiten	4.6	5.5	7.9	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	2.0	2.4	2.3	2.1
	gelegentlich Rauchende	5.7	5.3	2.8	5.5
	Nicht-Rauchende	72.6	69.7	69.3	71.7
	N (gewichtet)	14'753	4'982	927	20'661
	N (ungewichtet)	13'826	5'504	1'534	20'864
2007	> ca. 20 Einheiten	2.2	2.5	1.8	2.3
	ca. 20 Einheiten	5.1	5.1	5.1	5.1
	ca. 15 Einheiten	3.0	3.3	2.6	3.1
	ca. 10 Einheiten	5.3	5.4	6.3	5.3
	ca. 5 Einheiten	4.5	4.8	6.9	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	1.9	2.1	(1.8)	1.9
	gelegentlich Rauchende	5.7	5.0	2.9	5.4
	Nicht-Rauchende	72.3	71.8	72.8	72.2
	N (gewichtet)	12'691	4'081	798	17'569
	N (ungewichtet)	11'034	5'415	1'459	17'908
2002	> ca. 20 Einheiten	3.3	4.4	3.5	3.6
	ca. 20 Einheiten	6.6	7.1	5.9	6.7
	ca. 15 Einheiten	3.2	3.5	2.3	3.2
	ca. 10 Einheiten	5.3	6.0	6.6	5.5
	ca. 5 Einheiten	5.0	5.5	4.7	5.1
	ca. 1-2 Einheiten	2.2	2.0	(2.4)	2.1
	gelegentlich Rauchende	4.3	3.2	2.0	3.9
	Nicht-Rauchende	70.2	68.3	72.6	69.8
	N (gewichtet)	13'391	4'343	830	18'564
	N (ungewichtet)	12'656	4'737	1'441	18'834

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
 Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
	%	%	%	%	
1997	> ca. 20 Einheiten	4.5	5.4	3.7	4.7
	ca. 20 Einheiten	7.7	8.6	7.5	7.9
	ca. 15 Einheiten	2.7	3.5	4.3	3.0
	ca. 10 Einheiten	5.9	6.2	7.7	6.1
	ca. 5 Einheiten	5.4	4.7	5.1	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.0	(1.8)	2.1
	gelegentlich Rauchende	4.7	3.9	(2.2)	4.4
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N (gewichtet)	9'023	3'035	612	12'670
	N (ungewichtet)	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	> ca. 20 Einheiten	4.2	5.9	4.5	4.6
	ca. 20 Einheiten	7.9	8.2	8.2	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.5	3.5	(3.7)	3.5
	ca. 10 Einheiten	5.5	6.0	5.8	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.5	5.1	6.7	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	2.0	(2.7)	1.7
	gelegentlich Rauchende	1.8	2.5	-	1.9
	Nicht-Rauchende	71.1	66.8	67.9	69.9
	N (gewichtet)	10'509	3'347	685	14'542
	N (ungewichtet)	10'010	3'892	802	14'704

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
 Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Deutsch	Sprachregion	Gesamt	
		%	Französisch	Italienisch	%
2012	> ca. 20 Einheiten	2.4	3.1	(3.2)	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.4	6.7	8.7	6.6
	ca. 15 Einheiten	3.4	4.1	(4.1)	3.6
	ca. 10 Einheiten	6.0	5.7	6.2	6.0
	ca. 5 Einheiten	4.5	5.0	8.1	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	2.2	2.3	(1.6)	2.2
	gelegentlich Rauchende	7.2	5.4	(2.6)	6.6
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N (gewichtet)	7'341	2'342	430	10'112
	N (ungewichtet)	6'657	2'543	705	9'905
2007	> ca. 20 Einheiten	3.5	3.5	(2.5)	3.5
	ca. 20 Einheiten	6.6	5.7	5.6	6.3
	ca. 15 Einheiten	3.8	3.7	(2.5)	3.7
	ca. 10 Einheiten	5.2	5.0	6.4	5.2
	ca. 5 Einheiten	4.2	5.8	7.4	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.2	(1.9)	2.1
	gelegentlich Rauchende	6.9	6.2	(3.1)	6.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.1	70.7	67.8
	N (gewichtet)	6'187	1'969	370	8'526
	N (ungewichtet)	4'947	2'376	613	7'936
2002	> ca. 20 Einheiten	5.0	7.1	5.8	5.5
	ca. 20 Einheiten	8.2	7.6	6.5	8.0
	ca. 15 Einheiten	3.8	4.2	(2.0)	3.8
	ca. 10 Einheiten	5.6	5.3	6.8	5.6
	ca. 5 Einheiten	5.1	5.9	(4.5)	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.1	2.4	(3.3)	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.9	3.8	(2.2)	5.3
	Nicht-Rauchende	64.4	63.6	69.0	64.4
	N (gewichtet)	6'473	1'968	371	8'813
	N (ungewichtet)	5'743	1'990	607	8'340

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
1997	> ca. 20 Einheiten	6.9	7.5	5.4	7.0
	ca. 20 Einheiten	8.9	10.1	9.0	9.2
	ca. 15 Einheiten	3.3	4.5	(5.6)	3.7
	ca. 10 Einheiten	6.0	6.4	6.5	6.2
	ca. 5 Einheiten	5.5	4.9	(5.1)	5.3
	ca. 1-2 Einheiten	2.3	2.1	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.9	4.9	(3.0)	5.6
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
	N (gewichtet)	4'386	1'412	273	6'071
	N (ungewichtet)	3'643	1'520	463	5'626
1992	> ca. 20 Einheiten	6.6	9.2	(6.6)	7.2
	ca. 20 Einheiten	10.7	10.1	12.1	10.6
	ca. 15 Einheiten	4.1	4.0	(5.9)	4.2
	ca. 10 Einheiten	5.5	6.3	(5.1)	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.7	5.0	(4.1)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	1.7	-	1.6
	gelegentlich Rauchende	2.7	3.1	-	2.7
	Nicht-Rauchende	64.3	60.6	62.2	63.3
	N (gewichtet)	5'011	1'544	318	6'873
	N (ungewichtet)	4'457	1'700	316	6'473

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
 Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	> ca. 20 Einheiten	0.6	(0.7)	-	0.7
	ca. 20 Einheiten	3.5	4.3	4.0	3.7
	ca. 15 Einheiten	2.2	3.0	(2.4)	2.4
	ca. 10 Einheiten	5.7	6.6	6.3	6.0
	ca. 5 Einheiten	4.8	5.9	7.8	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	1.8	2.5	(2.9)	2.0
	gelegentlich Rauchende	4.2	5.3	(2.9)	4.4
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N (gewichtet)	7'412	2'640	497	10'549
	N (ungewichtet)	7'169	-	829	10'959
2007	> ca. 20 Einheiten	1.0	1.6	(1.1)	1.2
	ca. 20 Einheiten	3.7	4.5	4.6	3.9
	ca. 15 Einheiten	2.3	3.0	(2.7)	2.4
	ca. 10 Einheiten	5.3	5.8	6.2	5.4
	ca. 5 Einheiten	4.7	3.9	6.4	4.6
	ca. 1-2 Einheiten	1.7	2.0	(1.6)	1.7
	gelegentlich Rauchende	4.6	4.0	(2.7)	4.4
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.7	76.3
	N (gewichtet)	6'504	2'112	428	9'044
	N (ungewichtet)	6'087	3'039	846	9'972
2002	> ca. 20 Einheiten	1.7	2.1	(1.6)	1.8
	ca. 20 Einheiten	5.2	6.6	5.5	5.6
	ca. 15 Einheiten	2.5	3.0	(2.6)	2.7
	ca. 10 Einheiten	5.0	6.6	6.5	5.5
	ca. 5 Einheiten	5.0	5.1	4.8	5.0
	ca. 1-2 Einheiten	2.3	1.6	(1.7)	2.1
	gelegentlich Rauchende	2.7	2.8	(1.8)	2.7
	Nicht-Rauchende	75.6	72.2	75.5	74.7
	N (gewichtet)	6'918	2'375	459	9'752
	N (ungewichtet)	6'913	2'747	834	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteinheiten* pro Tag, nach Sprachregion
 Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
1997	> ca. 20 Einheiten	2.2	3.7	(2.4)	2.6
	ca. 20 Einheiten	6.4	7.2	6.3	6.6
	ca. 15 Einheiten	2.1	2.6	(3.2)	2.3
	ca. 10 Einheiten	5.8	6.0	8.6	6.0
	ca. 5 Einheiten	5.4	4.5	5.0	5.2
	ca. 1-2 Einheiten	2.0	1.9	(1.9)	2.0
	gelegentlich Rauchende	3.5	3.1	-	3.3
	Nicht-Rauchende	72.5	71.0	71.0	72.1
	N (gewichtet)	4'637	1'622	339	6'598
	N (ungewichtet)	4'434	2'041	654	7'129
1992	> ca. 20 Einheiten	2.0	3.1	(2.7)	2.3
	ca. 20 Einheiten	5.3	6.6	(4.8)	5.6
	ca. 15 Einheiten	2.9	3.1	(1.8)	2.9
	ca. 10 Einheiten	5.5	5.7	6.4	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.3	5.2	9.0	4.7
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	2.2	-	1.7
	gelegentlich Rauchende	1.1	1.9	-	1.3
	Nicht-Rauchende	77.3	72.1	72.8	75.9
	N (gewichtet)	5'499	1'803	368	7'669
	N (ungewichtet)	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.

* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillo entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteinheiten

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	(0.4)	(0.6)	(0.6)	(0.3)	-	0.3
	21-30 Zigaretten	(0.4)	(0.8)	1.2	1.9	1.7	(0.5)	-	1.1
	16-20 Zigaretten	4.6	6.2	6.8	6.2	5.7	3.2	(1.3)	5.2
	11-15 Zigaretten	3.3	4.8	4.4	3.6	3.6	1.5	(0.5)	3.4
	6-10 Zigaretten	9.1	10.1	6.8	6.1	5.1	3.7	2.6	6.5
	1-5 Zigaretten	9.1	8.1	5.6	5.0	3.7	3.2	(1.2)	5.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.4	6.3	4.7	2.9	2.4	(1.0)	(0.9)	3.8
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	2.1	1.3	2.5	2.5	3.9	4.1	1.5	2.5
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.4	91.7	71.7
	N gewichtet	2'736	3'234	3'479	3'953	2'931	2'353	1'976	20'663
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'478	4'192	3'180	2'772	1'814	20'867
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	-	(0.6)	0.8	1.0	(0.8)	(0.3)	-	0.6
	21-30 Zigaretten	(1.0)	1.4	1.5	1.8	1.5	(0.6)	-	1.3
	16-20 Zigaretten	4.6	6.3	6.6	7.3	5.1	2.9	(0.9)	5.3
	11-15 Zigaretten	4.3	4.6	3.2	4.1	2.8	1.3	(0.7)	3.3
	6-10 Zigaretten	7.1	9.1	5.7	5.5	4.3	3.4	(1.2)	5.6
	1-5 Zigaretten	7.6	6.6	5.6	4.4	3.2	2.5	1.6	4.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.6	6.5	3.3	3.1	1.5	(1.1)	(0.6)	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.6)	2.0	2.7	3.2	5.3	4.4	2.5	3.1
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N gewichtet	2'671	2'697	3'476	3'020	2'584	1'760	1'364	17'571
	N ungewichtet	1'713	2'391	3'660	2'880	3'020	2'419	1'828	17'911
2002	> 40 Zigaretten	-	-	(0.2)	(0.3)	-	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	-	(0.8)	1.7	1.5	0.9	(0.3)	-	1.0
	21-30 Zigaretten	(1.4)	2.5	3.2	3.0	2.0	(0.8)	-	2.1
	16-20 Zigaretten	5.5	9.0	9.4	8.2	5.6	2.7	(1.1)	6.7
	11-15 Zigaretten	4.1	4.7	3.9	4.2	2.7	2.0	(0.9)	3.5
	6-10 Zigaretten	9.8	7.1	7.1	4.6	3.7	3.4	2.1	5.8
	1-5 Zigaretten	10.3	6.4	5.3	4.8	3.7	2.7	(1.7)	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.9	3.0	2.6	1.9	1.2	(1.1)	(0.4)	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.7)	1.9	3.2	4.8	5.0	4.3	2.5	3.2
	Nicht-Rauchende	62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.2	69.8
	N gewichtet	2'600	3'161	3'731	3'080	2'599	2'007	1'390	18'569
	N ungewichtet	1'601	2'899	4'047	3'048	3'119	2'442	1'682	18'838

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
 Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> 40 Zigaretten	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	(0.5)	1.5	2.2	2.5	(1.6)	-	-	1.5
	21-30 Zigaretten	(1.4)	2.7	3.9	3.5	1.9	(0.7)	-	2.4
	16-20 Zigaretten	8.5	10.4	11.0	8.9	5.7	2.9	(2.5)	8.0
	11-15 Zigaretten	4.7	4.3	4.3	3.3	2.7	(1.8)	-	3.4
	6-10 Zigaretten	11.0	7.4	6.5	5.2	3.2	3.7	(1.9)	6.0
	1-5 Zigaretten	10.3	7.9	6.1	3.9	2.8	2.4	(2.0)	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.6	4.5	2.7	1.5	(1.5)	(0.8)	-	2.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.7)	1.6	3.1	5.3	5.3	3.7	3.6	3.2
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.8	65.4	74.9	83.1	88.5	66.7
1992	N gewichtet	1'765	2'448	2'413	2'159	1'597	1'339	948	12'670
	N ungewichtet	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	> 40 Zigaretten	-	(0.6)	(0.7)	(0.6)	-	-	-	0.4
	31-40 Zigaretten	(0.7)	1.7	1.8	2.0	(1.4)	-	-	1.3
	21-30 Zigaretten	1.9	2.8	3.9	2.7	2.1	(0.8)	-	2.4
	16-20 Zigaretten	8.1	11.5	9.7	8.7	5.6	3.1	-	7.9
	11-15 Zigaretten	3.4	5.7	4.3	3.7	2.5	2.1	-	3.7
	6-10 Zigaretten	7.9	7.6	6.5	4.7	4.9	2.9	(2.2)	5.8
	1-5 Zigaretten	7.1	5.9	5.1	3.5	2.0	2.7	(1.9)	4.5
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	1.9	1.8	0.9	(0.6)	(1.1)	(0.7)	-	1.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	(0.8)	2.8	5.3	4.4	4.3	4.3	2.9
	Nicht-Rauchende	68.9	61.6	64.3	68.1	75.6	82.7	89.4	69.9
1992	N gewichtet	2'169	3'063	2'660	2'430	1'717	1'675	830	14'543
	N ungewichtet	1'717	3'440	2'767	2'314	1'930	1'642	896	14'706

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.

Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.

Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	-	(1.0)	(1.0)	-	-	0.5
	21-30 Zigaretten	(0.6)	(1.3)	2.0	3.2	2.5	-	-	1.7
	16-20 Zigaretten	6.2	8.1	9.4	7.2	6.5	2.7	(1.7)	6.6
	11-15 Zigaretten	4.0	5.9	5.2	4.2	3.2	(1.8)	(1.0)	4.0
	6-10 Zigaretten	9.0	11.4	6.3	4.7	3.1	2.2	(2.2)	6.0
	1-5 Zigaretten	9.1	8.0	6.1	4.7	2.2	2.5	-	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.9	6.6	4.5	2.3	(1.5)	(0.8)	-	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.2	2.0	4.5	4.5	7.3	8.2	3.8	4.7
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.1	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	1'394	1'653	1'747	1'985	1'457	1'118	760	10'114
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'648	1'959	1'516	1'327	780	9'908
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	31-40 Zigaretten	-	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.5)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	(1.7)	(2.3)	2.1	1.9	(2.3)	(1.0)	-	1.8
	16-20 Zigaretten	5.2	8.6	8.2	8.3	6.3	3.9	-	6.6
	11-15 Zigaretten	5.7	5.8	3.1	3.6	(2.4)	(1.2)	-	3.6
	6-10 Zigaretten	8.2	9.8	4.7	4.1	3.9	(3.0)	(1.0)	5.5
	1-5 Zigaretten	6.2	6.6	4.7	4.1	2.4	3.3	(1.4)	4.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.9	5.7	3.3	2.4	(1.3)	-	-	3.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(2.6)	3.7	4.9	5.6	10.3	9.5	6.4	5.8
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
	N gewichtet	1'371	1'325	1'741	1'505	1'245	820	521	8'528
	N ungewichtet	864	1'073	1'700	1'347	1'325	969	661	7'939
2002	> 40 Zigaretten	-	-	(0.3)	(0.5)	-	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	-	(1.4)	2.2	2.4	(1.2)	-	-	1.4
	21-30 Zigaretten	(1.6)	4.1	4.6	4.6	2.4	-	-	3.2
	16-20 Zigaretten	6.7	11.3	10.0	9.1	5.8	3.5	(1.5)	7.9
	11-15 Zigaretten	4.3	5.6	3.8	4.5	2.9	(2.1)	-	3.9
	6-10 Zigaretten	10.7	7.2	5.9	3.0	3.0	3.5	(2.7)	5.5
	1-5 Zigaretten	9.9	5.2	4.8	4.0	2.9	(2.3)	-	4.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.4	3.0	2.5	(1.5)	(1.2)	-	-	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.3)	3.5	5.8	9.2	10.2	10.0	5.9	6.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.1	70.2	76.1	86.8	64.4
	N gewichtet	1'321	1'547	1'868	1'524	1'235	827	495	8'817
	N ungewichtet	803	1'289	1'960	1'367	1'307	995	623	8'344

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.5)
	31-40 Zigaretten	-	2.1	3.2	3.4	(1.6)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(1.4)	3.6	5.4	5.1	(2.6)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	10.1	12.9	11.8	9.2	6.0	(4.3)	(4.0)	9.4
	11-15 Zigaretten	6.0	4.9	4.9	(3.2)	(2.7)	(2.2)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	11.4	6.9	4.9	3.5	(2.5)	(3.8)	-	5.4
	1-5 Zigaretten	10.6	6.8	5.0	3.7	(2.1)	(2.7)	(2.6)	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.2	4.5	2.3	(1.1)	-	-	-	2.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	3.0	5.8	10.3	10.7	8.8	10.3	6.5
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
1992	N gewichtet	888	1'213	1'220	1'070	783	565	333	6'071
	N ungewichtet	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
	> 40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.2)	(1.0)	-	-	-	0.8
	31-40 Zigaretten	-	2.4	2.6	3.4	(2.4)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(2.4)	3.9	5.3	3.8	(2.8)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	12.5	14.3	11.7	10.3	7.1	4.6	-	10.4
	11-15 Zigaretten	3.9	6.6	4.6	3.3	(2.1)	(3.0)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	7.7	6.6	5.4	4.9	(3.6)	(2.5)	-	5.2
	1-5 Zigaretten	7.2	4.8	3.8	(2.3)	(1.6)	(2.5)	-	3.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(1.9)	(1.6)	(0.8)	-	-	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	(1.6)	5.8	11.0	9.5	9.5	10.6	6.0
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.2	63.3
	N gewichtet	1'090	1'462	1'279	1'148	796	762	338	6'874
	N ungewichtet	810	1'583	1'309	1'039	804	634	296	6'475

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	21-30 Zigaretten	-	-	(0.4)	(0.6)	(0.9)	-	-	0.5
	16-20 Zigaretten	3.0	4.1	4.2	5.2	5.0	3.6	(1.0)	3.9
	11-15 Zigaretten	2.6	3.7	3.6	3.0	4.0	(1.2)	-	2.8
	6-10 Zigaretten	9.2	8.7	7.3	7.5	7.0	4.9	(2.9)	7.0
	1-5 Zigaretten	9.0	8.2	5.1	5.3	5.2	3.9	(1.5)	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.9	6.1	4.8	3.4	3.2	(1.1)	(1.3)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.9)	-	-	(0.5)	(0.6)	-	-	0.5
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	84.0	92.5	75.6
	N gewichtet	1'342	1'581	1'732	1'968	1'474	1'235	1'217	10'549
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'830	2'233	1'664	1'445	1'034	10'959
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	-	(0.6)	(0.7)	-	-	-	0.3
	21-30 Zigaretten	-	-	(1.0)	1.8	(0.7)	-	-	0.8
	16-20 Zigaretten	3.9	4.1	5.1	6.3	4.1	2.0	(0.9)	4.1
	11-15 Zigaretten	(2.8)	3.4	3.3	4.5	3.1	(1.3)	-	3.0
	6-10 Zigaretten	5.8	8.4	6.6	6.9	4.6	3.8	(1.4)	5.7
	1-5 Zigaretten	9.1	6.5	6.4	4.6	4.0	1.9	(1.8)	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.4	7.4	3.4	3.8	1.8	(1.3)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	(0.8)	(0.7)	-	-	0.5
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N gewichtet	1'300	1'372	1'735	1'515	1'339	939	843	9'044
	N ungewichtet	849	1'318	1'960	1'533	1'695	1'450	1'167	9'972
2002	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	(1.2)	(0.6)	(0.6)	-	-	0.6
	21-30 Zigaretten	-	(1.0)	1.8	(1.4)	(1.6)	(0.7)	-	1.2
	16-20 Zigaretten	4.3	6.7	8.8	7.3	5.3	2.1	(0.9)	5.6
	11-15 Zigaretten	3.9	3.9	4.1	3.9	2.6	1.8	-	3.2
	6-10 Zigaretten	8.8	6.9	8.4	6.2	4.2	3.4	(1.8)	6.1
	1-5 Zigaretten	10.6	7.4	5.8	5.5	4.5	2.9	(1.7)	5.7
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.4	2.9	2.7	2.2	(1.3)	(1.2)	-	2.4
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.4
	Nicht-Rauchende	65.1	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N gewichtet	1'280	1'614	1'863	1'556	1'364	1'180	896	9'752
	N ungewichtet	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
 Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(0.9)	(1.2)	(1.6)	(1.6)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	-	1.8	2.3	(2.0)	(1.2)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	6.8	7.9	10.2	8.5	5.4	(1.9)	(1.6)	6.7
	11-15 Zigaretten	(3.3)	3.7	3.6	3.5	(2.8)	(1.6)	-	2.9
	6-10 Zigaretten	10.6	7.9	8.0	7.0	3.9	3.6	(1.8)	6.6
	1-5 Zigaretten	10.1	9.1	7.2	4.2	3.3	(2.2)	(1.6)	5.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	8.1	4.4	3.1	(1.8)	(1.7)	(0.7)	-	3.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
1992	N gewichtet	877	1'235	1'194	1'089	813	775	615	6'598
	N ungewichtet	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.0)	(0.7)	(0.5)	-	-	0.7
	21-30 Zigaretten	(1.5)	1.8	2.6	(1.7)	(1.5)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	3.7	8.9	7.8	7.4	4.3	(1.9)	-	5.8
	11-15 Zigaretten	2.8	4.9	4.1	4.0	2.9	(1.3)	-	3.4
	6-10 Zigaretten	8.1	8.5	7.5	4.6	6.1	3.3	(2.0)	6.3
	1-5 Zigaretten	7.0	6.9	6.3	4.6	2.4	2.8	(1.9)	5.1
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(2.0)	2.0	(1.0)	(0.8)	(1.0)	-	-	1.2
Anmerkungen:	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N gewichtet	1'079	1'601	1'381	1'282	921	913	492	7'669
	N ungewichtet	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.

Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.

Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 40 Zigaretten	0.1	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	0.3	0.5	(0.6)	0.3
	21-30 Zigaretten	1.1	1.0	(1.4)	1.1
	16-20 Zigaretten	5.0	5.7	6.1	5.2
	11-15 Zigaretten	3.2	3.8	3.5	3.4
	6-10 Zigaretten	6.2	7.0	8.0	6.5
	1-5 Zigaretten	4.9	6.1	7.8	5.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.9	4.1	2.0	3.8
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	2.8	2.0	(1.2)	2.5
	Nicht-Rauchende	72.6	69.7	69.3	71.7
	N gewichtet	14'754	4'982	927	20'663
	N ungewichtet	13'828	5'505	1'534	20'867
2007	> 40 Zigaretten	(0.2)	(0.2)	-	0.2
	31-40 Zigaretten	0.6	0.8	-	0.6
	21-30 Zigaretten	1.3	1.3	(1.3)	1.3
	16-20 Zigaretten	5.4	5.2	5.1	5.3
	11-15 Zigaretten	3.2	3.6	3.4	3.3
	6-10 Zigaretten	5.4	5.8	7.3	5.6
	1-5 Zigaretten	4.7	5.3	5.9	4.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.7	3.5	2.2	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.4	2.5	(1.4)	3.1
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.2
	N gewichtet	12'690	4'083	798	17'571
	N ungewichtet	11'033	5'419	1'459	17'911
2002	> 40 Zigaretten	(0.2)	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	0.9	1.2	(0.8)	1.0
	21-30 Zigaretten	1.9	2.9	2.2	2.1
	16-20 Zigaretten	6.6	7.0	5.8	6.7
	11-15 Zigaretten	3.4	4.1	2.9	3.5
	6-10 Zigaretten	5.6	6.2	6.7	5.8
	1-5 Zigaretten	5.2	5.6	5.3	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.5	2.2	(1.5)	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.6	2.4	(1.9)	3.2
	Nicht-Rauchende	70.2	68.2	72.6	69.8
	N gewichtet	13'393	4'345	830	18'569
	N ungewichtet	12'658	4'739	1'441	18'838

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
1997	> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	1.3	2.0	(1.6)	1.5
	21-30 Zigaretten	2.3	2.8	(1.5)	2.4
	16-20 Zigaretten	7.9	8.5	7.7	8.0
	11-15 Zigaretten	3.1	4.1	5.5	3.4
	6-10 Zigaretten	5.8	6.2	8.0	6.0
	1-5 Zigaretten	5.6	5.4	4.9	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.0	2.8	(1.4)	2.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.7	2.3	(1.2)	3.2
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N gewichtet	9'023	3'035	612	12'670
	N ungewichtet	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	> 40 Zigaretten	0.4	(0.6)	-	0.4
	31-40 Zigaretten	1.2	1.8	(2.0)	1.3
	21-30 Zigaretten	2.2	3.0	(2.1)	2.4
	16-20 Zigaretten	7.8	8.2	8.1	7.9
	11-15 Zigaretten	3.6	3.7	4.4	3.7
	6-10 Zigaretten	5.6	6.3	6.3	5.8
	1-5 Zigaretten	4.1	5.1	7.5	4.5
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	1.0	1.7	-	1.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.0	2.8	-	2.9
	Nicht-Rauchende	71.1	66.8	67.9	69.9
	N gewichtet	10'511	3'347	685	14'543
	N ungewichtet	10'012	3'892	802	14'706

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.

Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.

Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	> 40 Zigaretten	(0.1)	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	0.4	(1.0)	-	0.5
	21-30 Zigaretten	1.7	1.6	(2.4)	1.7
	16-20 Zigaretten	6.4	7.0	8.4	6.6
	11-15 Zigaretten	3.8	4.2	(4.5)	4.0
	6-10 Zigaretten	5.8	6.1	7.7	6.0
	1-5 Zigaretten	4.9	5.7	7.2	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.9	3.1	-	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	5.1	3.7	(2.4)	4.7
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N gewichtet	7'342	2'342	430	10'114
	N ungewichtet	6'659	2'544	705	9'908
2007	> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-	(0.3)
	31-40 Zigaretten	0.9	1.1	-	0.9
	21-30 Zigaretten	1.9	1.5	(2.0)	1.8
	16-20 Zigaretten	7.0	5.8	5.5	6.6
	11-15 Zigaretten	3.6	3.6	(2.8)	3.6
	6-10 Zigaretten	5.2	5.8	8.3	5.5
	1-5 Zigaretten	4.0	5.7	5.5	4.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.2	3.4	(2.3)	3.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	6.3	4.8	(2.4)	5.8
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.8
	N gewichtet	6'187	1'971	370	8'528
	N ungewichtet	4'947	2'379	613	7'939
2002	> 40 Zigaretten	(0.3)	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	1.2	2.1	(1.3)	1.4
	21-30 Zigaretten	2.8	4.5	(3.6)	3.2
	16-20 Zigaretten	8.1	7.5	6.1	7.9
	11-15 Zigaretten	3.8	4.4	(2.3)	3.9
	6-10 Zigaretten	5.5	5.4	6.5	5.5
	1-5 Zigaretten	4.5	5.8	(5.3)	4.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.4	1.9	(1.4)	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	7.0	4.7	(4.1)	6.3
	Nicht-Rauchende	64.4	63.5	69.0	64.4
	N gewichtet	6'475	1'971	371	8'817
	N ungewichtet	5'745	1'992	607	8'344

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
1997	> 40 Zigaretten	(0.5)	-	-	(0.5)
	31-40 Zigaretten	1.9	2.7	(2.3)	2.1
	21-30 Zigaretten	3.4	3.5	-	3.3
	16-20 Zigaretten	9.3	10.0	9.3	9.4
	11-15 Zigaretten	3.6	4.7	(6.5)	4.0
	6-10 Zigaretten	5.0	6.4	7.2	5.4
	1-5 Zigaretten	5.2	5.3	(4.3)	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.7	2.4	-	2.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	7.3	4.8	(2.8)	6.5
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
1992	N gewichtet	4'386	1'412	273	6'071
	N ungewichtet	3'643	1'520	463	5'626
	> 40 Zigaretten	0.8	(1.1)	-	0.8
	31-40 Zigaretten	1.9	2.3	(3.3)	2.1
	21-30 Zigaretten	3.0	4.5	(2.6)	3.3
	16-20 Zigaretten	10.4	9.9	11.9	10.4
	11-15 Zigaretten	3.9	4.0	(6.0)	4.0
	6-10 Zigaretten	5.0	6.1	(5.1)	5.2
	1-5 Zigaretten	3.6	4.0	(6.4)	3.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	1.0	1.5	-	1.1
Fragen:	Rauchen Sie, wenn auch nur selten? und Was rauchen Sie? und Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?	6.2	5.9	-	6.0
	Nicht-Rauchende	64.2	60.6	62.2	63.3
	N gewichtet	5'012	1'544	318	6'874
Anmerkungen:	Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen. Spaltenprozente.	4'459	1'700	316	6'475
	Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.				

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 40 Zigaretten	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	(0.1)	-	-	(0.1)
	21-30 Zigaretten	0.5	(0.5)	-	0.5
	16-20 Zigaretten	3.6	4.6	4.1	3.9
	11-15 Zigaretten	2.6	3.4	(2.7)	2.8
	6-10 Zigaretten	6.6	7.7	8.3	7.0
	1-5 Zigaretten	5.0	6.6	8.3	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.9	4.9	(2.8)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	0.5	(0.5)	-	0.5
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N gewichtet	7'412	2'640	497	10'549
	N ungewichtet	7'169	2'961	829	10'959
2007	> 40 Zigaretten	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	21-30 Zigaretten	0.6	1.2	-	0.8
	16-20 Zigaretten	3.9	4.7	4.9	4.1
	11-15 Zigaretten	2.8	3.6	3.9	3.0
	6-10 Zigaretten	5.6	5.9	6.5	5.7
	1-5 Zigaretten	5.3	5.0	6.3	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.1	3.6	(2.2)	3.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	0.5	(0.4)	-	0.5
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.7	76.3
	N gewichtet	6'503	2'112	428	9'044
	N ungewichtet	6'086	3'040	846	9'972
2002	> 40 Zigaretten	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	0.6	(0.6)	-	0.6
	21-30 Zigaretten	1.1	1.5	(1.1)	1.2
	16-20 Zigaretten	5.2	6.7	5.5	5.6
	11-15 Zigaretten	3.0	3.9	3.3	3.2
	6-10 Zigaretten	5.7	6.9	6.9	6.1
	1-5 Zigaretten	5.9	5.3	5.4	5.7
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	2.5	2.4	(1.5)	2.4
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.4)	(0.5)	-	0.4
	Nicht-Rauchende	75.6	72.2	75.5	74.7
	N gewichtet	6'918	2'375	459	9'752
	N ungewichtet	6'913	2'747	834	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
 Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Tabak		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	0.8	(1.3)	-	0.9
	21-30 Zigaretten	1.3	2.2	(1.3)	1.6
	16-20 Zigaretten	6.5	7.1	6.4	6.7
	11-15 Zigaretten	2.6	3.6	4.7	2.9
	6-10 Zigaretten	6.6	5.9	8.6	6.6
	1-5 Zigaretten	6.0	5.5	5.4	5.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	3.3	3.0	-	3.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.3)	-	-	(0.2)
	Nicht-Rauchende	72.5	71.0	71.0	72.1
	N gewichtet	4'637	1'622	339	6'598
	N ungewichtet	4'434	2'041	654	7'129
1992	> 40 Zigaretten	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	0.5	1.3	-	0.7
	21-30 Zigaretten	1.5	1.7	(1.7)	1.6
	16-20 Zigaretten	5.5	6.7	(4.9)	5.8
	11-15 Zigaretten	3.3	3.5	(3.0)	3.4
	6-10 Zigaretten	6.1	6.6	7.3	6.3
	1-5 Zigaretten	4.5	6.1	8.5	5.1
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	1.0	1.9	-	1.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-
	Nicht-Rauchende	77.3	72.1	72.8	75.9
	N gewichtet	5'499	1'803	368	7'669
	N ungewichtet	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten. Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012**

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.4)	(0.4)	(0.7)	-	0.3
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.9	2.0	2.6	2.4	2.7	1.8	(0.6)	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	33.8	35.5	29.6	26.1	23.8	15.2	7.4	25.8
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.4	91.6	71.7
	N gewichtet	2'736	3'234	3'480	3'954	2'932	2'355	1'978	20'669
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'192	3'181	2'773	1'816	20'873
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.5)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	0.4
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.6	3.2	2.7	3.1	3.2	1.8	(0.7)	2.5
	Rauchende (aber keine Zigarren)	31.4	34.1	27.0	26.9	20.8	13.9	6.0	24.9
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N gewichtet	2'670	2'700	3'479	3'022	2'584	1'760	1'365	17'579
	N ungewichtet	1'711	2'394	3'663	2'882	3'020	2'420	1'830	17'920
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.4)	(0.9)	(0.8)	(1.1)	(1.1)	0.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	3.3	3.3	3.7	2.7	1.6	(0.5)	2.6
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.0	32.4	33.1	28.8	21.0	14.6	7.2	27.1
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.2	66.4	75.0	82.5	91.2	69.6
	N gewichtet	2'614	3'186	3'742	3'097	2'601	2'011	1'390	18'641
	N ungewichtet	1'609	2'909	4'055	3'056	3'126	2'445	1'685	18'885
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	(0.4)	(0.6)	(0.9)	(1.8)	(1.0)	(1.7)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	2.3	2.2	2.7	2.0	(1.3)	-	1.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	42.2	37.8	37.4	30.5	20.9	14.2	8.9	30.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	89.0	66.7
	N gewichtet	1'765	2'449	2'415	2'160	1'598	1'340	943	12'670
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'002	12'759
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.4)	(0.8)	(2.2)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	(0.9)	1.4	1.5	(1.0)	(1.0)	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	30.0	36.8	33.0	28.5	21.1	14.9	6.7	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.0	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	N gewichtet	2'150	3'043	2'651	2'414	1'716	1'673	829	14'477
	N ungewichtet	1'697	3'411	2'755	2'300	1'928	1'640	895	14'626

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.

Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.

Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.7)	(0.7)	(1.5)	-	0.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	3.5	3.8	5.1	4.4	5.2	3.6	(1.6)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	35.1	39.2	33.2	26.8	21.7	14.2	7.2	27.5
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	1'394	1'653	1'748	1'985	1'457	1'117	760	10'114
2007	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'959	1'516	1'326	780	9'908
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.9)	(2.5)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.7	5.7	5.1	5.6	6.3	3.6	(1.5)	4.7
	Rauchende (aber keine Zigarren)	33.2	37.9	27.2	24.8	22.4	17.7	6.6	26.5
	Nicht-Rauchende	63.8	56.3	67.3	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
1997	N gewichtet	1'370	1'327	1'742	1'505	1'245	820	521	8'530
1992	N ungewichtet	862	1'074	1'701	1'348	1'325	969	661	7'940
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.7)	(1.7)	(1.7)	(2.6)	(3.1)	1.2
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.6)	6.4	6.0	6.9	5.2	3.5	-	5.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.9	34.9	33.2	30.2	21.9	17.5	8.8	29.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.6	70.2	75.8	86.9	64.2
	N gewichtet	1'323	1'552	1'872	1'537	1'234	830	494	8'842
1997	N ungewichtet	805	1'292	1'963	1'371	1'308	996	624	8'359
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	(0.7)	(1.0)	(1.8)	(3.6)	(2.3)	(5.0)	1.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.7)	4.4	4.3	5.2	(3.8)	(3.0)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	43.7	39.9	38.7	32.5	21.8	18.5	14.1	33.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	80.0	60.9
1992	N gewichtet	888	1'213	1'222	1'071	785	565	330	6'072
1992	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	326	5'629

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.

Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.

Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012**

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	Rauchende (aber keine Zigarren)	32.5	31.6	25.9	25.3	25.8	16.0	7.6	24.2
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	83.8	92.4	75.6
	N gewichtet	1'342	1'581	1'732	1'968	1'475	1'238	1'219	10'555
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	(0.6)	-	-	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	29.5	30.3	26.7	29.0	19.2	10.5	5.7	23.3
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.4	80.5	89.2	94.1	76.3
	N gewichtet	1'300	1'373	1'737	1'516	1'339	940	844	9'049
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'534	1'695	1'451	1'169	9'980
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	35.1	30.0	33.0	27.4	20.2	12.6	6.3	25.2
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.1	79.4	87.1	93.6	74.4
	N gewichtet	1'290	1'634	1'869	1'561	1'367	1'181	896	9'799
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'685	1'818	1'449	1'061	10'526
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	40.6	35.7	36.2	28.6	20.0	11.2	6.1	27.7
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.8	93.9	72.1
	N gewichtet	877	1'235	1'194	1'089	814	776	613	6'598
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	905	676	7'130
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	25.1	33.6	30.3	23.6	18.6	10.2	4.9	23.7
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	N gewichtet	1'070	1'594	1'378	1'276	920	911	492	7'641
	N ungewichtet	897	1'845	1'452	1'268	1'125	1'006	600	8'193

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	0.4	(0.2)	-	0.3
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.4	1.4	(0.8)	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	24.6	28.6	29.6	25.8
	Nicht-Rauchende	72.6	69.7	69.3	71.7
	N gewichtet	14'759	4'983	927	20'669
	N ungewichtet	13'831	5'507	1'535	20'873
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.4	(0.3)	-	0.4
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.6	2.3	(1.4)	2.5
	Rauchende (aber keine Zigarren)	24.6	25.6	25.8	24.9
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.2
	N gewichtet	12'695	4'085	798	17'579
	N ungewichtet	11'038	5'421	1'461	17'920
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.6	(0.4)	-	0.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.9	2.2	(0.9)	2.6
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.4	29.3	26.3	27.1
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.6
	N gewichtet	13'446	4'360	835	18'641
	N ungewichtet	12'687	4'748	1'450	18'885
1997	> 8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.9	(0.6)	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.1	1.9	-	1.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	29.8	31.7	31.6	30.3
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N gewichtet	9'023	3'035	612	12'670
	N ungewichtet	8'079	3'562	1'118	12'759
1992	> 8 Zigarren	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	0.8	0.8	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.0	1.5	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.7	29.6	31.5	27.6
	Nicht-Rauchende	71.1	68.0	67.8	70.3
	N gewichtet	10'501	3'290	686	14'477
	N ungewichtet	10'001	3'822	803	14'626

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	0.7	(0.5)	-	0.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	4.6	2.9	(1.8)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.7	29.0	32.2	27.5
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N gewichtet	7'342	2'342	430	10'114
	N ungewichtet	6'659	2'544	705	9'908
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	0.9	(0.6)	-	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	5.0	4.3	(2.8)	4.7
	Rauchende (aber keine Zigarren)	26.5	26.8	26.4	26.5
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.8
	N gewichtet	6'189	1'971	370	8'530
	N ungewichtet	4'950	2'377	613	7'940
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	1.3	(0.9)	-	1.2
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	5.6	4.2	(1.7)	5.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	28.4	31.5	28.4	29.1
	Nicht-Rauchende	64.3	63.3	68.5	64.2
	N gewichtet	6'489	1'979	374	8'842
	N ungewichtet	5'751	1'997	611	8'359
1997	> 8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	1.9	(1.2)	-	1.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	4.1	3.8	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	32.4	35.2	34.9	33.2
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.6	60.9
	N gewichtet	4'388	1'412	273	6'072
	N ungewichtet	3'645	1'520	464	5'629
1992	> 8 Zigarren	(0.2)	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	(0.4)	-	-	(0.4)
	1-4 Zigarren	1.7	(1.7)	-	1.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.9	3.0	-	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	31.4	33.1	36.4	32.0
	Nicht-Rauchende	64.3	61.9	62.1	63.7
	N gewichtet	5'005	1'513	318	6'836
	N ungewichtet	4'451	1'665	317	6'433

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(0.3)	-	-	(0.2)
	Rauchende (aber keine Zigarren)	22.5	28.3	27.3	24.2
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N gewichtet	7'417	2'641	498	10'555
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(0.4)	(0.4)	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	22.8	24.4	25.3	23.3
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	N gewichtet	6'506	2'114	429	9'049
	N ungewichtet	6'088	3'044	848	9'980
2002	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(0.4)	(0.4)	-	0.4
	Rauchende (aber keine Zigarren)	24.4	27.6	24.6	25.2
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	N gewichtet	6'957	2'380	462	9'799
	N ungewichtet	6'936	2'751	839	10'526
1997	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	27.2	28.7	29.0	27.7
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	N gewichtet	4'635	1'623	339	6'598
	N ungewichtet	4'434	2'042	654	7'130
1992	> 8 Zigarren	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Zigarren)	22.5	26.6	27.2	23.7
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	N gewichtet	5'496	1'777	368	7'641
	N ungewichtet	5'550	2'157	486	8'193

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren. Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet. Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.6)	-	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.3	1.7	1.3	1.1	1.1	(0.6)	-	1.2
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	33.1	35.9	30.4	27.3	25.2	16.4	8.1	26.6
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.3	91.6	71.7
	N gewichtet	2'736	3'234	3'479	3'954	2'932	2'356	1'978	20'669
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'479	4'193	3'181	2'774	1'816	20'874
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.7)	-	-	(0.4)	(0.5)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.2	2.3	1.3	2.0	1.3	(1.0)	-	1.8
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	29.3	34.6	28.1	28.1	22.8	15.2	7.2	25.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.1
	N gewichtet	2'673	2'700	3'479	3'022	2'584	1'760	1'365	17'583
	N ungewichtet	1'713	2'394	3'663	2'883	3'019	2'421	1'830	17'923
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	(0.5)	(0.3)	(0.7)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(2.1)	1.5	1.7	1.7	1.3	0.5	-	1.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.3	34.1	34.3	31.2	22.9	16.5	8.0	28.4
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.3	75.0	82.4	91.1	69.5
	N gewichtet	2'614	3'183	3'744	3'100	2'603	2'011	1'392	18'646
	N ungewichtet	1'609	2'908	4'056	3'060	3'127	2'446	1'686	18'892
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(0.8)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.7)	1.3	(1.2)	(1.6)	(1.1)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	42.9	38.8	38.8	32.3	23.1	15.5	10.9	31.7
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.3	74.9	83.1	88.8	66.7
	N gewichtet	1'765	2'449	2'415	2'161	1'598	1'340	946	12'674
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'936	1'656	1'465	1'004	12'761
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.5)	(0.3)	-	-	-	-	0.3
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.4	37.3	34.7	30.5	23.7	15.7	9.3	28.9
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	N gewichtet	2'150	3'042	2'649	2'414	1'716	1'673	829	14'474
	N ungewichtet	1'696	3'410	2'754	2'299	1'928	1'640	895	14'622

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozent.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	(0.8)	-	(0.6)	(0.7)	-	(0.8)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.2	2.6	1.8	1.7	(1.7)	(0.9)	-	1.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.1	40.6	35.6	29.3	24.9	17.2	8.8	29.5
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	1'394	1'653	1'746	1'986	1'457	1'118	760	10'114
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'648	1'960	1'516	1'327	780	9'909
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(1.4)	-	-	(0.7)	(0.9)	(0.8)	-	0.7
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	4.3	3.6	2.2	2.4	(2.4)	(1.8)	-	2.7
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.7	39.6	29.9	28.1	26.9	20.5	9.6	28.6
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	864	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'943
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	(1.0)	(0.7)	(1.3)	(1.0)	-	0.8
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(3.2)	2.7	2.7	3.1	2.4	(1.0)	-	2.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	36.3	38.5	35.8	34.9	25.8	22.2	11.4	32.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.2	59.9	60.6	70.1	75.8	86.6	64.2
	N gewichtet	1'323	1'549	1'874	1'538	1'236	830	496	8'846
	N ungewichtet	805	1'291	1'964	1'374	1'309	997	625	8'365
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(1.8)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	2.6	(2.1)	(2.9)	(1.8)	-	-	2.0
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	45.2	41.9	41.5	36.0	26.4	21.6	19.5	36.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.5	69.9	75.2	79.4	60.8
	N gewichtet	888	1'213	1'222	1'072	785	565	332	6'076
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	883	712	561	327	5'631
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.8)	-	-	-	-	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.6	41.4	39.4	38.0	29.5	22.5	15.7	34.8
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.0	68.9	74.5	81.5	63.7
	N gewichtet	1'080	1'449	1'273	1'138	796	762	337	6'835
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'031	803	634	295	6'430

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
 Spaltenprozent.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(1.4)	(0.7)	(0.7)	(0.5)	(0.5)	-	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	31.0	31.0	25.2	25.2	25.5	15.7	7.6	23.7
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	83.8	92.4	75.6
	N gewichtet	1'342	1'581	1'732	1'968	1'475	1'238	1'219	10'555
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(2.1)	(1.1)	(0.5)	(1.5)	-	-	-	0.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.9	29.9	26.2	28.1	19.0	10.5	5.7	22.7
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.4	80.5	89.2	94.1	76.3
	N gewichtet	1'300	1'373	1'737	1'517	1'339	940	844	9'049
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'535	1'694	1'451	1'169	9'980
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	(0.7)	-	-	-	-	0.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	34.4	30.0	32.9	27.6	20.3	12.5	6.1	25.1
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.0	79.4	87.1	93.6	74.4
	N gewichtet	1'290	1'634	1'869	1'562	1'367	1'181	896	9'800
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	40.5	35.8	36.0	28.5	19.9	11.0	6.2	27.6
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.9	93.8	72.1
	N gewichtet	877	1'235	1'194	1'089	814	775	613	6'597
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	904	677	7'130
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	25.2	33.6	30.3	23.8	18.6	10.0	4.9	23.7
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	N gewichtet	1'070	1'594	1'376	1'276	920	911	492	7'640
	N ungewichtet	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozent.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Cigarillos	-	(0.2)	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.4	(0.3)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.3	1.1	-	1.2
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	25.7	28.6	29.9	26.6
	Nicht-Rauchende	72.5	69.7	69.3	71.7
	N gewichtet	14'760	4'981	927	20'669
	N ungewichtet	13'833	5'506	1'535	20'874
2007	> 8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.4	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.9	1.5	-	1.8
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	25.3	26.2	26.7	25.6
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.1
	N gewichtet	12'698	4'087	798	17'583
	N ungewichtet	11'040	5'422	1'461	17'923
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.4	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.6	1.2	-	1.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.9	30.3	27.1	28.4
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.5
	N gewichtet	13'449	4'362	835	18'646
	N ungewichtet	12'692	4'750	1'450	18'892
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.4)	-	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	1.2	0.9	-	1.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	31.3	33.0	32.1	31.7
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N gewichtet	9'025	3'036	612	12'674
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.2)	(0.4)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.2)	(0.6)	-	0.3
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	28.2	30.7	32.1	28.9
	Nicht-Rauchende	71.2	68.0	67.8	70.3
	N gewichtet	10'499	3'289	686	14'474
	N ungewichtet	9'999	3'820	803	14'622

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozent.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	0.6	(0.6)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.0	1.8	-	1.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	29.3	29.6	33.5	29.5
	Nicht-Rauchende	67.9	67.7	65.4	67.7
	N gewichtet	7'344	2'341	430	10'114
	N ungewichtet	6'661	2'543	705	9'909
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	0.7	(0.9)	-	0.7
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.0	2.2	-	2.7
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	28.6	28.7	28.6	28.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	N gewichtet	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'379	613	7'943
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	(0.3)	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	0.8	(0.9)	-	0.8
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.7	2.3	-	2.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	31.8	33.5	30.2	32.1
	Nicht-Rauchende	64.2	63.2	68.5	64.2
	N gewichtet	6'490	1'982	374	8'846
	N ungewichtet	5'755	1'999	611	8'365
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	(0.8)	-	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.2	(1.6)	-	2.0
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.6	38.0	35.8	36.2
	Nicht-Rauchende	61.0	59.6	63.6	60.8
	N gewichtet	4'391	1'413	273	6'076
	N ungewichtet	3'646	1'521	464	5'631
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	(0.5)	(0.8)	-	0.5
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.5)	(1.1)	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	34.4	35.4	37.7	34.8
	Nicht-Rauchende	64.3	61.9	62.1	63.7
	N gewichtet	5'004	1'512	318	6'835
	N ungewichtet	4'450	1'663	317	6'430

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozent.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	(0.1)	-	-	(0.1)
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	0.6	(0.6)	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	22.1	27.7	26.8	23.7
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N gewichtet	7'417	2'641	498	10'555
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	0.9	(0.9)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	22.2	23.9	25.1	22.7
	Nicht-Rauchende	76.8	75.2	74.5	76.3
	N gewichtet	6'507	2'114	429	9'049
	N ungewichtet	6'089	3'043	848	9'980
2002	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	0.5	(0.4)	-	0.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	24.3	27.6	24.5	25.1
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	N gewichtet	6'958	2'380	462	9'800
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.2)	-	-	(0.2)
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	27.2	28.7	29.0	27.6
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	N gewichtet	4'635	1'624	339	6'597
	N ungewichtet	4'433	2'043	654	7'130
1992	> 8 Cigarillos	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	22.5	26.7	27.2	23.7
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	N gewichtet	5'495	1'777	368	7'640
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos. Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet. Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.

Spaltenprozent.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	(0.6)	(0.7)	(0.5)	0.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	(0.4)	-	(0.3)	(0.5)	(0.8)	(0.8)	-	0.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.6	37.3	32.0	28.2	25.4	15.7	7.6	27.5
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.3	91.6	71.7
	N gewichtet	2'736	3'234	3'480	3'954	2'932	2'356	1'978	20'670
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'193	3'180	2'774	1'816	20'874
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(0.6)	(0.8)	(1.4)	(0.8)	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.8)	(0.8)	(0.4)	1.3	(0.5)	-	0.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.9	36.4	28.9	29.6	22.3	14.4	6.3	26.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.4	75.1	83.3	92.3	72.1
	N gewichtet	2'674	2'700	3'479	3'024	2'585	1'760	1'365	17'586
	N ungewichtet	1'714	2'394	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'927
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(0.5)	-	-	0.1
	1-4 Pfeifen	-	-	(0.5)	1.3	1.0	1.3	(0.5)	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.6)	0.9	(1.1)	1.6	(0.9)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	37.3	35.2	35.4	31.0	21.8	15.1	7.9	28.8
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.4	75.0	82.4	91.1	69.5
	N gewichtet	2'614	3'186	3'744	3'097	2'603	2'011	1'392	18'645
	N ungewichtet	1'609	2'909	4'056	3'058	3'126	2'446	1'686	18'890
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.6)	(1.1)	(0.7)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	1.6	1.7	(1.0)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	43.4	39.3	37.9	31.0	22.6	15.1	9.5	31.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	88.8	66.7
	N gewichtet	1'765	2'449	2'415	2'160	1'598	1'340	946	12'673
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'004	12'761
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.5)	-	-	-	0.2
	1-4 Pfeifen	-	(0.4)	(1.1)	1.8	(1.2)	(1.2)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.5)	(1.0)	1.7	(0.9)	-	-	0.8
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.0	37.0	33.0	27.1	21.6	15.3	9.0	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.6	75.6	82.8	89.6	70.3
	N gewichtet	2'150	3'041	2'649	2'410	1'716	1'673	829	14'468
	N ungewichtet	1'696	3'410	2'754	2'297	1'928	1'640	894	14'619

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	(1.2)	(1.4)	(1.3)	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	(0.7)	-	(0.6)	(1.0)	(1.6)	(1.5)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	38.4	42.5	37.9	30.7	24.7	15.4	7.6	30.7
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	1'394	1'653	1'748	1'986	1'457	1'118	760	10'115
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'960	1'515	1'327	780	9'909
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.0)	(1.8)	(2.9)	(2.0)	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.5)	(1.4)	(0.8)	2.8	(1.0)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.8	42.1	31.1	29.7	25.3	18.7	7.3	29.8
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(1.1)	-	-	0.3
	1-4 Pfeifen	-	-	(1.0)	2.5	2.0	3.0	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.2)	1.7	(2.1)	3.3	(2.2)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	39.2	40.4	37.4	34.3	23.3	18.1	10.7	32.4
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.7	70.1	75.8	86.6	64.2
	N gewichtet	1'323	1'552	1'874	1'535	1'235	830	496	8'845
	N ungewichtet	805	1'292	1'964	1'372	1'308	997	625	8'363
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(3.3)	(2.2)	(1.7)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.9)	3.0	3.4	(1.9)	-	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	46.2	42.9	39.6	33.2	25.0	20.5	15.7	35.1
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	79.4	60.8
	N gewichtet	888	1'213	1'222	1'071	785	565	332	6'075
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	327	5'630
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(1.2)	-	-	-	0.5
	1-4 Pfeifen	-	(0.8)	(2.3)	3.8	(2.7)	(2.7)	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	(2.0)	(3.3)	(2.0)	-	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.7	40.4	36.0	30.9	25.1	21.5	15.0	32.0
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.2	68.9	74.5	81.6	63.8
	N gewichtet	1'080	1'447	1'273	1'134	796	762	336	6'829
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'029	803	634	294	6'427

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.8	31.9	26.0	25.7	26.1	16.0	7.6	24.4
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	83.8	92.4	75.6
	N gewichtet	1'342	1'581	1'732	1'968	1'475	1'238	1'219	10'555
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	29.8	30.9	26.7	29.4	19.6	10.8	5.7	23.6
	Nicht-Rauchende	70.0	69.0	73.0	70.3	80.4	89.2	94.1	76.3
	N gewichtet	1'300	1'373	1'737	1'518	1'339	940	844	9'051
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'983
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.4	30.4	33.5	27.8	20.5	12.9	6.4	25.5
	Nicht-Rauchende	64.5	69.5	66.4	72.0	79.4	87.1	93.6	74.4
	N gewichtet	1'290	1'634	1'869	1'562	1'367	1'181	896	9'800
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	40.6	35.8	36.1	28.9	20.3	11.2	6.2	27.8
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	88.8	93.8	72.1
	N gewichtet	877	1'235	1'194	1'089	814	776	613	6'598
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	905	677	7'131
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	25.2	33.8	30.3	23.6	18.6	10.2	4.9	23.8
	Nicht-Rauchende	74.8	66.1	69.6	76.1	81.4	89.8	95.1	76.2
	N gewichtet	1'070	1'594	1'376	1'276	920	911	492	7'640
	N ungewichtet	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	0.3	(0.2)	-	0.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.5	(0.2)	-	0.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	26.5	29.8	30.0	27.5
	Nicht-Rauchende	72.5	69.7	69.3	71.7
	N gewichtet	14'760	4'983	927	20'670
	N ungewichtet	13'833	5'506	1'535	20'874
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	(0.1)	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	0.5	(0.3)	-	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.7	(0.4)	-	0.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	26.4	27.5	26.0	26.6
	Nicht-Rauchende	72.2	71.7	72.8	72.1
	N gewichtet	12'699	4'088	798	17'586
	N ungewichtet	11'041	5'425	1'461	17'927
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.1)	(0.2)	-	0.1
	1-4 Pfeifen	0.7	(0.5)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.9	0.8	(0.6)	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	28.3	30.6	26.2	28.8
	Nicht-Rauchende	69.9	68.0	72.2	69.5
	N gewichtet	13'448	4'362	835	18'645
	N ungewichtet	12'690	4'750	1'450	18'890
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	0.8	(0.5)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.2	(0.7)	-	1.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.8	32.9	30.8	31.3
	Nicht-Rauchende	67.0	65.7	67.7	66.7
	N gewichtet	9'025	3'036	612	12'673
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	> 8 Pfeifen	(0.1)	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	(0.3)	-	0.2
	1-4 Pfeifen	0.9	1.1	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	0.8	(0.7)	-	0.8
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	26.7	29.7	31.4	27.6
	Nicht-Rauchende	71.2	68.0	67.8	70.3
	N gewichtet	10'494	3'288	686	14'468
	N ungewichtet	9'997	3'819	803	14'619

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	0.6	(0.4)	-	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.1	(0.5)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.3	31.4	33.2	30.7
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N gewichtet	7'344	2'342	430	10'115
	N ungewichtet	6'661	2'543	705	9'909
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	0.9	(0.6)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.4	(0.7)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	29.8	30.4	26.5	29.8
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	N gewichtet	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	(0.3)	-	0.3
	1-4 Pfeifen	1.5	(0.9)	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.8	(1.5)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.1	33.9	28.1	32.4
	Nicht-Rauchende	64.3	63.2	68.5	64.2
	N gewichtet	6'490	1'982	374	8'845
	N ungewichtet	5'753	1'999	611	8'363
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	1.6	(1.0)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	2.3	(1.5)	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.5	37.5	32.9	35.1
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.6	60.8
	N gewichtet	4'390	1'413	273	6'075
	N ungewichtet	3'645	1'521	464	5'630
1992	> 8 Pfeifen	(0.3)	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	(0.7)	-	0.5
	1-4 Pfeifen	1.9	2.3	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.6	(1.5)	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	31.3	33.3	36.3	32.0
	Nicht-Rauchende	64.4	62.0	62.1	63.8
	N gewichtet	4'999	1'511	318	6'829
	N ungewichtet	4'448	1'662	317	6'427

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	22.8	28.4	27.3	24.4
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N gewichtet	7'417	2'641	498	10'555
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	23.1	24.7	25.5	23.6
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	N gewichtet	6'508	2'115	429	9'051
	N ungewichtet	6'090	3'045	848	9'983
2002	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	(0.1)
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	24.8	27.8	24.6	25.5
	Nicht-Rauchende	75.1	72.0	75.1	74.4
	N gewichtet	6'958	2'380	462	9'800
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	27.3	28.9	29.0	27.8
	Nicht-Rauchende	72.6	71.0	71.0	72.1
	N gewichtet	4'635	1'624	339	6'598
	N ungewichtet	4'434	2'043	654	7'131
1992	> 8 Pfeifen	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	22.6	26.7	27.2	23.8
	Nicht-Rauchende	77.4	73.1	72.8	76.2
	N gewichtet	5'495	1'777	368	7'640
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?' und 'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen. Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet. Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Wasserpfeife-Rauchende	7.7	2.5	1.0	(0.3)	-	-	-	1.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	28.3	35.3	31.3	28.6	26.9	17.5	8.4	26.6
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.3	91.6	71.7
	<i>N gewichtet</i>	2'736	3'234	3'480	3'954	2'932	2'356	1'978	20'671
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'193	3'181	2'774	1'816	20'875
2007	Wasserpfeife-Rauchende	8.6	3.2	0.9	(0.4)	-	-	-	2.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	24.6	34.0	29.0	30.1	24.8	16.7	7.7	25.8
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.4	75.1	83.3	92.3	72.1
	<i>N gewichtet</i>	2'674	2'698	3'479	3'024	2'585	1'760	1'365	17'583
	N ungewichtet	1'714	2'392	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'925

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.

Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.

Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012**

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Wasserpfeife-Rauchende	9.5	(3.3)	(1.8)	-	-	-	-	2.2
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	29.6	40.2	36.8	31.6	27.7	19.2	9.6	30.1
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	1'394	1'653	1'748	1'986	1'457	1'118	760	10'116
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'960	1'516	1'327	780	9'910
2007	Wasserpfeife-Rauchende	10.0	5.0	(0.6)	-	-	-	-	2.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	26.4	38.7	32.1	30.7	30.5	23.5	10.8	29.6
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	1'373	1'327	1'742	1'505	1'245	821	521	8'534
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet. Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012**

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Wasserpfeife-Rauchende	5.9	(1.7)	-	-	-	-	-	1.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	26.9	30.2	25.8	25.5	26.1	16.0	7.6	23.3
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	83.8	92.4	75.6
	N gewichtet	1'342	1'581	1'732	1'968	1'475	1'238	1'219	10'555
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	Wasserpfeife-Rauchende	7.2	(1.5)	(1.2)	-	-	-	-	1.5
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	22.8	29.4	25.8	29.5	19.5	10.8	5.9	22.2
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.0	70.3	80.4	89.2	94.1	76.3
	N gewichtet	1'300	1'371	1'737	1'518	1'339	940	844	9'049
	N ungewichtet	849	1'318	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'981

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet. Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Wasserpfeife-Rauchende	2.1	0.7	(0.5)	1.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	25.4	29.6	30.3	26.6
	Nicht-Rauchende	72.5	69.7	69.3	71.7
	<i>N gewichtet</i>	14'760	4'983	927	20'671
	N ungewichtet	13'833	5'507	1'535	20'875
2007	Wasserpfeife-Rauchende	2.3	1.5	-	2.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	25.4	26.8	26.5	25.8
	Nicht-Rauchende	72.3	71.7	72.8	72.1
	<i>N gewichtet</i>	12'697	4'088	798	17'583
	N ungewichtet	11'039	5'425	1'461	17'925

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet. Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Wasserpfeife-Rauchende	2.7	1.1	(0.9)	2.2
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	29.5	31.3	33.7	30.1
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N gewichtet	7'344	2'342	430	10'116
	N ungewichtet	6'661	2'544	705	9'910
2007	Wasserpfeife-Rauchende	2.9	2.2	-	2.7
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	29.6	29.8	28.1	29.6
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	N gewichtet	6'191	1'973	370	8'534
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet. Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.


*Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Wasserpfeife-Rauchende	1.5	(0.3)	-	1.1
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	21.4	28.1	27.3	23.3
	Nicht-Rauchende	77.2	71.6	72.7	75.6
	N gewichtet	7'417	2'641	498	10'555
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	Wasserpfeife-Rauchende	1.8	(0.8)	-	1.5
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	21.4	24.0	25.1	22.2
	Nicht-Rauchende	76.8	75.1	74.5	76.3
	N gewichtet	6'506	2'115	429	9'049
	N ungewichtet	6'088	3'045	848	9'981

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Was rauchen Sie?'

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet. Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*



Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
 Prozente werden gewichtet berechnet.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	schon versucht	37.8	31.9	28.2	22.9	20.9	27.2	21.6	28.4
	nie versucht, möchte gerne	23.3	31.6	38.4	36.3	35.9	27.7	(18.9)	32.4
	nie versucht, will nicht	38.9	36.5	33.4	40.8	43.2	45.1	59.5	39.3
	<i>N gewichtet</i>	990	1'224	1'126	1'153	776	419	163	5'852
	N ungewichtet	1'033	933	1'053	1'251	845	489	157	5'761
2007	schon versucht	35.2	32.6	25.8	28.2	25.8	27.9	(14.2)	29.2
	nie versucht, möchte gerne	24.3	32.7	37.3	37.1	30.9	27.0	(23.5)	32.3
	nie versucht, will nicht	40.5	34.6	36.9	34.7	43.3	45.1	62.3	38.5
	<i>N gewichtet</i>	823	967	997	882	609	277	95	4'649
	N ungewichtet	575	832	1'092	903	723	395	138	4'658
2002	schon versucht	32.1	28.3	26.6	25.3	25.9	25.6	23.4	27.5
	nie versucht, möchte gerne	24.3	35.8	38.9	35.9	32.6	24.1	14.7	33.0
	nie versucht, will nicht	43.6	35.9	34.5	38.8	41.5	50.2	61.9	39.5
	<i>N gewichtet</i>	950	1'089	1'309	983	613	334	112	5'390
	N ungewichtet	580	1'012	1'459	1'049	785	420	143	5'448
1997	schon versucht	33.8	23.1	23.4	21.8	20.3	21.7	(21.2)	24.5
	nie versucht, möchte gerne	22.6	33.9	37.6	35.2	31.1	24.6	(10.1)	31.6
	nie versucht, will nicht	43.6	43.0	39.0	43.0	48.5	53.7	68.7	43.9
	<i>N gewichtet</i>	759	962	946	723	382	215	95	4'082
	N ungewichtet	614	1'131	990	661	409	251	104	4'160
1992	schon versucht	27.8	28.4	26.0	23.4	27.9	21.4	(18.9)	26.2
	nie versucht, möchte gerne	24.8	28.9	32.0	34.1	24.3	19.0	-	28.3
	nie versucht, will nicht	47.4	42.7	42.0	42.6	47.8	59.7	75.2	45.4
	<i>N gewichtet</i>	674	1'173	949	774	421	289	77	4'357
	N ungewichtet	588	1'379	1'020	771	487	276	85	4'606

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	schon versucht	38.9	32.3	27.9	21.4	18.8	27.3	(24.6)	28.2
	nie versucht, möchte gerne	22.8	31.3	39.6	36.9	36.5	25.8	(19.1)	32.7
	nie versucht, will nicht	38.2	36.4	32.5	41.7	44.7	46.8	56.3	39.1
	<i>N gewichtet</i>	551	720	673	646	400	214	74	3'277
	<i>N ungewichtet</i>	580	515	597	642	418	251	90	3'093
2007	schon versucht	34.9	31.7	29.6	26.9	21.4	29.3	(12.9)	29.0
	nie versucht, möchte gerne	27.7	32.1	35.9	41.8	31.5	25.9	(20.9)	33.1
	nie versucht, will nicht	37.4	36.2	34.5	31.3	47.1	44.8	66.2	37.9
	<i>N gewichtet</i>	462	549	545	451	363	183	51	2'605
	<i>N ungewichtet</i>	308	436	552	431	370	227	76	2'400
2002	schon versucht	31.9	26.7	26.5	23.6	26.3	24.9	(27.7)	26.8
	nie versucht, möchte gerne	24.9	37.2	39.5	34.8	28.2	22.9	-	32.7
	nie versucht, will nicht	43.2	36.1	34.0	41.6	45.5	52.1	65.6	40.5
	<i>N gewichtet</i>	507	622	706	563	343	190	60	2'992
	<i>N ungewichtet</i>	302	516	752	518	382	222	75	2'767
1997	schon versucht	34.0	20.9	21.8	24.3	19.4	(21.9)	(15.4)	23.8
	nie versucht, möchte gerne	23.7	36.1	38.6	31.4	28.9	24.3	-	31.6
	nie versucht, will nicht	42.3	43.1	39.6	44.3	51.7	53.8	71.1	44.5
	<i>N gewichtet</i>	407	524	515	420	223	131	58	2'278
	<i>N ungewichtet</i>	321	583	492	340	211	140	60	2'147
1992	schon versucht	28.7	27.7	23.4	22.4	27.6	20.3	(22.3)	25.3
	nie versucht, möchte gerne	24.0	29.8	32.3	33.2	19.9	(16.7)	-	27.4
	nie versucht, will nicht	47.4	42.4	44.2	44.4	52.5	63.0	74.9	47.3
	<i>N gewichtet</i>	396	626	524	465	250	194	57	2'512
	<i>N ungewichtet</i>	315	695	551	440	253	165	55	2'474

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	schon versucht	36.4	31.5	28.7	24.9	23.1	27.0	(19.2)	28.5
	nie versucht, möchte gerne	23.8	31.9	36.6	35.4	35.3	29.7	(18.7)	31.9
	nie versucht, will nicht	39.8	36.6	34.7	39.7	41.6	43.3	62.2	39.6
	N gewichtet	439	504	454	507	376	205	89	2'575
	N ungewichtet	453	418	456	609	427	238	67	2'668
2007	schon versucht	35.6	33.9	21.3	29.5	32.3	25.2	(15.8)	29.5
	nie versucht, möchte gerne	20.0	33.5	38.9	32.3	30.2	29.2	(26.5)	31.3
	nie versucht, will nicht	44.4	32.6	39.9	38.3	37.5	45.6	57.7	39.2
	N gewichtet	361	417	452	431	245	94	44	2'045
	N ungewichtet	267	396	540	472	353	168	62	2'258
2002	schon versucht	32.3	30.5	26.7	27.5	25.5	26.6	(18.4)	28.3
	nie versucht, möchte gerne	23.7	34.0	38.1	37.4	38.2	25.8	(23.8)	33.5
	nie versucht, will nicht	44.0	35.6	35.1	35.1	36.3	47.7	57.8	38.2
	N gewichtet	443	466	602	421	270	144	52	2'398
	N ungewichtet	278	496	707	531	403	198	68	2'681
1997	schon versucht	33.5	25.7	25.3	18.4	21.7	(21.5)	(30.3)	25.4
	nie versucht, möchte gerne	21.3	31.4	36.5	40.5	34.3	25.0	-	31.6
	nie versucht, will nicht	45.2	43.0	38.2	41.2	44.1	53.5	(64.9)	43.0
	N gewichtet	352	439	430	302	159	84	37	1'804
	N ungewichtet	293	548	498	321	198	111	44	2'013
1992	schon versucht	26.6	29.1	29.2	24.8	28.4	(23.5)	-	27.5
	nie versucht, möchte gerne	25.9	27.8	31.6	35.4	30.6	(23.7)	-	29.6
	nie versucht, will nicht	47.5	43.1	39.2	39.8	41.0	52.8	(76.0)	43.0
	N gewichtet	278	547	425	308	171	95	20	1'845
	N ungewichtet	273	684	469	331	234	111	30	2'132

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (unweighted)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	schon versucht	28.5	28.5	25.8	28.4
	nie versucht, möchte gerne	30.1	37.8	36.3	32.4
	nie versucht, will nicht	41.5	33.7	37.9	39.3
	<i>N gewichtet</i>	4'062	1'506	284	5'852
	N ungewichtet	3'663	1'638	460	5'761
2007	schon versucht	30.6	26.5	22.0	29.2
	nie versucht, möchte gerne	30.4	37.1	37.7	32.3
	nie versucht, will nicht	39.0	36.4	40.3	38.5
	<i>N gewichtet</i>	3'356	1'085	208	4'649
	N ungewichtet	2'844	1'442	372	4'658
2002	schon versucht	28.4	24.6	27.8	27.5
	nie versucht, möchte gerne	30.8	39.7	31.1	33.0
	nie versucht, will nicht	40.8	35.7	41.1	39.5
	<i>N gewichtet</i>	3'816	1'352	222	5'390
	N ungewichtet	3'572	1'475	401	5'448
1997	schon versucht	25.3	23.5	18.5	24.5
	nie versucht, möchte gerne	28.7	38.6	37.9	31.6
	nie versucht, will nicht	46.0	37.9	43.6	43.9
	<i>N gewichtet</i>	2'884	1'006	192	4'082
	N ungewichtet	2'573	1'224	363	4'160
1992	schon versucht	26.6	24.6	28.5	26.2
	nie versucht, möchte gerne	25.8	36.3	23.5	28.3
	nie versucht, will nicht	47.6	39.1	48.0	45.4
	<i>N gewichtet</i>	3'035	1'104	218	4'357
	N ungewichtet	3'012	1'347	247	4'606

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
 Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	schon versucht	28.5	27.6	26.5	28.2
	nie versucht, möchte gerne	30.5	38.6	37.7	32.7
	nie versucht, will nicht	41.0	33.8	35.8	39.1
	<i>N gewichtet</i>	2'367	762	148	3'277
	N ungewichtet	2'080	781	232	3'093
2007	schon versucht	29.3	29.2	22.7	29.0
	nie versucht, möchte gerne	31.6	36.8	39.2	33.1
	nie versucht, will nicht	39.1	34.0	38.1	37.9
	<i>N gewichtet</i>	1'911	591	104	2'605
	N ungewichtet	1'520	714	166	2'400
2002	schon versucht	27.4	24.9	26.5	26.8
	nie versucht, möchte gerne	30.9	38.8	29.8	32.7
	nie versucht, will nicht	41.7	36.3	43.7	40.5
	<i>N gewichtet</i>	2'180	700	111	2'992
	N ungewichtet	1'893	691	183	2'767
1997	schon versucht	23.7	25.8	(14.1)	23.8
	nie versucht, möchte gerne	28.6	38.7	43.9	31.6
	nie versucht, will nicht	47.7	35.5	42.0	44.5
	<i>N gewichtet</i>	1'637	547	94	2'278
	N ungewichtet	1'370	609	168	2'147
1992	schon versucht	25.3	24.5	29.1	25.3
	nie versucht, möchte gerne	24.5	36.7	25.4	27.4
	nie versucht, will nicht	50.3	38.8	45.5	47.3
	<i>N gewichtet</i>	1'789	604	119	2'512
	N ungewichtet	1'666	694	114	2'474

Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	schon versucht	28.4	29.4	25.0	28.5
	nie versucht, möchte gerne	29.5	37.0	34.9	31.9
	nie versucht, will nicht	42.2	33.6	40.1	39.6
	<i>N gewichtet</i>	1'695	744	136	2'575
	N ungewichtet	1'583	857	228	2'668
2007	schon versucht	32.2	23.2	21.3	29.5
	nie versucht, möchte gerne	28.8	37.5	36.2	31.3
	nie versucht, will nicht	38.9	39.3	42.6	39.2
	<i>N gewichtet</i>	1'446	495	104	2'045
	N ungewichtet	1'324	728	206	2'258
2002	schon versucht	29.8	24.3	29.0	28.3
	nie versucht, möchte gerne	30.7	40.7	32.5	33.5
	nie versucht, will nicht	39.5	35.0	38.5	38.2
	<i>N gewichtet</i>	1'636	651	111	2'398
	N ungewichtet	1'679	784	218	2'681
1997	schon versucht	27.3	20.8	22.7	25.4
	nie versucht, möchte gerne	29.0	38.5	32.2	31.6
	nie versucht, will nicht	43.7	40.7	45.1	43.0
	<i>N gewichtet</i>	1'247	458	98	1'804
	N ungewichtet	1'203	615	195	2'013
1992	schon versucht	28.5	24.7	27.9	27.5
	nie versucht, möchte gerne	27.8	35.7	21.2	29.6
	nie versucht, will nicht	43.7	39.5	51.0	43.0
	<i>N gewichtet</i>	1'246	499	99	1'845
	N ungewichtet	1'346	653	133	2'132


Fragen: 'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?' und 'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Passives Rauchen
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012*



Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
 Prozente werden gewichtet berechnet.

*Passives Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	nicht ausgesetzt	41.3	62.3	77.7	82.5	85.8	90.6	94.8	75.7
	weniger als 30 Minuten	23.6	15.2	10.5	8.0	5.9	3.9	1.7	10.2
	30 Minuten - <1 Stunde	11.3	7.4	3.5	2.3	2.6	1.6	(0.8)	4.3
	1 Stunde - <2 Stunden	10.4	7.3	3.9	3.7	3.0	1.7	(1.0)	4.6
	2 Stunden - <4 Stunden	7.6	3.8	2.5	2.0	1.5	1.4	(1.0)	2.8
	4 Stunden - <8 Stunden	3.6	2.3	1.0	0.8	(0.3)	(0.6)	-	1.3
	8 Stunden - <12 Stunden	1.8	(1.5)	(0.7)	0.6	(0.7)	0.1	-	0.9
	12 Stunden oder mehr	(0.4)	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	N gewichtet	2'673	3'188	3'427	3'902	2'902	2'323	1'965	20'380
	N ungewichtet	2'844	2'490	3'436	4'148	3'144	2'737	1'799	20'598
2007	nicht ausgesetzt	30.7	48.7	60.8	63.4	72.0	81.6	87.8	60.6
	weniger als 30 Minuten	13.1	13.9	12.3	11.8	9.3	6.8	5.5	11.1
	30 Minuten - <1 Stunde	14.0	11.3	8.4	7.2	5.3	4.1	2.8	8.2
	1 Stunde - <2 Stunden	20.3	13.3	8.9	8.2	7.0	4.1	2.5	9.9
	2 Stunden - <4 Stunden	12.2	7.0	5.2	4.7	3.8	2.0	(1.1)	5.6
	4 Stunden - <8 Stunden	6.6	2.9	2.7	2.9	1.7	(1.1)	-	2.9
	8 Stunden - <12 Stunden	2.8	2.7	1.4	1.6	(0.7)	-	-	1.5
	12 Stunden oder mehr	-	-	(0.3)	-	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	2'592	2'631	3'379	2'927	2'517	1'699	1'323	17'068
	N ungewichtet	1'656	2'343	3'578	2'791	2'945	2'351	1'781	17'445

Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Passives Rauchen, nach Alter
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	nicht ausgesetzt	39.9	58.8	73.2	79.2	82.3	89.6	93.4	72.2
	weniger als 30 Minuten	24.3	16.4	11.5	10.2	7.5	4.7	(1.4)	11.7
	30 Minuten - <1 Stunde	12.2	8.5	4.6	3.2	3.4	(1.7)	-	5.2
	1 Stunde - <2 Stunden	11.0	7.3	4.9	4.3	4.2	2.1	(1.8)	5.3
	2 Stunden - <4 Stunden	7.0	4.1	3.2	1.6	(1.6)	(1.4)	-	3.0
	4 Stunden - <8 Stunden	3.6	(2.5)	(1.4)	(0.6)	-	-	-	1.4
	8 Stunden - <12 Stunden	1.7	2.3	1.2	0.7	0.4	0.1	0.2	1.0
	12 Stunden oder mehr	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	(0.1)
	N gewichtet	1'356	1'624	1'717	1'954	1'438	1'105	750	9'943
	N ungewichtet	1'440	1'183	1'624	1'934	1'494	1'310	769	9'754
2007	nicht ausgesetzt	28.7	41.4	52.8	56.6	62.5	74.7	81.6	53.0
	weniger als 30 Minuten	13.3	13.7	13.3	14.0	10.6	8.6	8.5	12.4
	30 Minuten - <1 Stunde	14.7	14.4	11.6	9.7	7.8	5.5	(4.1)	10.6
	1 Stunde - <2 Stunden	21.2	16.9	11.7	10.4	10.9	7.0	4.1	12.8
	2 Stunden - <4 Stunden	13.3	6.9	6.5	5.5	5.3	2.4	(1.3)	6.6
	4 Stunden - <8 Stunden	4.9	3.8	2.5	2.0	(1.8)	(1.6)	-	2.7
	8 Stunden - <12 Stunden	3.5	2.9	(1.2)	(1.7)	(0.8)	-	-	1.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	1'341	1'295	1'696	1'463	1'209	788	506	8'297
	N ungewichtet	840	1'055	1'664	1'306	1'286	938	642	7'731

Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Passives Rauchen, nach Alter
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012*

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	nicht ausgesetzt	42.7	66.0	82.2	85.9	89.2	91.5	95.6	79.1
	weniger als 30 Minuten	22.8	14.0	9.6	5.7	4.3	3.1	(1.9)	8.8
	30 Minuten - <1 Stunde	10.4	6.3	2.3	1.4	1.9	(1.5)	-	3.4
	1 Stunde - <2 Stunden	9.7	7.3	2.9	3.1	(1.9)	(1.4)	-	3.9
	2 Stunden - <4 Stunden	8.2	3.5	1.8	2.3	(1.3)	(1.4)	-	2.7
	4 Stunden - <8 Stunden	3.7	(2.2)	(0.7)	1.1	0.2	(0.9)	-	1.3
	8 Stunden - <12 Stunden	(1.9)	(0.7)	-	(0.5)	(0.9)	-	-	0.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	N gewichtet	1'317	1'563	1'710	1'948	1'465	1'218	1'215	10'436
2007	N ungewichtet	1'404	1'307	1'812	2'214	1'650	1'427	1'030	10'844
	nicht ausgesetzt	32.8	55.9	68.8	70.3	80.8	87.6	91.6	67.8
	weniger als 30 Minuten	12.9	14.1	11.4	9.6	8.1	5.2	3.6	9.9
	30 Minuten - <1 Stunde	13.3	8.4	5.1	4.6	3.0	3.0	(2.0)	5.9
	1 Stunde - <2 Stunden	19.3	9.8	6.1	6.0	3.4	1.6	(1.6)	7.3
	2 Stunden - <4 Stunden	10.9	7.1	3.8	4.0	2.3	(1.8)	-	4.7
	4 Stunden - <8 Stunden	8.4	2.0	2.9	3.9	1.6	-	-	3.0
	8 Stunden - <12 Stunden	(2.0)	2.6	(1.6)	(1.4)	(0.7)	-	-	1.3
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	1'251	1'336	1'684	1'464	1'307	912	817	8'771
	N ungewichtet	816	1'288	1'914	1'485	1'659	1'413	1'139	9'714

Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Passives Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	nicht ausgesetzt	77.2	72.4	70.4	75.7
	weniger als 30 Minuten	9.8	11.1	12.2	10.2
	30 Minuten - <1 Stunde	4.5	3.6	4.8	4.3
	1 Stunde - <2 Stunden	4.2	5.4	5.8	4.6
	2 Stunden - <4 Stunden	2.4	3.9	3.8	2.8
	4 Stunden - <8 Stunden	1.0	2.3	2.0	1.3
	8 Stunden - <12 Stunden	0.8	1.1	(0.9)	0.9
	12 Stunden oder mehr	(0.1)	(0.2)	-	(0.1)
	N gewichtet	14'594	4'871	914	20'380
N ungewichtet		13'693	5'389	1'516	20'598
2007	nicht ausgesetzt	61.1	57.3	70.0	60.6
	weniger als 30 Minuten	11.4	10.6	7.6	11.1
	30 Minuten - <1 Stunde	8.5	7.8	5.1	8.2
	1 Stunde - <2 Stunden	9.8	11.0	6.2	9.9
	2 Stunden - <4 Stunden	5.1	7.0	6.1	5.6
	4 Stunden - <8 Stunden	2.6	3.6	3.2	2.9
	8 Stunden - <12 Stunden	1.2	2.4	(1.6)	1.5
	12 Stunden oder mehr	(0.1)	(0.3)	-	(0.2)
	N gewichtet	12'297	3'998	773	17'068
N ungewichtet		10'709	5'311	1'425	17'445

Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Passives Rauchen, nach Sprachregion
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	nicht ausgesetzt	73.5	69.2	64.8	72.2
	weniger als 30 Minuten	11.4	12.2	15.2	11.7
	30 Minuten - <1 Stunde	5.4	4.4	6.6	5.2
	1 Stunde - <2 Stunden	5.0	6.3	6.3	5.3
	2 Stunden - <4 Stunden	2.7	3.9	(3.4)	3.0
	4 Stunden - <8 Stunden	1.1	2.5	(1.7)	1.4
	8 Stunden - <12 Stunden	0.9	1.3	(1.7)	1.0
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.1)
	N gewichtet	7'240	2'282	421	9'943
N ungewichtet		6'578	2'483	693	9'754
2007	nicht ausgesetzt	53.2	50.9	62.6	53.0
	weniger als 30 Minuten	12.7	11.9	8.8	12.4
	30 Minuten - <1 Stunde	11.2	10.0	(5.1)	10.6
	1 Stunde - <2 Stunden	12.7	13.6	9.9	12.8
	2 Stunden - <4 Stunden	6.3	7.4	7.4	6.6
	4 Stunden - <8 Stunden	2.4	3.4	(3.3)	2.7
	8 Stunden - <12 Stunden	1.4	2.6	(2.6)	1.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	6'012	1'930	355	8'297
N ungewichtet		4'804	2'333	594	7'731

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Passives Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012*

Tabak		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	nicht ausgesetzt	80.8	75.3	75.1	79.1
	weniger als 30 Minuten	8.3	10.2	9.6	8.8
	30 Minuten - <1 Stunde	3.6	2.8	(3.4)	3.4
	1 Stunde - <2 Stunden	3.5	4.6	5.4	3.9
	2 Stunden - <4 Stunden	2.2	3.9	4.2	2.7
	4 Stunden - <8 Stunden	0.9	2.1	(2.2)	1.3
	8 Stunden - <12 Stunden	0.6	(0.9)	-	0.7
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.1)
	N gewichtet	7'354	2'589	494	10'436
N ungewichtet		7'115	2'906	823	10'844
2007	nicht ausgesetzt	68.7	63.3	76.3	67.8
	weniger als 30 Minuten	10.2	9.4	6.5	9.9
	30 Minuten - <1 Stunde	5.9	5.8	5.0	5.9
	1 Stunde - <2 Stunden	7.1	8.6	(3.1)	7.3
	2 Stunden - <4 Stunden	4.0	6.6	5.0	4.7
	4 Stunden - <8 Stunden	2.8	3.8	(3.2)	3.0
	8 Stunden - <12 Stunden	1.1	2.2	-	1.3
	12 Stunden oder mehr	-	-	-	(0.2)
	N gewichtet	6'285	2'068	418	8'771
N ungewichtet		5'905	2'978	831	9'714

Frage: 'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.


Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

2 Alkohol


**Häufigkeit des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012**



Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Prozente werden gewichtet berechnet.

Anteile der täglich Alkoholkonsumierenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.5)	(0.7)	(0.4)	(0.3)	0.3
	2 mal pro Tag	-	-	1.1	1.7	3.6	5.7	5.6	2.3
	1 mal pro Tag	1.7	2.9	6.5	9.4	15.7	21.6	22.1	10.4
	mehrmals pro Woche	6.8	12.1	12.4	15.3	13.5	12.2	6.6	11.7
	1-2 mal wöchentlich	41.1	37.2	34.7	35.2	30.5	23.7	16.1	32.3
	seltener	31.8	29.5	29.5	24.1	20.7	20.1	26.5	26.2
	nie, abstinent	18.5	18.0	15.7	13.8	15.3	16.2	22.8	16.8
	N (gewichtet)	2'828	3'381	3'624	4'118	3'056	2'425	2'147	21'580
	N (ungewichtet)	2'991	2'618	3'594	4'319	3'262	2'843	1'954	21'581
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.3)	(0.5)	(0.8)	-	0.3
	2 mal pro Tag	-	(0.7)	1.3	2.2	3.7	7.2	5.3	2.5
	1 mal pro Tag	(1.3)	3.3	7.1	13.9	19.1	23.3	22.6	11.4
	mehrmals pro Woche	4.5	9.6	11.4	11.1	11.6	9.5	6.7	9.5
	1-2 mal wöchentlich	39.6	40.8	36.9	34.8	29.5	22.2	16.5	33.4
	seltener	33.4	28.5	28.0	23.1	20.9	20.7	24.2	26.0
	nie, abstinent	20.7	17.1	15.2	14.5	14.7	16.2	24.3	17.0
	N (gewichtet)	2'858	2'875	3'687	3'225	2'708	1'851	1'530	18'733
	N (ungewichtet)	1'809	2'507	3'803	3'004	3'111	2'495	2'002	18'731
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	0.5
	2 mal pro Tag	-	(0.6)	2.6	3.5	5.5	6.0	5.5	3.1
	1 mal pro Tag	(1.5)	4.7	9.0	14.1	20.4	22.3	24.7	12.3
	mehrmals pro Woche	5.0	10.2	12.2	13.6	10.4	8.7	5.1	9.9
	1-2 mal wöchentlich	39.1	37.1	32.1	29.6	26.3	16.7	12.8	29.5
	seltener	27.4	24.6	23.9	19.8	17.9	19.5	19.1	22.1
	nie, abstinent	26.6	22.7	19.8	18.7	18.8	25.8	31.8	22.5
	N (gewichtet)	2'757	3'357	3'930	3'243	2'731	2'102	1'553	19'673
	N (ungewichtet)	1'695	3'018	4'199	3'170	3'240	2'534	1'822	19'678

Fortsetzung →

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	(0.4)	(0.4)	(0.8)	(1.1)	(0.7)	(1.1)	0.6
	2 mal pro Tag	-	1.4	2.8	4.0	5.3	5.8	5.0	3.2
	1 mal pro Tag	2.0	6.3	11.3	17.5	21.7	21.2	21.8	13.3
	mehrmals pro Woche	6.6	12.1	12.5	12.8	10.0	7.4	6.9	10.4
	1-2 mal wöchentlich	33.2	35.0	32.7	28.0	21.2	15.8	11.0	27.5
	seltener	31.9	29.0	25.7	23.3	23.9	24.7	24.8	26.4
	nie, abstinent	25.8	16.0	14.5	13.7	16.8	24.4	29.3	18.7
	N (gewichtet)	1'786	2'502	2'465	2'197	1'635	1'390	1'020	12'996
	N (ungewichtet)	1'412	2'867	2'508	1'958	1'680	1'509	1'063	12'997
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	0.7	1.4	2.1	1.8	(1.0)	(2.0)	1.3
	2 mal pro Tag	(0.5)	3.5	7.1	7.4	9.2	8.2	8.4	5.9
	1 mal pro Tag	3.5	8.4	14.6	16.8	17.6	18.6	22.3	13.3
	mehrmals pro Woche	8.2	12.8	13.3	11.8	9.0	7.6	4.1	10.5
	1-2 mal wöchentlich	33.0	31.6	31.6	26.1	23.8	17.0	12.4	27.1
	seltener	29.4	29.1	21.3	23.3	24.8	27.1	26.9	25.9
	nie, abstinent	25.0	13.7	10.7	12.6	13.8	20.5	23.9	16.1
	N (gewichtet)	2'302	3'182	2'781	2'527	1'800	1'767	922	15'282
	N (ungewichtet)	1'802	3'540	2'872	2'397	2'003	1'707	961	15'282

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'selten als monatlich'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.8)	(1.3)	(0.8)	-	0.5
	2 mal pro Tag	-	-	2.0	2.6	5.6	8.8	9.0	3.4
	1 mal pro Tag	2.9	4.4	9.2	12.7	20.0	25.4	32.4	13.4
	mehrmals pro Woche	9.0	16.5	17.1	18.8	15.7	15.9	9.1	15.3
	1-2 mal wöchentlich	48.8	42.1	39.1	35.7	30.5	24.2	17.9	35.7
	seltener	22.3	24.5	22.7	20.1	16.3	14.2	18.1	20.2
	nie, abstinent	16.6	12.1	9.8	9.3	10.6	10.7	12.8	11.5
	N (gewichtet)	1'440	1'712	1'813	2'083	1'529	1'156	838	10'571
	N (ungewichtet)	1'516	1'239	1'701	2'032	1'564	1'370	854	10'276
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.6)	(0.9)	(1.7)	-	0.5
	2 mal pro Tag	-	(1.1)	2.0	3.4	5.9	11.7	9.2	3.8
	1 mal pro Tag	(1.8)	4.8	9.9	19.4	24.9	29.2	35.9	15.2
	mehrmals pro Woche	6.9	13.2	15.9	13.6	15.1	13.6	10.1	12.9
	1-2 mal wöchentlich	47.0	47.8	42.0	36.1	28.8	23.6	19.4	37.5
	seltener	25.5	22.2	21.3	16.8	14.1	11.3	14.3	18.9
	nie, abstinent	17.7	10.8	8.8	10.1	10.3	8.9	10.5	11.1
	N (gewichtet)	1'471	1'418	1'840	1'617	1'342	859	600	9'147
	N (ungewichtet)	921	1'129	1'772	1'419	1'398	1'009	759	8'407
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	(0.4)	(1.2)	(0.9)	(1.9)	(2.3)	0.8
	2 mal pro Tag	-	(1.0)	4.7	5.9	8.8	11.1	10.0	5.2
	1 mal pro Tag	(2.5)	7.2	12.2	19.0	25.4	30.9	37.0	16.2
	mehrmals pro Woche	7.6	14.8	16.8	18.1	13.5	12.3	8.7	13.9
	1-2 mal wöchentlich	47.2	43.8	33.6	29.0	25.6	18.6	13.2	32.8
	seltener	19.8	20.5	20.6	13.2	13.8	11.0	14.8	16.9
	nie, abstinent	22.2	12.5	11.8	13.6	12.0	14.1	14.1	14.2
	N (gewichtet)	1'403	1'661	1'983	1'635	1'349	897	587	9'516
	N (ungewichtet)	853	1'361	2'057	1'448	1'406	1'062	708	8'895

Fortsetzung →

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	(0.8)	(0.6)	(1.2)	(2.1)	(1.5)	-	1.1
	2 mal pro Tag	-	2.3	4.7	5.8	7.9	10.6	8.2	5.0
	1 mal pro Tag	(3.2)	9.4	15.7	24.7	30.6	29.7	34.9	18.6
	mehrmals pro Woche	10.8	17.2	17.0	17.4	12.2	10.5	11.0	14.6
	1-2 mal wöchentlich	39.8	40.1	34.9	27.8	21.9	18.6	12.5	30.8
	seltener	23.3	21.2	17.9	15.8	16.4	16.9	17.9	18.7
	nie, abstinent	22.0	9.0	9.2	7.4	8.8	12.2	13.8	11.2
	N (gewichtet)	900	1'241	1'244	1'090	809	595	368	6'247
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'154	895	729	586	357	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	(1.3)	2.6	3.7	3.3	(1.6)	(3.0)	2.2
	2 mal pro Tag	-	5.9	11.3	11.5	14.9	13.0	14.0	9.3
	1 mal pro Tag	6.0	11.8	20.6	21.9	25.9	26.6	31.7	18.6
	mehrmals pro Woche	12.1	19.2	16.8	16.2	12.7	9.5	(6.8)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	36.7	34.2	30.3	26.6	23.3	20.1	15.2	28.8
	seltener	22.4	19.6	12.4	13.8	14.3	19.9	19.0	17.1
	nie, abstinent	21.2	7.9	5.9	6.4	5.4	9.2	10.3	9.4
	N (gewichtet)	1'164	1'533	1'374	1'209	859	822	391	7'353
	N (ungewichtet)	857	1'640	1'395	1'090	859	675	334	6'850

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	2 mal pro Tag	-	-	-	(0.8)	(1.5)	2.8	3.4	1.2
	1 mal pro Tag	-	(1.3)	3.8	5.9	11.4	18.2	15.5	7.5
	mehrmals pro Woche	4.5	7.6	7.7	11.6	11.3	8.8	5.0	8.3
	1-2 mal wöchentlich	33.0	32.2	30.3	34.8	30.4	23.3	14.9	29.1
	seltener	41.6	34.6	36.3	28.2	25.0	25.5	31.9	31.9
	nie, abstinent	20.4	24.1	21.5	18.5	20.1	21.3	29.2	21.9
	N (gewichtet)	1'388	1'669	1'811	2'035	1'527	1'269	1'309	11'009
	N (ungewichtet)	1'475	1379	1'893	2'287	1'698	1'473	1'100	11'305
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	2 mal pro Tag	-	-	(0.6)	(0.9)	1.7	3.3	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	(1.8)	4.2	8.4	13.4	18.3	14.0	7.8
	mehrmals pro Woche	(1.9)	6.2	7.0	8.7	8.2	5.9	4.5	6.2
	1-2 mal wöchentlich	31.8	33.9	31.8	33.5	30.2	21.0	14.7	29.4
	seltener	41.6	34.7	34.6	29.4	27.6	28.9	30.7	32.8
	nie, abstinent	23.9	23.2	21.7	19.0	18.9	22.5	33.2	22.6
	N (gewichtet)	1'387	1'457	1'846	1'608	1'366	991	930	9'586
	N (ungewichtet)	888	1'378	2'031	1'585	1'713	1'486	1'243	10'324
2002	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	2 mal pro Tag	-	-	(0.5)	(1.1)	2.2	2.2	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	2.3	5.8	9.0	15.6	15.9	17.2	8.6
	mehrmals pro Woche	(2.2)	5.6	7.5	9.0	7.4	6.0	3.0	6.1
	1-2 mal wöchentlich	30.7	30.5	30.5	30.2	26.9	15.3	12.6	26.5
	seltener	35.3	28.6	27.3	26.4	22.0	25.8	21.7	27.0
	nie, abstinent	31.1	32.8	28.0	23.9	25.5	34.6	42.5	30.4
	N (gewichtet)	1'354	1'696	1'947	1'607	1'381	1'205	966	10'157
	N (ungewichtet)	842	1'657	2'142	1'722	1'834	1'472	1'114	10'783

Fortsetzung →

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	0.2
	2 mal pro Tag	-	-	(0.9)	(2.3)	2.7	(2.1)	(3.2)
	1 mal pro Tag	-	3.2	7.0	10.5	13.1	14.8	14.4
	mehrmals pro Woche	(2.4)	7.0	7.8	8.2	7.9	5.0	(4.6)
	1-2 mal wöchentlich	26.5	29.9	30.5	28.2	20.5	13.8	10.2
	seltener	40.7	36.6	33.6	30.6	31.1	30.6	28.7
	nie, abstinent	29.7	22.9	20.0	19.8	24.5	33.5	38.2
	N (gewichtet)	887	1'261	1'221	1'107	826	795	652
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'063	951	923	706
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.7)	-	-	0.4
	2 mal pro Tag	-	(1.3)	3.0	3.6	4.0	3.9	(4.2)
	1 mal pro Tag	(0.9)	5.3	8.8	12.1	10.1	11.6	15.4
	mehrmals pro Woche	4.1	6.9	10.0	7.7	5.5	5.9	(2.1)
	1-2 mal wöchentlich	29.2	29.2	32.8	25.6	24.2	14.3	10.4
	seltener	36.6	38.0	29.9	32.0	34.4	33.4	32.6
	nie, abstinent	29.0	19.1	15.3	18.3	21.4	30.4	34.0
	N (gewichtet)	1'138	1'649	1'407	1'318	941	945	531
	N (ungewichtet)	945	1900	1'477	1'307	1'144	1'032	627

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'selten als monatlich'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	3 mal oder mehr pro Tag	0.2	0.7	(0.9)	0.3
	2 mal pro Tag	1.1	4.6	8.1	2.3
	1 mal pro Tag	9.5	12.4	14.0	10.4
	mehrmals pro Woche	12.3	10.7	8.1	11.7
	1-2 mal wöchentlich	34.2	28.3	24.5	32.3
	seltener	27.5	23.2	21.3	26.2
	nie, abstinent	15.3	20.1	23.1	16.8
	N (gewichtet)	15'391	5'221	968	21'580
	N (ungewichtet)	14'284	5'703	1'594	21'581
2007	3 mal oder mehr pro Tag	(0.2)	0.6	(0.6)	0.3
	2 mal pro Tag	1.4	4.9	7.6	2.5
	1 mal pro Tag	10.3	13.1	19.4	11.4
	mehrmals pro Woche	9.8	9.6	4.8	9.5
	1-2 mal wöchentlich	35.5	30.0	17.1	33.4
	seltener	27.7	22.6	16.5	26.0
	nie, abstinent	15.2	19.3	34.0	17.0
	N (gewichtet)	13'477	4'404	852	18'733
	N (ungewichtet)	11'475	5'717	1'539	18'731
2002	3 mal oder mehr pro Tag	0.4	0.8	(0.9)	0.5
	2 mal pro Tag	1.8	5.4	12.4	3.1
	1 mal pro Tag	11.3	15.0	13.9	12.3
	mehrmals pro Woche	11.1	7.2	4.8	9.9
	1-2 mal wöchentlich	31.9	25.2	14.2	29.5
	seltener	23.4	19.1	17.0	22.1
	nie, abstinent	20.1	27.4	36.7	22.5
	N (gewichtet)	14'201	4'565	907	19'673
	N (ungewichtet)	13'199	4'929	1'550	19'678

Fortsetzung →

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)*

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
	%	%	%	%	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	0.4	1.0	(1.4)	0.6
	2 mal pro Tag	1.5	6.6	11.6	3.2
	1 mal pro Tag	12.1	16.6	15.6	13.3
	mehrmals pro Woche	11.2	8.6	6.0	10.4
	1-2 mal wöchentlich	29.1	25.2	14.8	27.5
	seltener	28.0	22.9	19.6	26.4
	nie, abstinenter	17.7	19.2	30.9	18.7
	N (gewichtet)	9'290	3'085	621	12'996
	N (ungewichtet)	8'257	3'610	1'130	12'997
1992	3 mal oder mehr pro Tag	0.9	1.9	4.3	1.3
	2 mal pro Tag	3.5	11.4	14.6	5.9
	1 mal pro Tag	12.5	15.3	15.1	13.3
	mehrmals pro Woche	12.0	6.6	5.7	10.5
	1-2 mal wöchentlich	29.2	24.2	10.8	27.1
	seltener	26.6	24.9	20.1	25.9
	nie, abstinenter	15.4	15.7	29.3	16.1
	N (gewichtet)	10'970	3'595	717	15'282
	N (ungewichtet)	10'335	4'116	831	15'282

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	1.2	(1.6)	0.5
	2 mal pro Tag	1.8	6.9	12.3	3.4
	1 mal pro Tag	12.3	16.2	17.1	13.4
	mehrmals pro Woche	15.9	14.1	10.8	15.3
	1-2 mal wöchentlich	38.0	30.3	26.1	35.7
	seltener	21.0	18.1	17.8	20.2
	nie, abstinent	10.7	13.2	14.3	11.5
	N (gewichtet)	7'651	2'470	450	10'571
	N (ungewichtet)	6'886	2'653	737	10'276
2007	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	1.1	(1.2)	0.5
	2 mal pro Tag	2.2	7.5	11.5	3.8
	1 mal pro Tag	14.1	17.0	24.6	15.2
	mehrmals pro Woche	13.3	13.0	6.6	12.9
	1-2 mal wöchentlich	40.2	32.9	19.1	37.5
	seltener	20.0	15.8	15.8	18.9
	nie, abstinent	10.0	12.7	21.3	11.1
	N (gewichtet)	6'591	2'155	401	9'147
	N (ungewichtet)	5'194	2'552	661	8'407
2002	3 mal oder mehr pro Tag	0.6	1.4	(1.4)	0.8
	2 mal pro Tag	3.1	8.9	20.5	5.2
	1 mal pro Tag	15.5	18.8	15.9	16.2
	mehrmals pro Woche	15.6	10.0	5.7	13.9
	1-2 mal wöchentlich	35.2	27.6	18.9	32.8
	seltener	17.4	15.7	15.8	16.9
	nie, abstinent	12.7	17.4	21.8	14.2
	N (gewichtet)	6'979	2'114	423	9'516
	N (ungewichtet)	6'098	2'118	679	8'895

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
 Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
 (Fortsetzung)

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
	%	%	%	%	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	0.6	2.0	(3.1)	1.1
	2 mal pro Tag	2.3	10.5	19.6	5.0
	1 mal pro Tag	17.6	21.4	20.3	18.6
	mehrmals pro Woche	16.0	11.7	7.4	14.6
	1-2 mal wöchentlich	32.4	28.3	18.1	30.8
	seltener	20.1	14.9	14.7	18.7
	nie, abstinenter	10.8	11.3	16.7	11.2
	N (gewichtet)	4'529	1'441	276	6'247
	N (ungewichtet)	3'738	1'549	468	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	1.5	3.2	(8.6)	2.2
	2 mal pro Tag	6.0	17.2	22.1	9.3
	1 mal pro Tag	18.8	18.2	16.7	18.6
	mehrmals pro Woche	17.0	8.7	(8.1)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	30.4	26.9	12.6	28.8
	seltener	17.5	16.3	15.2	17.1
	nie, abstinenter	8.9	9.5	16.6	9.4
	N (gewichtet)	5'306	1'709	338	7'353
	N (ungewichtet)	4'663	1'853	334	6'850

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012*

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.1)
	2 mal pro Tag	0.4	2.7	4.5	1.2
	1 mal pro Tag	6.7	9.0	11.2	7.5
	mehrmals pro Woche	8.8	7.6	5.8	8.3
	1-2 mal wöchentlich	30.5	26.5	23.1	29.1
	seltener	33.8	27.8	24.3	31.9
	nie, abstinent	19.8	26.2	30.7	21.9
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'398	3'050	857	11'305
2007	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-
	2 mal pro Tag	0.5	2.4	4.2	1.1
	1 mal pro Tag	6.8	9.4	14.7	7.8
	mehrmals pro Woche	6.4	6.2	3.1	6.2
	1-2 mal wöchentlich	31.0	27.2	15.4	29.4
	seltener	35.0	29.0	17.1	32.8
	nie, abstinent	20.1	25.7	45.4	22.6
	N (gewichtet)	6'886	2'249	451	9'586
	N (ungewichtet)	6'281	3'165	878	10'324
2002	3 mal oder mehr pro Tag	(0.2)	-	-	0.3
	2 mal pro Tag	0.5	2.3	5.4	1.1
	1 mal pro Tag	7.3	11.8	12.0	8.6
	mehrmals pro Woche	6.7	4.7	4.1	6.1
	1-2 mal wöchentlich	28.8	23.0	10.1	26.5
	seltener	29.3	22.1	18.1	27.0
	nie, abstinent	27.2	35.9	49.8	30.4
	N (gewichtet)	7'222	2'451	484	10'157
	N (ungewichtet)	7'101	2'811	871	10'783

Fortsetzung →

*Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)*

Alkohol	Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
		Französisch %	Italienisch %	
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-
	2 mal pro Tag	(0.7)	3.1	5.1
	1 mal pro Tag	6.8	12.3	11.9
	mehrmals pro Woche	6.7	5.9	5.0
	1-2 mal wöchentlich	25.9	22.4	12.2
	seltener	35.4	29.9	23.6
	nie, abstinent	24.3	26.1	42.2
	N (gewichtet)	4'760	1'644	345
	N (ungewichtet)	4'519	2'061	662
1992	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	(0.7)	-
	2 mal pro Tag	1.1	6.2	7.8
	1 mal pro Tag	6.6	12.7	13.7
	mehrmals pro Woche	7.4	4.7	(3.7)
	1-2 mal wöchentlich	28.0	21.8	9.1
	seltener	35.1	32.8	24.6
	nie, abstinent	21.4	21.2	40.7
	N (gewichtet)	5'664	1'886	379
	N (ungewichtet)	5'672	2'263	497

Frage: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Lebenszeit-Abstinenz	14.1	9.7	10.7	9.3	9.1	9.5	12.6	10.5
	ehemaliger Konsum	4.4	8.3	5.0	4.5	6.4	6.8	10.2	6.3
	aktueller Konsum	81.5	82.0	84.3	86.1	84.5	83.7	77.2	83.2
	N (gewichtet)	2'829	3'379	3'626	4'121	3'061	2'429	2'150	21'595
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'597	4'322	3'261	2'847	1'958	21'594
2007	Lebenszeit-Abstinenz	14.9	12.1	10.4	9.0	9.0	10.1	16.6	11.4
	ehemaliger Konsum	6.1	5.0	4.8	5.6	5.7	6.1	7.8	5.7
	aktueller Konsum	79.1	82.9	84.8	85.4	85.3	83.8	75.6	83.0
	N (gewichtet)	2'865	2'877	3'690	3'228	2'714	1'852	1'533	18'759
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'808	3'006	3'118	2'496	2'008	18'758
2002	Lebenszeit-Abstinenz	23.5	18.3	16.5	14.8	13.7	19.7	26.3	18.2
	ehemaliger Konsum	3.1	4.5	3.3	3.8	5.1	6.2	5.5	4.3
	aktueller Konsum	73.4	77.2	80.2	81.3	81.2	74.1	68.2	77.4
	N (gewichtet)	2'759	3'361	3'930	3'240	2'731	2'104	1'553	19'678
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'168	3'240	2'536	1'822	19'680
1997	Lebenszeit-Abstinenz	22.7	12.2	10.4	9.0	11.8	18.1	22.7	14.2
	ehemaliger Konsum	3.1	3.7	4.2	4.7	5.0	6.2	6.5	4.5
	aktueller Konsum	74.2	84.0	85.4	86.4	83.2	75.7	70.8	81.3
	N (gewichtet)	1'786	2'502	2'466	2'196	1'637	1'389	1'018	12'994
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'509	1'957	1'681	1'508	1'059	12'992

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

**Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Lebenszeit-Abstinenz	12.3	6.3	6.1	5.1	4.9	4.4	4.7	6.3
	ehemals Konsumierende	4.3	5.8	3.8	4.2	6.0	6.4	8.1	5.2
	aktuell Konsumierende	83.4	87.9	90.1	90.7	89.1	89.3	87.2	88.5
	N (gewichtet)	1'440	1'712	1'815	2'086	1'535	1'156	839	10'582
	N (ungewichtet)	1'516	1'239	1'703	2'035	1'565	1'370	855	10'283
2007	Lebenszeit-Abstinenz	12.7	7.1	5.2	3.9	3.8	4.2	4.3	6.1
	ehemals Konsumierende	5.3	3.6	3.5	6.3	6.5	4.8	6.2	5.1
	aktuell Konsumierende	82.0	89.2	91.3	89.8	89.6	91.0	89.5	88.8
	N (gewichtet)	1'476	1'419	1'842	1'619	1'344	860	601	9'162
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'421	1'401	1'010	762	8'422
2002	Lebenszeit-Abstinenz	19.3	8.9	8.6	9.2	6.2	8.8	8.4	10.0
	ehemaliger Konsum	(3.1)	3.5	3.2	4.3	5.9	5.4	5.8	4.2
	aktueller Konsum	77.7	87.5	88.2	86.5	87.9	85.8	85.8	85.8
	N (gewichtet)	1'405	1'661	1'983	1'632	1'351	898	587	9'517
	N (ungewichtet)	854	1'361	2'057	1'447	1'407	1'063	709	8'898
1997	Lebenszeit-Abstinenz	19.0	6.8	4.6	3.0	5.4	6.9	(7.1)	7.3
	ehemaliger Konsum	(3.1)	2.2	4.7	4.4	(3.6)	5.1	(6.6)	3.9
	aktueller Konsum	78.0	91.0	90.7	92.6	91.0	88.0	86.3	88.8
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	810	593	368	6'248
	N (ungewichtet)	685	1'348	1'155	895	730	585	356	5'754

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	Lebenszeit-Abstinenz	15.9	13.2	15.2	13.6	13.3	14.3	17.6	14.6
	ehemaliger Konsum	4.6	10.8	6.3	4.9	6.7	7.1	11.6	7.3
	aktueller Konsum	79.6	76.0	78.5	81.5	79.9	78.6	70.8	78.1
	N (gewichtet)	1'389	1'667	1'811	2'035	1'526	1'272	1'311	11'012
	N (ungewichtet)	1'476	1'378	1'894	2'287	1'696	1'477	1'103	11'311
2007	Lebenszeit-Abstinenz	17.2	16.9	15.7	14.2	14.0	15.3	24.6	16.4
	ehemaliger Konsum	6.9	6.3	6.0	4.8	5.0	7.3	8.7	6.2
	aktueller Konsum	75.9	76.8	78.4	81.0	81.0	77.5	66.7	77.4
	N (gewichtet)	1'390	1'458	1'848	1'608	1'370	991	931	9'597
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'033	1'585	1'717	1'486	1'246	10'336
2002	Lebenszeit-Abstinenz	27.9	27.5	24.6	20.6	21.1	27.8	37.2	26.0
	ehemaliger Konsum	(3.2)	5.5	3.4	3.4	4.4	6.9	5.3	4.4
	aktueller Konsum	68.9	67.0	72.0	76.1	74.5	65.4	57.5	69.6
	N (gewichtet)	1'353	1'700	1'947	1'608	1'380	1'206	966	10'161
	N (ungewichtet)	841	1'659	2'142	1'721	1'833	1'473	1'113	10'782
1997	Lebenszeit-Abstinenz	26.6	17.6	16.4	14.8	18.1	26.5	31.6	20.6
	ehemaliger Konsum	(3.1)	5.3	3.6	4.9	6.4	7.0	6.4	5.1
	aktueller Konsum	70.3	77.1	80.0	80.3	75.5	66.5	62.0	74.4
	N (gewichtet)	887	1'261	1'221	1'106	826	795	650	6'746
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'062	951	923	703	7'238

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012*

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Lebenszeit-Abstinenz	9.2	13.8	14.9	10.5
	ehemaliger Konsum	6.2	6.2	8.2	6.3
	aktueller Konsum	84.7	79.9	76.8	83.2
	<i>N (gewichtet)</i>	15'403	5'223	969	21'595
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'292	5'706	1'596	21'594
2007	Lebenszeit-Abstinenz	9.6	13.9	26.2	11.4
	ehemaliger Konsum	5.6	5.4	8.1	5.7
	aktueller Konsum	84.8	80.6	65.7	83.0
	<i>N (gewichtet)</i>	13'494	4'409	856	18'759
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'489	5'725	1'544	18'758
2002	Lebenszeit-Abstinenz	15.8	23.2	31.5	18.2
	ehemaliger Konsum	4.3	4.1	5.2	4.3
	aktueller Konsum	79.9	72.7	63.3	77.4
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'562	907	19'678
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'200	4'930	1'550	19'680
1997	Lebenszeit-Abstinenz	13.4	14.6	24.2	14.2
	ehemaliger Konsum	4.4	4.5	6.6	4.5
	aktueller Konsum	82.2	80.9	69.2	81.3
	<i>N (gewichtet)</i>	9'291	3'082	620	12'994
	<i>N (ungewichtet)</i>	8'258	3'607	1'127	12'992

Fragen: *'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'*

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

**Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Lebenszeit-Abstinenz	5.7	7.9	8.7	6.3
	ehemaliger Konsum	5.1	5.3	5.7	5.2
	aktueller Konsum	89.2	86.8	85.6	88.5
	<i>N (gewichtet)</i>	7'660	2'472	451	10'582
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'891	2'654	738	10'283
2007	Lebenszeit-Abstinenz	5.1	7.7	13.7	6.1
	ehemaliger Konsum	4.9	5.0	8.0	5.1
	aktueller Konsum	90.0	87.3	78.2	88.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'601	2'157	403	9'162
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'202	2'556	664	8'422
2002	Lebenszeit-Abstinenz	8.5	13.6	16.8	10.0
	ehemaliger Konsum	4.3	3.7	4.9	4.2
	aktueller Konsum	87.2	82.7	78.2	85.8
	<i>N (gewichtet)</i>	6'983	2'111	423	9'517
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'101	2'118	679	8'898
1997	Lebenszeit-Abstinenz	7.0	7.4	11.0	7.3
	ehemaliger Konsum	3.9	3.7	(5.6)	3.9
	aktueller Konsum	89.1	88.8	83.4	88.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'532	1'440	276	6'248
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'740	1'548	466	5'754

Fragen: *'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'*

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	Lebenszeit-Abstinenz	12.6	19.2	20.3	14.6
	ehemaliger Konsum	7.2	7.0	10.5	7.3
	aktueller Konsum	80.2	73.8	69.2	78.1
	<i>N (gewichtet)</i>	7'743	2'751	518	11'012
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'401	3'052	858	11'311
2007	Lebenszeit-Abstinenz	13.9	19.9	37.4	16.4
	ehemaliger Konsum	6.2	5.9	8.1	6.2
	aktueller Konsum	79.9	74.2	54.5	77.4
	<i>N (gewichtet)</i>	6'892	2'252	452	9'597
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'287	3'169	880	10'336
2002	Lebenszeit-Abstinenz	22.9	31.6	44.3	26.0
	ehemaliger Konsum	4.4	4.4	5.5	4.4
	aktueller Konsum	72.7	64.1	50.2	69.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'226	2'452	484	10'161
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'099	2'812	871	10'782
1997	Lebenszeit-Abstinenz	19.4	20.9	34.7	20.6
	ehemaliger Konsum	4.9	5.2	7.4	5.1
	aktueller Konsum	75.7	73.9	57.9	74.4
	<i>N (gewichtet)</i>	4'759	1'642	344	6'746
	<i>N (ungewichtet)</i>	4'518	2'059	661	7'238

Fragen: 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?' Falls kein Konsum: 'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	1.8	2.7	4.1	4.1	5.8	4.4	3.0	3.7
	fast täglich	1.7	1.4	1.0	1.5	1.3	1.0	-	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	7.3	7.4	6.2	5.4	4.5	4.2	2.3	5.5
	1 oder 2mal diese Woche	30.2	29.2	25.2	23.3	20.9	17.1	11.9	23.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	59.1	59.3	63.5	65.7	67.6	73.2	82.4	66.2
	N (gewichtet)	2'734	3'236	3'475	3'951	2'930	2'353	1'974	20'652
	N (ungewichtet)	2'899	2'529	3'475	4'189	3'178	2'769	1'811	20'850
2007	täglich	1.6	3.3	3.6	4.7	5.4	5.3	2.3	3.8
	fast täglich	(1.4)	(1.0)	1.2	1.2	1.6	(1.2)	(0.5)	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	6.7	6.7	5.9	5.0	4.6	2.9	2.0	5.2
	1 oder 2mal diese Woche	28.3	27.1	23.8	20.5	17.9	15.4	11.9	21.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	62.0	62.0	65.5	68.5	70.5	75.2	83.4	68.0
	N (gewichtet)	2'669	2'697	3'473	-	2'577	1'757	1'361	17'550
	N (ungewichtet)	1'713	2'391	3'654	2'876	3'011	2'416	1'825	17'886
2002	täglich	2.0	2.5	4.7	5.2	6.2	4.7	2.4	4.1
	fast täglich	(1.0)	1.4	1.5	2.0	1.3	(0.9)	(1.0)	1.4
	3 oder 4mal diese Woche	5.2	5.9	5.5	5.0	3.3	3.3	(1.8)	4.6
	1 oder 2mal diese Woche	25.7	22.3	20.7	19.9	18.4	15.4	9.9	19.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	66.1	67.8	67.5	67.8	70.8	75.8	85.0	70.1
	N (gewichtet)	2'600	3'154	3'720	3'071	2'588	2'001	1'386	18'521
	N (ungewichtet)	1'600	2'892	4'035	3'039	3'109	2'431	1'678	18'784
1997	täglich	1.5	4.3	5.5	6.5	5.7	4.3	(2.5)	4.5
	fast täglich	(1.9)	1.7	2.4	2.6	2.3	(0.7)	-	1.9
	3 oder 4mal diese Woche	4.3	6.7	6.0	5.7	5.2	3.0	(1.3)	5.1
	1 oder 2mal diese Woche	28.2	24.5	23.7	20.2	16.8	13.6	10.7	21.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	64.2	62.8	62.5	65.0	69.9	78.4	84.4	67.5
	N (gewichtet)	1'765	2'446	2'413	2'163	1'593	1'336	937	12'654
	N (ungewichtet)	1'394	2'828	2'474	1'937	1'652	1'461	997	12'743

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	2.8	4.3	7.0	7.1	10.8	8.2	6.8	6.7
	fast täglich	2.9	(2.6)	1.7	2.8	2.0	2.0	-	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	11.8	11.4	10.7	9.4	7.4	7.8	4.4	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	39.3	40.0	35.8	31.6	30.0	25.4	21.3	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	43.2	41.8	44.7	49.0	49.8	56.6	66.7	48.6
	N (gewichtet)	1'393	1'655	1'745	1'983	1'455	1'118	756	10'105
	N (ungewichtet)	1'473	1'203	1'646	1'957	1'514	1'326	777	9'896
2007	täglich	(2.2)	4.9	6.3	8.8	10.1	10.3	5.6	6.8
	fast täglich	(2.1)	(1.7)	2.1	2.4	2.9	(2.4)	-	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	10.7	11.4	10.6	8.0	9.0	5.5	4.6	9.2
	1 oder 2mal diese Woche	37.5	38.9	35.8	32.4	27.6	25.2	23.6	33.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	47.5	43.1	45.2	48.4	50.4	56.7	65.6	48.9
	N (gewichtet)	1'369	1'326	1'738	1'500	1'241	818	520	8'511
	N (ungewichtet)	864	1'073	1'695	1'342	1'318	967	659	7'918
2002	täglich	(3.3)	4.5	8.9	10.0	11.3	10.3	5.8	7.8
	fast täglich	(1.7)	2.6	2.8	3.8	2.3	(1.6)	(1.4)	2.5
	3 oder 4mal diese Woche	8.9	10.9	9.6	8.9	6.2	7.5	(4.4)	8.6
	1 oder 2mal diese Woche	35.5	35.8	31.5	29.9	26.2	24.8	19.0	30.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	50.6	46.1	47.2	47.3	54.0	55.8	69.3	50.5
	N (gewichtet)	1'316	1'538	1'860	1'527	1'228	821	493	8'783
	N (ungewichtet)	801	1'286	1'952	1'367	1'301	984	620	8'311
1997	täglich	(2.2)	8.1	9.5	12.4	10.7	9.1	(5.7)	8.6
	fast täglich	(3.6)	3.2	4.4	4.9	4.5	-	-	3.7
	3 oder 4mal diese Woche	7.0	12.0	10.3	10.8	9.8	6.8	(3.3)	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	39.1	34.3	32.9	28.7	26.2	22.3	20.5	30.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	48.1	42.4	43.0	43.2	48.8	60.5	68.1	47.4
	N (gewichtet)	888	1'212	1'218	1'074	781	561	329	6'062
	N (ungewichtet)	675	1'330	1'138	884	709	558	324	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.8)	(1.0)	(1.2)	(1.0)	(0.8)	(1.0)	-	1.0
	fast täglich	-	-	-	-	(0.6)	-	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	2.6	3.2	1.7	1.3	(1.5)	(1.0)	(1.0)	1.8
	1 oder 2mal diese Woche	20.6	17.9	14.5	15.0	12.0	9.6	6.2	14.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.6	77.7	82.3	82.5	85.1	88.3	92.1	83.0
	N (gewichtet)	1'341	1'581	1'730	1'968	1'475	1'235	1'218	10'547
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'829	2'232	1'664	1'443	1'034	10'954
2007	täglich	(1.0)	(1.7)	(1.0)	(0.7)	(1.0)	(1.0)	-	1.0
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(2.4)	(2.1)	(1.2)	2.1	(0.6)	-	-	1.5
	1 oder 2mal diese Woche	18.7	15.8	11.8	8.8	8.9	6.8	4.6	11.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	77.1	80.2	85.8	88.3	89.2	91.3	94.4	86.0
	N (gewichtet)	1'300	1'372	1'735	1'516	1'336	939	841	9'039
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'959	1'534	1'693	1'449	1'166	9'968
2002	täglich	-	(0.6)	(0.5)	(0.5)	(1.6)	-	-	0.7
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.4)	(1.1)	1.4	(1.2)	(0.7)	-	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	15.6	9.5	9.9	10.0	11.4	8.9	4.8	10.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	82.0	88.5	87.9	88.1	86.0	89.7	93.6	87.7
	N (gewichtet)	1'284	1'616	1'860	1'544	1'360	1'180	893	9'737
	N (ungewichtet)	799	1'606	2'083	1'672	1'808	1'447	1'058	10'473
1997	täglich	-	-	(1.3)	-	-	-	-	0.8
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.6)	(1.5)	(1.6)	-	-	-	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	17.1	15.0	14.3	11.8	7.9	7.3	5.4	11.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.4	82.8	82.4	86.6	90.3	91.5	93.2	85.9
	N (gewichtet)	877	1'235	1'195	1'089	813	775	609	6'592
	N (ungewichtet)	719	1'498	1'336	1'053	943	903	673	7'125

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	3.4	4.7	3.7	3.7
	fast täglich	1.1	1.6	(1.1)	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	5.6	5.5	5.1	5.5
	1 oder 2mal diese Woche	24.6	19.7	23.3	23.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	65.3	68.6	66.9	66.2
	N (gewichtet)	14'748	4'977	927	20'652
	N (ungewichtet)	13'816	5'500	1'534	20'850
2007	täglich	3.3	5.2	4.0	3.8
	fast täglich	1.2	1.1	-	1.2
	3 oder 4mal diese Woche	5.2	5.5	4.0	5.2
	1 oder 2mal diese Woche	22.7	19.9	17.2	21.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	67.6	68.2	74.1	68.0
	N (gewichtet)	12'673	4'081	795	17'550
	N (ungewichtet)	11'017	5'412	1'457	17'886
2002	täglich	3.9	4.6	5.4	4.1
	fast täglich	1.3	1.5	(1.7)	1.4
	3 oder 4mal diese Woche	4.6	4.8	3.4	4.6
	1 oder 2mal diese Woche	20.8	17.6	16.0	19.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	69.4	71.6	73.6	70.1
	N (gewichtet)	13'351	4'335	835	18'521
	N (ungewichtet)	12'612	4'724	1'448	18'784
1997	täglich	4.2	5.3	5.6	4.5
	fast täglich	1.9	2.1	(1.8)	1.9
	3 oder 4mal diese Woche	5.3	4.6	4.3	5.1
	1 oder 2mal diese Woche	21.8	19.3	17.5	21.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	66.8	68.7	70.8	67.5
	N (gewichtet)	9'007	3'035	612	12'654
	N (ungewichtet)	8'064	3'563	1'116	12'743

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.

Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	6.1	8.2	7.1	6.7
	fast täglich	2.1	2.8	(1.7)	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	9.5	9.6	8.2	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	35.0	27.8	30.1	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	47.4	51.6	52.9	48.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'337	2'338	430	10'105
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'650	2'541	705	9'896
2007	täglich	5.9	9.3	7.4	6.8
	fast täglich	2.3	2.0	-	2.2
	3 oder 4mal diese Woche	9.1	9.7	7.0	9.2
	1 oder 2mal diese Woche	34.7	29.3	23.7	33.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	48.0	49.7	60.4	48.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'175	1'969	367	8'511
	<i>N (ungewichtet)</i>	4'937	2'371	610	7'918
2002	täglich	7.2	9.2	10.1	7.8
	fast täglich	2.4	2.7	(3.3)	2.5
	3 oder 4mal diese Woche	8.5	9.4	7.5	8.6
	1 oder 2mal diese Woche	32.1	26.5	23.7	30.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.7	52.2	55.4	50.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'439	1'971	373	8'783
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'713	1'988	610	8'311
1997	täglich	7.9	10.4	11.1	8.6
	fast täglich	3.7	4.0	(3.1)	3.7
	3 oder 4mal diese Woche	9.7	9.0	9.0	9.5
	1 oder 2mal diese Woche	31.6	29.0	27.6	30.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	47.2	47.6	49.2	47.4
	<i>N (gewichtet)</i>	4'379	1'411	272	6'062
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Bier		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	0.8	1.5	-	1.0
	fast täglich	(0.2)	(0.4)	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	1.7	2.0	(2.4)	1.8
	1 oder 2mal diese Woche	14.3	12.5	17.4	14.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	83.1	83.6	78.9	83.0
	N (gewichtet)	7'411	2'639	497	10'547
	N (ungewichtet)	7'166	2'959	829	10'954
2007	täglich	0.8	1.4	-	1.0
	fast täglich	(0.3)	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.4	1.6	(1.5)	1.5
	1 oder 2mal diese Woche	11.3	11.1	11.7	11.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	86.2	85.5	85.8	86.0
	N (gewichtet)	6'498	2'112	428	9'039
	N (ungewichtet)	6'080	-	847	9'968
2002	täglich	0.7	(0.7)	(1.5)	0.7
	fast täglich	(0.3)	(0.4)	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	0.9	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	10.3	10.1	9.7	10.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	87.7	87.8	88.3	87.7
	N (gewichtet)	6'913	2'363	461	9'737
	N (ungewichtet)	6'899	2'736	838	10'473
1997	täglich	0.8	(0.9)	-	0.8
	fast täglich	(0.2)	-	-	(0.3)
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	(0.8)	-	1.0
	1 oder 2mal diese Woche	12.5	10.8	9.4	11.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	85.4	87.1	88.1	85.9
	N (gewichtet)	4'628	1'624	340	6'592
	N (ungewichtet)	4'427	2'043	655	7'125

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.8)	1.6	4.7	7.2	15.4	23.1	22.9	9.5
	fast täglich	-	(0.8)	1.3	2.9	3.8	3.6	2.3	2.1
	3 oder 4mal diese Woche	2.1	4.3	7.1	10.2	11.3	9.8	6.6	7.5
	1 oder 2mal diese Woche	20.1	31.6	35.1	37.3	32.9	27.2	20.8	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.7	61.7	51.8	42.4	36.5	36.4	47.4	50.5
	N (gewichtet)	2'733	3'237	3'478	3'951	2'932	2'350	1'974	20'656
	N (ungewichtet)	2'898	2'529	3'477	4'188	3'180	2'767	1'811	20'850
2007	täglich	(1.1)	2.5	5.9	11.8	17.2	25.4	25.3	10.8
	fast täglich	-	(1.1)	1.7	3.1	4.4	4.5	3.7	2.4
	3 oder 4mal diese Woche	1.2	5.0	8.5	8.7	10.4	9.4	5.0	7.0
	1 oder 2mal diese Woche	19.1	37.3	39.3	38.6	33.4	26.6	20.1	32.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.4	54.1	44.7	37.9	34.7	34.2	45.9	47.7
	N (gewichtet)	2'666	2'697	3'469	3'019	2'580	1'759	1'361	17'551
	N (ungewichtet)	1'710	2'391	3'651	2'880	3'015	2'419	1'823	17'889
2002	täglich	(1.2)	4.2	9.1	13.4	21.1	23.6	26.0	12.4
	fast täglich	-	1.5	3.0	4.9	4.4	4.7	4.1	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	(1.4)	6.3	8.6	10.8	8.6	6.8	4.7	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	18.6	38.2	37.6	35.7	32.9	25.6	19.8	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	49.8	41.8	35.2	33.1	39.4	45.5	46.0
	N (gewichtet)	2'599	3'148	3'709	3'058	-	1'998	1'370	18'458
	N (ungewichtet)	1'598	2'884	4'029	3'028	3'102	2'428	1'663	18'732
1997	täglich	(1.2)	5.3	10.7	16.1	20.6	23.1	23.3	12.7
	fast täglich	-	1.5	3.4	4.4	5.8	4.9	5.4	3.4
	3 oder 4mal diese Woche	2.9	7.7	8.8	9.3	8.0	5.4	4.5	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	22.1	40.3	40.7	37.2	33.2	25.2	20.5	33.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.2	45.2	36.5	33.0	32.4	41.3	46.4	43.4
	N (gewichtet)	1'761	2'448	2'412	2'160	1'595	1'338	935	12'649
	N (ungewichtet)	1'392	2'830	2'472	1'935	1'653	1'461	993	12'736

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.

Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(1.4)	(1.9)	6.4	8.2	17.7	27.8	33.3	11.3
	fast täglich	-	(0.8)	(1.4)	3.6	4.7	4.5	4.0	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	2.4	4.6	8.1	11.2	11.8	11.6	8.2	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	17.9	32.2	36.7	35.6	31.6	27.9	23.0	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.2	60.4	47.3	41.3	34.3	28.2	31.4	47.4
	N (gewichtet)	1'392	1'657	1'747	1'983	1'457	1'118	758	10'112
	N (ungewichtet)	1'472	1'203	1'648	1'957	1'516	1'326	779	9'901
2007	täglich	(1.4)	2.7	7.2	14.2	19.9	32.3	38.7	13.0
	fast täglich	-	(1.3)	2.1	3.8	6.0	6.1	5.5	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	(1.0)	6.2	9.6	9.4	12.3	12.8	7.8	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	17.5	37.8	40.2	38.2	33.8	24.8	22.2	32.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.1	52.0	40.8	34.4	27.9	24.0	25.8	43.3
	N (gewichtet)	1'368	1'325	1'734	1'503	1'243	820	520	8'513
	N (ungewichtet)	863	1'072	1'692	1'346	1'322	969	659	7'923
2002	täglich	(1.4)	5.5	11.2	15.5	25.6	35.3	39.9	15.3
	fast täglich	-	(1.4)	4.1	7.4	4.9	5.2	6.4	4.0
	3 oder 4mal diese Woche	(0.9)	7.5	9.9	12.9	9.1	8.4	6.6	8.2
	1 oder 2mal diese Woche	18.7	42.9	36.5	31.0	32.8	23.6	21.2	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	42.7	38.2	33.1	27.5	27.5	25.9	41.0
	N (gewichtet)	1'319	1'535	1'851	1'517	1'217	820	484	8'744
	N (ungewichtet)	802	1'283	1'948	1'359	1'294	985	610	8'281
1997	täglich	(1.4)	6.8	13.0	21.1	26.3	34.5	35.0	16.4
	fast täglich	-	(1.7)	4.3	5.1	7.9	6.9	(9.5)	4.4
	3 oder 4mal diese Woche	(2.9)	8.3	10.9	10.6	9.7	7.0	(7.8)	8.5
	1 oder 2mal diese Woche	22.4	43.0	38.6	33.5	33.4	23.1	20.9	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	72.8	40.2	33.1	29.7	22.7	28.5	26.9	37.6
	N (gewichtet)	886	1'213	1'219	1'070	783	564	331	6'066
	N (ungewichtet)	674	1'332	1'138	882	710	559	326	5'621

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	(1.3)	3.0	6.1	13.1	18.7	16.4	7.8
	fast täglich	-	(0.8)	(1.2)	2.1	3.0	2.7	(1.2)	1.6
	3 oder 4mal diese Woche	(1.9)	3.9	6.1	9.3	10.9	8.1	5.7	6.7
	1 oder 2mal diese Woche	22.2	31.0	33.5	39.0	34.3	26.5	19.4	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.2	63.0	56.2	43.4	38.7	44.0	57.4	53.5
	N (gewichtet)	1'341	1'581	1'731	1'968	1'475	1'233	1'216	10'544
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'829	2'231	1'664	1'441	1'032	10'949
2007	täglich	-	2.4	4.5	9.4	14.6	19.4	17.0	8.7
	fast täglich	-	(0.8)	(1.3)	2.4	2.9	3.0	(2.5)	1.8
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	3.8	7.4	7.9	8.6	6.4	3.3	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	20.8	36.8	38.3	38.9	-	28.1	18.8	32.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.7	56.2	48.5	41.4	40.9	43.0	58.3	51.8
	N (gewichtet)	1'298	1'372	1'736	1'515	1'336	939	841	9'038
	N (ungewichtet)	847	1'319	1'959	1'534	1'693	1'450	1'164	9'966
2002	täglich	-	2.9	7.0	11.3	17.0	15.5	18.4	9.7
	fast täglich	-	(1.6)	1.8	2.4	3.9	4.3	(2.8)	2.3
	3 oder 4mal diese Woche	(1.9)	5.3	7.3	8.7	8.1	5.7	3.6	6.0
	1 oder 2mal diese Woche	18.5	33.7	38.6	40.4	33.0	26.9	19.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	56.5	45.3	37.2	38.0	47.7	56.2	50.5
	N (gewichtet)	1'280	1'613	1'858	1'540	1'361	1'177	886	9'715
	N (ungewichtet)	796	1'601	2'081	1'669	1'808	1'443	1'053	10'451
1997	täglich	-	3.9	8.2	11.2	15.0	14.8	16.8	9.3
	fast täglich	-	(1.2)	2.4	3.7	3.9	3.5	(3.2)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	(2.9)	7.2	6.6	8.0	6.3	4.3	(2.6)	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	21.8	37.6	42.8	40.7	33.1	26.8	20.3	33.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.6	50.1	39.9	36.3	41.7	50.6	57.1	48.7
	N (gewichtet)	875	1'235	1'193	1'089	812	774	604	6'583
	N (ungewichtet)	718	1'498	1'334	1'053	943	902	667	7'115

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	7.4	14.1	17.8	9.5
	fast täglich	2.0	2.6	(1.9)	2.1
	3 oder 4mal diese Woche	7.1	8.8	6.1	7.5
	1 oder 2mal diese Woche	31.7	28.0	23.2	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	51.8	46.6	51.0	50.5
	N (gewichtet)	14'753	4'976	926	20'656
	N (ungewichtet)	13'820	5'498	1'532	20'850
2007	täglich	8.6	15.2	22.2	10.8
	fast täglich	2.3	3.1	(1.7)	2.4
	3 oder 4mal diese Woche	6.6	8.6	4.8	7.0
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.7	18.3	32.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.1	42.3	52.9	47.7
	N (gewichtet)	12'675	4'081	795	17'551
	N (ungewichtet)	11'021	5'412	1'456	17'889
2002	täglich	9.6	18.4	25.8	12.4
	fast täglich	3.1	3.3	1.9	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	7.2	7.5	3.4	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	33.6	27.7	16.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	46.6	43.0	52.9	46.0
	N (gewichtet)	13'304	4'321	833	18'458
	N (ungewichtet)	12'570	4'717	1'445	18'732
1997	täglich	9.1	21.3	24.1	12.7
	fast täglich	3.4	3.7	3.1	3.4
	3 oder 4mal diese Woche	7.0	7.6	4.9	7.1
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	29.2	18.3	33.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	44.7	38.2	49.6	43.4
	N (gewichtet)	9'007	3'033	609	12'649
	N (ungewichtet)	8'064	3'560	1'112	12'736

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	8.7	17.8	22.1	11.3
	fast täglich	2.3	3.6	(1.7)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	7.4	11.1	7.6	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	31.8	27.8	22.5	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.8	39.8	46.1	47.4
	N (gewichtet)	7'342	2'341	429	10'112
	N (ungewichtet)	6'655	2'543	703	9'901
2007	täglich	10.0	19.4	29.2	13.0
	fast täglich	2.9	4.1	-	3.1
	3 oder 4mal diese Woche	7.5	11.1	5.9	8.3
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.9	19.3	32.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	46.1	34.4	44.0	43.3
	N (gewichtet)	6'178	1'969	367	8'513
	N (ungewichtet)	4'941	2'372	610	7'923
2002	täglich	11.8	23.3	34.6	15.3
	fast täglich	4.0	4.4	(2.7)	4.0
	3 oder 4mal diese Woche	7.8	10.1	5.0	8.2
	1 oder 2mal diese Woche	32.9	29.2	17.2	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	43.5	32.9	40.4	41.0
	N (gewichtet)	6'412	1'960	372	8'744
	N (ungewichtet)	5'691	1'982	608	8'281
1997	täglich	11.7	27.3	35.3	16.4
	fast täglich	4.2	4.9	(3.7)	4.4
	3 oder 4mal diese Woche	8.3	9.5	(6.6)	8.5
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	27.7	19.2	33.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	40.0	30.7	35.3	37.6
	N (gewichtet)	4'381	1'414	271	6'066
	N (ungewichtet)	3'640	1'521	460	5'621

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Wein		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	6.2	10.8	14.1	7.8
	fast täglich	1.6	1.7	(2.1)	1.6
	3 oder 4mal diese Woche	6.8	6.7	4.8	6.7
	1 oder 2mal diese Woche	31.6	28.1	23.9	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	53.7	52.7	55.1	53.5
	N (gewichtet)	7'411	2'635	497	10'544
	N (ungewichtet)	7'165	2'955	829	10'949
2007	täglich	7.3	11.4	16.2	8.7
	fast täglich	1.7	2.2	(1.9)	1.8
	3 oder 4mal diese Woche	5.7	6.2	3.9	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	33.5	30.4	17.5	32.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	51.8	49.8	60.5	51.8
	N (gewichtet)	6'497	2'113	428	9'038
	N (ungewichtet)	6'080	3'040	846	9'966
2002	täglich	7.5	14.4	18.6	9.7
	fast täglich	2.4	2.3	(1.2)	2.3
	3 oder 4mal diese Woche	6.5	5.4	(2.0)	6.0
	1 oder 2mal diese Woche	34.2	26.5	15.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.4	51.4	63.1	50.5
	N (gewichtet)	6'893	2'362	460	9'715
	N (ungewichtet)	6'879	2'735	837	10'451
1997	täglich	6.6	16.0	15.2	9.3
	fast täglich	2.5	2.7	(2.6)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	5.9	5.9	(3.6)	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	35.8	30.6	17.5	33.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	49.3	44.7	61.1	48.7
	N (gewichtet)	4'625	1'619	338	6'583
	N (ungewichtet)	4'424	2'039	652	7'115

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.7)	-	(0.6)	0.9	1.0	1.4	2.3	0.9
	fast täglich	-	-	-	-	(0.6)	-	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	1.9	1.0	0.5	0.7	1.1	1.4	1.3	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	23.8	13.9	10.9	10.1	10.1	10.1	6.9	12.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.5	84.7	87.9	88.1	87.2	86.8	89.0	85.4
	N (gewichtet)	2'732	3'237	3'477	3'952	2'932	2'353	1'975	20'658
	N (ungewichtet)	2'897	2'529	3'476	4'191	3'180	2'769	1'811	20'853
2007	täglich	-	(0.5)	(0.5)	(0.5)	0.9	1.3	2.4	0.8
	fast täglich	-	-	-	-	(0.5)	(0.7)	(0.8)	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	(0.7)	(0.6)	1.0	1.0	1.7	1.4	(1.5)	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	25.3	17.6	12.6	13.6	13.3	12.6	9.4	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.1	81.0	85.8	84.5	83.6	84.0	85.8	82.4
	N (gewichtet)	2'669	2'693	3'472	3'016	2'578	1'758	1'362	17'547
	N (ungewichtet)	1'713	2'387	3'655	2'878	3'012	2'416	1'825	17'886
2002	täglich	(0.7)	(0.6)	0.9	(1.1)	1.1	1.7	2.9	1.1
	fast täglich	-	-	(0.2)	-	(0.7)	(0.3)	-	0.3
	3 oder 4mal diese Woche	2.4	(1.1)	1.0	0.8	1.3	1.8	(1.3)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	22.5	15.5	14.4	14.9	14.8	12.9	9.6	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	74.2	82.6	83.5	83.0	82.1	83.2	86.0	81.9
	N (gewichtet)	2'596	3'155	3'722	3'070	2'588	2'002	1'386	18'519
	N (ungewichtet)	1'599	2'884	4'033	3'033	3'109	2'434	1'677	18'769
1997	täglich	-	(0.8)	(0.8)	(1.2)	(1.8)	(1.5)	(2.5)	1.1
	fast täglich	-	-	-	(0.6)	(0.7)	-	(1.1)	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	(0.7)	1.5	(1.2)	(1.2)	(1.7)	(0.8)	(1.9)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	15.6	16.6	13.8	15.3	14.0	11.2	8.8	14.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	83.2	80.8	83.9	81.7	81.8	85.6	85.6	82.9
	N (gewichtet)	1'763	2'446	2'408	2'161	1'597	1'339	937	12'650
	N (ungewichtet)	1'393	2'826	2'468	1'936	1'655	1'463	994	12'735

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.

Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(1.1)	-	(1.0)	(1.5)	(1.7)	2.5	(4.4)	1.5
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	2.4	(1.6)	(0.7)	(0.9)	(1.8)	2.4	(2.2)	1.6
	1 oder 2mal diese Woche	26.0	17.9	15.1	13.5	14.1	14.5	11.8	16.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	70.2	80.0	82.9	83.7	81.6	80.4	80.6	80.2
	N (gewichtet)	1'391	1'656	1'745	1'984	1'457	1'118	757	10'109
	N (ungewichtet)	1'472	1'203	1'646	1'958	1'516	1'325	777	9'897
2007	täglich	-	-	(0.9)	(1.0)	(1.7)	(2.6)	4.7	1.4
	fast täglich	-	-	-	-	(1.0)	(1.3)	-	0.7
	3 oder 4mal diese Woche	(1.1)	-	(1.6)	(1.5)	2.7	(2.5)	(2.4)	1.7
	1 oder 2mal diese Woche	28.0	23.0	16.6	18.8	18.9	18.5	14.0	20.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	69.8	74.9	80.6	78.0	75.7	75.1	77.4	76.1
	N (gewichtet)	1'369	1'323	1'737	1'502	1'242	820	521	8'513
	N (ungewichtet)	864	1'070	1'696	1'344	1'321	969	660	7'924
2002	täglich	-	(0.8)	(1.6)	(1.8)	(1.6)	3.4	5.8	1.8
	fast täglich	-	-	(0.4)	-	(0.9)	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	(3.6)	(1.7)	1.7	(1.1)	(1.6)	4.0	(2.4)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	26.6	20.3	18.7	19.5	19.8	19.5	14.1	20.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	68.6	76.8	77.6	77.2	76.2	72.4	77.1	75.3
	N (gewichtet)	1'317	1'535	1'862	1'527	1'227	823	492	8'782
	N (ungewichtet)	801	1'279	1'953	1'363	1'299	988	618	8'301
1997	täglich	-	(1.3)	(1.4)	(2.2)	(3.2)	(3.0)	(3.6)	1.9
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	0.9
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	2.7	(2.0)	(1.9)	(2.5)	(1.6)	(3.5)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	20.4	24.0	17.9	21.1	18.4	16.7	13.9	19.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	77.6	71.5	78.2	73.7	74.6	76.8	76.6	75.3
	N (gewichtet)	886	1'212	1'216	1'071	783	564	329	6'062
	N (ungewichtet)	674	1'330	1'136	883	711	560	324	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	-	-	-	-	-	-	(1.0) 0.3
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	-	-	(0.5)	-	(0.5)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	21.5	9.7	6.6	6.7	6.3	6.1	3.9	8.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.9	89.8	92.8	92.4	92.8	92.6	94.1	90.4
	N (gewichtet)	1'341	1'581	1'732	1'968	1'475	1'235	1'218	10'549
	N (ungewichtet)	1'425	1'326	1'830	2'233	1'664	1'444	1'034	10'956
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	(1.1) 0.3
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.7)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	22.5	12.3	8.5	8.4	8.0	7.4	6.6	10.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.6	86.9	90.9	91.0	90.9	91.8	91.0	88.4
	N (gewichtet)	1'300	1'370	1'735	1'514	1'335	938	841	9'034
	N (ungewichtet)	849	1'317	1'959	1'534	1'691	1'447	1'165	9'962
2002	täglich	-	-	-	-	(0.6)	(0.5)	(1.3)	0.5
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	-	-	(0.6)	(1.0)	-	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	18.2	10.9	10.0	10.4	10.3	8.2	7.1	10.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.1	88.1	89.4	88.7	87.5	90.8	90.8	87.9
	N (gewichtet)	1'279	1'620	1'860	1'543	1'361	1'179	894	9'737
	N (ungewichtet)	798	1'605	2'080	1'670	1'810	1'446	1'059	10'468
1997	täglich	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.8)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	10.7	9.4	9.6	9.6	9.7	7.2	6.0	9.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.0	90.0	89.8	89.5	88.8	92.0	90.5	89.9
	N (gewichtet)	877	1'233	1'192	1'089	814	775	608	6'588
	N (ungewichtet)	719	1'496	1'332	1'053	944	903	670	7'117

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Spirituosen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	0.9	0.9	(1.3)	0.9
	fast täglich	0.3	(0.2)	-	0.2
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	1.0	(1.6)	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	12.8	11.5	10.0	12.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	85.0	86.5	86.8	85.4
	<i>N (gewichtet)</i>	14'753	4'978	927	20'658
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'820	5'498	1'535	20'853
2007	täglich	0.8	0.7	(1.7)	0.8
	fast täglich	0.4	(0.4)	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	1.1	(0.8)	1.1
	1 oder 2mal diese Woche	16.4	13.2	9.5	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	81.4	84.6	87.6	82.4
	<i>N (gewichtet)</i>	12'669	4'084	794	17'547
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'014	5'418	1'454	17'886
2002	täglich	0.9	1.3	2.6	1.1
	fast täglich	0.3	-	-	0.3
	3 oder 4mal diese Woche	1.4	1.1	(1.4)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	16.1	14.0	9.3	15.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	81.2	83.5	86.2	81.9
	<i>N (gewichtet)</i>	13'349	4'336	834	18'519
	<i>N (ungewichtet)</i>	12'597	4'725	1'447	18'769
1997	täglich	1.0	1.2	(2.3)	1.1
	fast täglich	0.5	(0.5)	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	1.1	1.5	(2.6)	1.3
	1 oder 2mal diese Woche	14.5	14.2	10.6	14.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	82.9	82.6	84.3	82.9
	<i>N (gewichtet)</i>	9'005	3'033	611	12'650
	<i>N (ungewichtet)</i>	8'059	3'561	1'115	12'735

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Spirituosen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	1.5	1.5	(2.5)	1.5
	fast täglich	(0.4)	-	-	0.4
	3 oder 4mal diese Woche	1.6	1.5	(2.8)	1.6
	1 oder 2mal diese Woche	16.3	16.8	13.4	16.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.2	80.0	80.8	80.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'339	2'340	430	10'109
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'652	2'540	705	9'897
2007	täglich	1.3	1.2	(3.7)	1.4
	fast täglich	0.7	-	-	0.7
	3 oder 4mal diese Woche	1.6	2.0	-	1.7
	1 oder 2mal diese Woche	21.1	18.6	14.1	20.2
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.4	77.6	80.0	76.1
	<i>N (gewichtet)</i>	6'176	1'971	366	8'513
	<i>N (ungewichtet)</i>	4'940	2'376	608	7'924
2002	täglich	1.5	2.3	(4.4)	1.8
	fast täglich	0.6	-	-	0.5
	3 oder 4mal diese Woche	2.2	1.6	(2.3)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	20.6	20.4	14.3	20.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.1	75.5	77.8	75.3
	<i>N (gewichtet)</i>	6'444	1'966	373	8'782
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'708	1'984	609	8'301
1997	täglich	1.7	2.2	(4.3)	1.9
	fast täglich	0.9	(1.0)	-	0.9
	3 oder 4mal diese Woche	1.9	2.5	(4.2)	2.1
	1 oder 2mal diese Woche	19.9	19.9	16.8	19.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.7	74.3	74.4	75.3
	<i>N (gewichtet)</i>	4'379	1'411	272	6'062
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012*

Alkohol: Spirituosen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	0.3	-	-	0.3
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	0.6	(0.6)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	9.3	6.8	7.1	8.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.7	92.2	92.0	90.4
	N (gewichtet)	7'413	2'638	498	10'549
	N (ungewichtet)	7'168	2'958	830	10'956
2007	täglich	(0.4)	(0.2)	-	0.3
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	0.6	(0.2)	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	11.9	8.1	5.6	10.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	87.1	91.2	94.0	88.4
	N (gewichtet)	6'493	2'113	428	9'034
	N (ungewichtet)	6'074	3'042	846	9'962
2002	täglich	0.4	(0.5)	(1.2)	0.5
	fast täglich	(0.1)	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	0.7	(0.6)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	12.0	8.7	5.2	10.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	86.8	90.1	92.9	87.9
	N (gewichtet)	6'905	2'370	461	9'737
	N (ungewichtet)	6'889	2'741	838	10'468
1997	täglich	(0.5)	-	-	(0.4)
	fast täglich	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(0.3)	(0.6)	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	9.3	9.2	5.7	9.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.7	89.8	92.2	89.9
	N (gewichtet)	4'626	1'622	340	6'588
	N (ungewichtet)	4'422	2'041	654	7'117

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	(0.4)	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	7.1	1.3	(0.7)	(0.4)	-	-	-	1.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.3	98.5	99.2	99.5	99.8	99.8	100.0	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	2'733	3'238	3'479	3'952	2'932	2'353	1'974	20'662
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'897	2'530	3'478	4'191	3'181	2'771	1'811	20'859
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	8.8	(1.1)	(1.0)	(0.4)	-	-	-	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	90.4	98.9	98.9	99.6	99.8	99.9	100.0	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	2'663	2'695	3'476	3'020	2'580	1'758	1'363	17'555
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'709	2'390	3'659	2'882	3'015	2'417	1'827	17'899

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	7.1	-	-	-	-	-	-	1.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.1	99.5	99.5	99.5	99.8	99.5	100.0	98.6
	<i>N (gewichtet)</i>	1'392	1'657	1'747	1'984	1'457	1'118	756	10'112
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'472	1'204	1'648	1'958	1'516	1'327	777	9'902
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	8.1	(1.2)	(1.3)	-	-	-	-	1.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	90.9	98.7	98.6	99.5	99.8	99.8	100.0	97.9
	<i>N (gewichtet)</i>	1'364	1'324	1'739	1'502	1'242	820	521	8'511
	<i>N (ungewichtet)</i>	862	1'072	1'698	1'346	1'321	969	660	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	7.1	(2.2)	(1.0)	(0.5)	-	-	-	1.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.5	97.6	99.0	99.5	99.8	99.9	100.0	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	1'341	1'581	1'732	1'968	1'475	1'235	1'218	10'550
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'425	1'326	1'830	2'233	1'665	1'444	1'034	10'957
2007	täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	9.5	(0.9)	(0.8)	-	-	-	-	1.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.9	99.0	99.2	99.7	99.9	99.9	100.0	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	1'299	1'371	1'737	1'518	1'338	938	842	9'044
	<i>N (ungewichtet)</i>	847	1'318	1'961	1'536	1'694	1'448	1'167	9'971

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Deutsch	Sprachregion	Gesamt	
		%	Französisch	Italienisch	%
2012	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	(0.1)	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	1.4	1.7	(0.7)	1.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.5	98.2	99.2	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	14'756	4'978	927	20'662
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'826	5'499	1'534	20'859
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	1.8	2.0	(0.8)	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.1	97.7	99.2	98.0
	<i>N (gewichtet)</i>	12'674	4'085	795	17'555
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'023	5'419	1'457	17'899

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	1.2	1.7	-	1.3
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.7	98.1	99.2	98.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'342	2'340	429	10'112
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'657	2'541	704	9'902
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	2.0	1.6	-	1.9
	keinmal (letzte 7 Tage)	97.9	97.9	98.4	97.9
	<i>N (gewichtet)</i>	6'172	1'972	367	8'511
	<i>N (ungewichtet)</i>	4'941	2'377	610	7'928

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012*

Alkohol: Alcopops		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	1.5	1.7	-	1.5
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.4	98.2	99.2	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'414	2'638	498	10'550
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'169	2'958	830	10'957
2007	täglich	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	1.7	2.3	-	1.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	98.3	97.5	99.9	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'502	2'113	428	9'044
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'082	3'042	847	9'971

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?' Falls ja: 'Wie häufig?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	hohes Risiko	2.6	(0.9)	1.2	1.3	1.6	1.3	(0.8)	1.4
	mittleres Risiko	3.3	3.4	2.1	2.8	3.6	4.5	4.1	3.3
	geringes Risiko	75.5	77.5	81.0	82.1	79.4	77.9	72.2	78.5
	abstinent	18.6	18.3	15.7	13.9	15.4	16.3	22.9	16.9
	<i>N (gewichtet)</i>	2'812	3'372	3'615	4'115	3'048	2'418	2'138	21'519
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'980	2'615	3'587	4'316	3'254	2'835	1'946	21'533
2007	hohes Risiko	2.4	1.2	1.4	1.0	1.8	1.6	(0.7)	1.5
	mittleres Risiko	2.7	2.7	2.4	3.5	4.3	5.0	4.2	3.3
	geringes Risiko	74.1	78.9	80.9	80.9	79.3	77.2	70.7	78.1
	abstinent	20.8	17.2	15.3	14.6	14.7	16.2	24.5	17.1
	<i>N (gewichtet)</i>	2'856	2'868	3'687	3'218	2'708	1'850	1'527	18'713
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'806	2'500	3'803	3'002	3'110	2'493	1'998	18'712
2002	hohes Risiko	(1.5)	1.3	1.7	2.1	2.8	1.9	1.9	1.9
	mittleres Risiko	1.7	2.4	3.3	4.0	5.7	5.3	2.9	3.5
	geringes Risiko	70.2	73.6	75.2	75.2	72.7	66.9	63.3	72.1
	abstinent	26.6	22.8	19.8	18.7	18.9	25.9	31.8	22.6
	<i>N (gewichtet)</i>	2'755	3'356	3'927	3'242	2'725	2'101	1'551	19'657
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'692	3'016	4'196	3'169	3'236	2'532	1'819	19'660
1997	hohes Risiko	(1.5)	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	(1.5)	2.0
	mittleres Risiko	(1.5)	3.3	4.2	5.1	4.4	3.2	4.3	3.7
	geringes Risiko	71.2	78.8	79.3	79.2	76.4	69.9	64.7	75.5
	abstinent	25.9	16.0	14.6	13.7	16.8	24.4	29.5	18.7
	<i>N (gewichtet)</i>	1'782	2'502	2'462	2'197	1'635	1'390	1'015	12'984
	<i>N (ungewichtet)</i>	1'410	2'867	2'507	1'957	1'680	1'509	1'057	12'987

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization). Die zur jeweiligen Konsumklassen gehörende tägliche Alkohol-Durchschnittsmenge ist in den Tabellen zu den Männern resp. zu den Frauen angegeben.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	3.7	(1.2)	2.0	2.1	2.1	1.8	(1.8)	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	3.5	3.9	2.6	2.5	3.7	4.0	(2.6)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	76.0	82.6	85.6	86.1	83.6	83.4	82.7	83.2
	abstinent	16.8	12.3	9.8	9.3	10.6	10.8	12.9	11.5
	N (gewichtet)	1'429	1'712	1'809	2'081	1'529	1'152	831	10'542
	N (ungewichtet)	1'509	1'239	1'698	2'031	1'563	1'365	848	10'253
2007	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(3.0)	(1.7)	1.9	1.5	2.9	2.7	-	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(2.7)	2.4	2.4	3.1	4.5	5.0	(3.3)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	76.4	85.1	86.9	85.3	82.2	83.4	85.3	83.5
	abstinent	17.8	10.8	8.8	10.1	10.3	8.9	10.5	11.1
	N (gewichtet)	1'469	1'415	1'840	1'610	1'342	859	598	9'133
	N (ungewichtet)	919	1'126	1'772	1'417	1'397	1'008	758	8'397
2002	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(2.3)	(1.8)	2.5	3.0	3.9	3.3	(3.9)	2.8
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(1.7)	2.9	4.3	4.7	5.9	6.3	(2.9)	4.1
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	73.8	82.8	81.4	78.6	78.2	76.2	79.1	79.0
	abstinent	22.2	12.5	11.8	13.6	12.0	14.2	14.1	14.2
	N (gewichtet)	1'402	1'661	1'983	1'635	1'344	896	587	9'508
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'448	1'404	1'060	707	8'889
1997	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	(2.4)	3.2	3.5	3.3	4.0	4.3	(2.4)	3.3
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	(1.5)	3.9	4.5	6.1	4.1	(3.8)	(3.4)	4.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	74.1	83.9	82.8	83.2	83.0	79.8	80.4	81.4
	abstinent	22.1	9.0	9.2	7.4	8.8	12.2	13.8	11.2
	N (gewichtet)	898	1'241	1'241	1'090	809	595	367	6'241
	N (ungewichtet)	684	1'349	1'153	894	729	586	354	5'749

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	(1.4)	-	-	(0.4)	(1.0)	(0.7)	-	0.6
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	3.0	2.8	1.6	3.1	3.5	5.0	5.1	3.3
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	75.0	72.3	76.4	77.9	75.1	73.0	65.4	74.0
	abstinent	20.6	24.4	21.7	18.6	20.3	21.3	29.3	22.0
	N (gewichtet)	1'383	1'660	1'807	2'034	1'519	1'267	1'307	10'977
	N (ungewichtet)	1'471	1'376	1'889	2'285	1'691	1'470	1'098	11'280
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	(1.7)	(0.8)	(0.9)	(0.6)	(0.6)	(0.7)	-	0.9
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(2.6)	2.9	2.3	3.9	4.1	4.9	4.8	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	71.7	72.9	74.9	76.5	76.4	71.8	61.3	73.0
	abstinent	24.0	23.4	21.9	19.0	18.9	22.5	33.4	22.7
	N (gewichtet)	1'387	1'453	1'846	1'608	1'366	991	928	9'580
	N (ungewichtet)	887	1'374	2'031	1'585	1'713	1'485	1'240	10'315
2002	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	-	(0.8)	(0.8)	(1.2)	(1.7)	(0.9)	(0.8)	1.0
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(1.6)	1.8	2.2	3.2	5.4	4.5	2.9	3.0
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	66.6	64.6	68.9	71.7	67.3	60.1	53.7	65.6
	abstinent	31.2	32.8	28.0	23.9	25.6	34.6	42.6	30.4
	N (gewichtet)	1'352	1'695	1'945	1'607	1'381	1'205	965	10'149
	N (ungewichtet)	840	1'655	2'139	1'721	1'832	1'472	1'112	10'771
1997	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	-	(0.7)	-	-	-	(1.2)	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	(1.5)	2.7	4.0	4.2	4.6	2.8	4.8	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	68.2	73.7	75.7	75.2	69.8	62.6	55.9	70.1
	abstinent	29.8	22.9	20.0	19.8	24.5	33.5	38.3	25.7
	N (gewichtet)	884	1'261	1'221	1'107	826	795	648	6'743
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	923	703	7'238

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	hohes Risiko	1.2	1.9	(1.5)	1.4
	mittleres Risiko	2.7	4.7	5.0	3.3
	geringes Risiko	80.8	73.2	70.3	78.5
	abstinent	15.4	20.2	23.2	16.9
	<i>N (gewichtet)</i>	15'352	5'202	965	21'519
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'256	5'687	1'590	21'533
2007	hohes Risiko	1.3	2.0	1.7	1.5
	mittleres Risiko	2.8	4.5	5.5	3.3
	geringes Risiko	80.7	74.1	58.6	78.1
	abstinent	15.2	19.4	34.2	17.1
	<i>N (gewichtet)</i>	13'464	4'399	851	18'713
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'465	5'709	1'538	18'712
2002	hohes Risiko	1.5	2.7	3.1	1.9
	mittleres Risiko	3.2	4.1	6.0	3.5
	geringes Risiko	75.2	65.8	54.1	72.1
	abstinent	20.1	27.4	36.8	22.6
	<i>N (gewichtet)</i>	14'189	4'563	905	19'657
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'186	4'927	1'547	19'660
1997	hohes Risiko	1.7	2.7	3.6	2.0
	mittleres Risiko	3.1	5.2	6.2	3.7
	geringes Risiko	77.5	73.0	59.1	75.5
	abstinent	17.8	19.2	31.0	18.7
	<i>N (gewichtet)</i>	9'283	3'082	619	12'984
	<i>N (ungewichtet)</i>	8'254	3'608	1'125	12'987

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypt*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypt*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops';

'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.';

'Apfelwein'.

Anmerkungen:

Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization). Die zur jeweiligen Konsumklassen gehörende tägliche Alkohol-Durchschnittsmenge ist in den Tabellen zu den Männern resp. zu den Frauen angegeben.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	1.8	3.2	(2.6)	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	2.8	4.4	(2.6)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	84.6	79.2	80.4	83.2
	abstinent	10.8	13.3	14.4	11.5
	<i>N (gewichtet)</i>	7'633	2'460	449	10'542
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'872	2'646	735	10'253
2007	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	1.7	3.3	(3.5)	2.1
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	2.8	4.1	(4.6)	3.2
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	85.5	79.9	70.4	83.5
	abstinent	10.0	12.7	21.5	11.1
	<i>N (gewichtet)</i>	6'581	2'152	400	9'133
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'188	2'549	660	8'397
2002	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	2.2	4.4	4.2	2.8
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	3.6	5.0	7.3	4.1
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	81.5	73.2	66.7	79.0
	abstinent	12.7	17.4	21.8	14.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'972	2'114	422	9'508
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'093	2'118	678	8'889
1997	hohes Risiko (>60 g/ Tag)	2.7	4.6	7.2	3.3
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	3.4	5.7	(5.8)	4.0
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	83.1	78.5	70.1	81.4
	abstinent	10.9	11.3	16.9	11.2
	<i>N (gewichtet)</i>	4'525	1'441	274	6'241
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'736	1'549	464	5'749

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyper*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyper*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

***Getränketypen:**

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops';

'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.';

'Apfelwein'.

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion

Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.6	(0.8)	-	0.6
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.5	5.0	7.1	3.3
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	77.0	67.8	61.5	74.0
	abstinent	19.9	26.4	30.8	22.0
	N (gewichtet)	7'719	2'741	516	10'977
	N (ungewichtet)	7'384	3'041	855	11'280
2007	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.9	0.8	-	0.9
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	4.9	6.2	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	76.0	68.5	48.2	73.0
	abstinent	20.2	25.8	45.4	22.7
	N (gewichtet)	6'882	2'247	451	9'580
	N (ungewichtet)	6'277	3'160	878	10'315
2002	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.8	1.3	(2.2)	1.0
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	3.3	4.8	3.0
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	69.2	59.4	43.2	65.6
	abstinent	27.2	36.0	49.8	30.4
	N (gewichtet)	7'217	2'449	483	10'149
	N (ungewichtet)	7'093	2'809	869	10'771
1997	hohes Risiko (>40 g/ Tag)	0.7	(1.0)	-	0.8
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	2.8	4.7	6.6	3.5
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	72.2	68.1	50.4	70.1
	abstinent	24.3	26.2	42.3	25.7
	N (gewichtet)	4'758	1'641	344	6'743
	N (ungewichtet)	4'518	2'059	661	7'238

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypt*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypt*) getrunken?'; 'Wie häufig?'

'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops';

'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.';

'Apfelwein'.

Anmerkungen:

Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.


Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränktyp, Vergleich 1997-2012**



Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränktyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

***Getränktypen:**

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.
2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.


1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.. Alcopops wurden erst ab 2007 erfasst.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränktypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränktypen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet.

*Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
bei 15-24-Jährigen, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012*



Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.. Alcopops wurden erst ab 2007 erfasst.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet.

**Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 Liter Alk.	25-34 Liter Alk.	35-44 Liter Alk.	45-54 Liter Alk.	55-64 Liter Alk.	65-74 Liter Alk.	75+ Liter Alk.	
2012	Bier	2.5	2.0	1.8	1.7	1.5	1.2	0.7	1.7
	Wein	0.6	1.1	1.5	2.0	2.7	3.1	2.5	1.9
	Spirituosen	1.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	Alcopops	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	4.8	3.6	3.7	4.1	4.6	4.7	3.7	4.1
	N (gewichtet)	2'736	3'238	3'479	3'952	2'932	2'353	1'976	20'666
	N (ungewichtet)	2'901	2'530	3'478	4'191	3'181	2'771	1'813	20'865
2007	Bier	2.3	2.0	1.5	1.4	1.6	1.2	0.6	1.6
	Wein	0.5	1.2	1.8	2.3	2.8	3.3	2.6	2.0
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	Spirituosen	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	Alcopops	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	4.4	4.0	3.9	4.3	5.0	5.2	3.9	4.3
	N (gewichtet)	2'669	2'692	3'472	3'019	2'581	1'759	1'359	17'551
2002	Bier	2.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.1	0.8	1.6
	Wein	0.8	1.6	2.3	2.9	3.4	3.2	2.9	2.4
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Spirituosen	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	Total	3.8	3.9	4.7	5.4	5.7	5.1	4.4	4.7
	N (gewichtet)	2'571	3'165	3'736	3'089	2'599	2'000	1'382	18'542
	N (ungewichtet)	1'587	2'892	4'044	3'049	3'118	2'431	1'672	18'793
1997	Bier	1.9	2.1	2.1	2.1	1.6	1.2	0.8	1.8
	Wein	1.0	1.9	2.5	3.0	3.2	3.0	2.6	2.4
	Apfelwein	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
	Spirituosen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Total	3.6	4.6	5.2	5.8	5.6	4.9	4.3	4.9
	N (gewichtet)	1'751	2'443	2'409	2'150	1'590	1'337	928	12'608
	N (ungewichtet)	1'384	2'824	2'470	1'925	1'647	1'461	984	12'695

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

***Getränketypen:**

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.
2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

**Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 Liter Alk.	25-34 Liter Alk.	35-44 Liter Alk.	45-54 Liter Alk.	55-64 Liter Alk.	65-74 Liter Alk.	75+ Liter Alk.	
2012	Bier	3.9	3.1	3.0	2.8	2.5	2.1	1.5	2.8
	Wein	0.7	1.3	1.8	2.4	3.3	4.0	3.8	2.3
	Spirituosen	1.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
	Alcopops	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	6.7	5.1	5.4	5.7	6.4	6.7	6.1	5.9
	N (gewichtet)	1'394	1'657	1'747	1'984	1'457	1'118	758	10'116
	N (ungewichtet)	1'475	1'204	1'648	1'958	1'516	1'327	779	9'907
2007	Bier	3.5	3.3	2.6	2.5	3.0	2.3	1.4	2.8
	Wein	0.6	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	4.1	2.5
	Apfelwein	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
	Spirituosen	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
	Alcopops	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	6.1	5.7	5.5	6.0	7.5	7.8	6.6	6.3
	N (gewichtet)	1'368	1'326	1'739	1'501	1'243	819	519	8'516
2002	Bier	3.1	2.9	3.2	3.2	2.7	2.2	1.8	2.9
	Wein	0.9	2.0	2.9	3.7	4.5	4.8	4.7	3.1
	Apfelwein	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2
	Spirituosen	1.3	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0	0.9	0.8
	Total	5.4	5.9	7.0	7.9	8.1	8.4	7.9	7.1
	N (gewichtet)	1'311	1'544	1'871	1'537	1'233	826	493	8'816
	N (ungewichtet)	799	1'289	1'960	1'372	1'304	994	621	8'339
1997	Bier	3.1	3.7	3.6	3.8	2.9	2.3	1.7	3.3
	Wein	1.2	2.3	3.1	3.8	4.3	4.6	4.2	3.2
	Apfelwein	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3
	Spirituosen	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
	Total	5.2	7.0	7.6	8.8	8.5	8.3	7.4	7.5
	N (gewichtet)	883	1'213	1'219	1'071	783	564	329	6'062
	N (ungewichtet)	671	1'332	1'139	880	711	560	322	5'615

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken? 'Wie häufig?'' Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.
2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

**Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2012	Bier	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.6
	Wein	0.6	0.9	1.1	1.6	2.1	2.3	1.7	1.4
	Spirituosen	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	Alcopops	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	2.8	2.1	1.9	2.4	2.8	2.9	2.1	2.4
	N (gewichtet)	1'341	1'581	1'732	1'968	1'475	1'235	1'218	10'551
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'830	2'233	1'665	1'444	1'034	10'958
2007	Bier	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	Wein	0.5	1.0	1.5	1.9	2.1	2.3	1.7	1.5
	Apfelwein	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	Spirituosen	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Alcopops	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	Total	2.6	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.2	2.5
	N (gewichtet)	1'300	1'366	1'733	1'518	1'338	939	840	9'034
2002	Bier	0.8	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.2	0.5
	Wein	0.6	1.2	1.7	2.1	2.4	2.2	1.9	1.7
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Spirituosen	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	Total	2.1	2.0	2.4	2.9	3.6	2.8	2.5	2.6
	N (gewichtet)	1'260	1'621	1'865	1'552	1'365	1'174	889	9'726
	N (ungewichtet)	788	1'603	2'084	1'677	1'814	1'437	1'051	10'454
1997	Bier	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5
	Wein	0.8	1.4	1.9	2.1	2.2	1.9	1.8	1.7
	Apfelwein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	Spirituosen	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
	Total	1.9	2.3	2.8	2.9	2.8	2.5	2.6	2.5
	N (gewichtet)	868	1'230	1'190	1'079	807	774	599	6'546
	N (ungewichtet)	713	1'492	1'331	1'045	936	901	662	7'080

Fragen:

'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.
 2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'sel tener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

**Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012**

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2012	Bier	1.7	1.7	1.4	1.7
	Wein	1.6	2.5	2.6	1.9
	Spirituosen	0.5	0.5	0.5	0.5
	Alcopops	0.1	0.1	0.1	0.1
	Total	3.9	4.7	4.5	4.1
	N (gewichtet)	14'758	4'981	927	20'667
	N (ungewichtet)	13'827	5'503	1'535	20'865
2007	Bier	1.6	1.7	1.3	1.6
	Wein	1.7	2.6	2.9	2.0
	Apfelwein	0.2	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.5	0.5	0.4	0.5
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	4.1	5.0	4.6	4.3
	N (gewichtet)	12'675	4'081	795	17'551
2002	N (ungewichtet)	11'020	5'414	1'456	17'890
	Bier	1.6	1.7	1.9	1.6
	Wein	2.1	3.1	3.5	2.4
	Apfelwein	0.2	0.1	0.1	0.2
	Spirituosen	0.6	0.5	0.7	0.6
	Total	4.4	5.4	6.2	4.7
	N (gewichtet)	13'364	4'345	833	18'542
1997	N (ungewichtet)	12'623	4'727	1'443	18'793
	Bier	1.8	1.9	1.6	1.8
	Wein	2.0	3.4	3.6	2.4
	Apfelwein	0.3	0.1	0.0	0.2
	Spirituosen	0.5	0.5	0.5	0.5
	Total	4.6	5.8	5.8	4.9
	N (gewichtet)	8'977	3'022	609	12'608
	N (ungewichtet)	8'037	3'547	1'111	12'695

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012*

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2012	Bier	2.8	2.9	2.3	2.8
	Wein	1.9	3.3	3.3	2.3
	Spirituosen	0.7	0.8	0.7	0.7
	Alcopops	0.1	0.1	0.2	0.1
	Total	5.6	7.0	6.5	5.9
	N (gewichtet)	7'344	2'342	430	10'116
	N (ungewichtet)	6'658	2'544	705	9'907
2007	Bier	2.7	3.0	2.3	2.8
	Wein	2.1	3.4	4.1	2.5
	Apfelwein	0.3	0.1	0.0	0.2
	Spirituosen	0.8	0.8	0.7	0.8
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	5.9	7.4	7.1	6.3
	N (gewichtet)	6'178	1'972	366	8'516
2002	N (ungewichtet)	4'942	2'377	609	7'928
	Bier	2.8	3.2	3.3	2.9
	Wein	2.6	4.4	5.1	3.1
	Apfelwein	0.3	0.1	0.1	0.2
	Spirituosen	0.8	0.8	0.9	0.8
	Total	6.5	8.5	9.3	7.1
	N (gewichtet)	6'464	1'979	373	8'816
1997	N (ungewichtet)	5'735	1'994	610	8'339
	Bier	3.2	3.5	3.1	3.3
	Wein	2.5	4.6	5.7	3.2
	Apfelwein	0.4	0.1	0.0	0.3
	Spirituosen	0.8	0.8	1.0	0.8
	Total	6.9	9.0	9.8	7.5
	N (gewichtet)	4'382	1'410	270	6'062
	N (ungewichtet)	3'639	1'517	459	5'615

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketypr, Vergleich 1997-2012*

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch Liter Alkohol	Französisch Liter Alkohol	Italienisch Liter Alkohol	
2012	Bier	0.6	0.6	0.6	0.6
	Wein	1.3	1.7	1.9	1.4
	Spirituosen	0.3	0.2	0.2	0.3
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	2.3	2.7	2.9	2.4
	N (gewichtet)	7'414	2'639	498	10'551
	N (ungewichtet)	7'169	2'959	830	10'958
2007	Bier	0.5	0.6	0.4	0.5
	Wein	1.4	1.8	1.8	1.5
	Apfelwein	0.1	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.3	0.2	0.2	0.3
	Alcopops	0.1	0.1	0.0	0.1
	Total	2.4	2.7	2.4	2.5
	N (gewichtet)	6'497	2'109	428	9'034
2002	N (ungewichtet)	6'078	3'037	847	9'962
	Bier	0.5	0.5	0.7	0.5
	Wein	1.6	2.0	2.3	1.7
	Apfelwein	0.1	0.0	0.2	0.1
	Spirituosen	0.4	0.3	0.5	0.3
	Total	2.5	2.8	3.7	2.6
	N (gewichtet)	6'900	2'366	460	9'726
1997	N (ungewichtet)	6'888	2'733	833	10'454
	Bier	0.5	0.5	0.5	0.5
	Wein	1.5	2.2	1.8	1.7
	Apfelwein	0.1	0.0	0.0	0.1
	Spirituosen	0.3	0.3	0.2	0.3
	Total	2.4	3.0	2.5	2.5
	N (gewichtet)	4'595	1'612	339	6'546
	N (ungewichtet)	4'398	2'030	652	7'080

Fragen: 'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?' Falls nein: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketypr*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'

*Getränketypen:

2012: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.

2007: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.

1997-2002: 'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketyphen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.

Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.

Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketyphen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketyphen.

Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit des gelegentlichesbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	mindestens jede Woche	4.5	1.6	0.9	(0.6)	1.2	(0.6)	-	1.4
	jeden Monat	21.1	15.1	8.5	7.3	6.6	4.1	2.0	9.6
	< 1 mal im Monat	29.6	30.3	25.8	20.5	16.7	12.7	5.7	21.3
	nie in den letzten 12 Monaten	25.9	34.6	48.7	57.3	59.8	66.0	68.0	50.5
	abstinent	18.9	18.5	16.1	14.3	15.7	16.6	24.2	17.3
	N (gewichtet)	2'767	3'299	3'535	3'999	2'986	2'370	2'024	20'980
	N (ungewichtet)	2'936	2'567	3'515	4'225	3'210	2'782	1'858	21'093

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
 Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des gelegenhetsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	mindestens jede Woche	7.5	2.5	(1.3)	(0.9)	(1.7)	(1.1)	-	2.2
	jeden Monat	27.7	23.4	13.8	10.5	9.8	6.6	4.2	14.5
	< 1 mal im Monat	30.6	38.2	35.7	29.0	24.1	20.9	10.1	28.8
	nie in den letzten 12 Monaten	17.1	23.4	39.0	49.8	53.5	60.4	71.6	42.5
	abstinent	17.1	12.5	10.1	9.7	11.0	11.0	13.9	11.9
	N (gewichtet)	1'403	1'664	1'755	1'996	1'475	1'129	771	10'193
	N (ungewichtet)	1'485	1'209	1'650	1'966	1'528	1'333	790	9'961

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
 Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des gelegenhetsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Alkohol	Altersgruppen							Gesamt	
	15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %		
2012	mindestens jede Woche	(1.5)	-	-	-	(0.8)	-	-	0.5
	jeden Monat	14.2	6.6	3.3	4.1	3.5	(1.7)	-	4.9
	< 1 mal im Monat	28.5	22.2	16.1	12.0	9.4	5.3	3.0	14.1
	nie in den letzten 12 Monaten	35.0	46.0	58.2	64.8	66.0	71.1	65.8	58.1
	abstinent	20.8	24.6	21.9	18.8	20.3	21.7	30.5	22.4
	N (gewichtet)	1'364	1'635	1'780	2'003	1'512	1'241	1'253	10'787
	N (ungewichtet)	1'451	1'358	1'865	2'259	1'682	1'449	1'068	11'132

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
 Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des gelegentlichesbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
2012	mindestens jede Woche	1.2	2.1	(0.7)	1.4
	jeden Monat	9.6	10.2	6.3	9.6
	< 1 mal im Monat	20.9	23.0	17.8	21.3
	nie in den letzten 12 Monaten	52.7	44.0	51.5	50.5
	abstinent	15.7	20.7	23.7	17.3
	N (gewichtet)	14'977	5'060	943	20'980
	N (ungewichtet)	13'975	5'566	1'552	21'093

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.

Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
2012	mindestens jede Woche	1.8	3.7	-	2.2
	jeden Monat	14.4	15.9	9.6	14.5
	< 1 mal im Monat	28.1	31.4	26.7	28.8
	nie in den letzten 12 Monaten	44.5	35.2	47.7	42.5
	abstinent	11.1	13.8	14.8	11.9
	N (gewichtet)	7'400	2'359	433	10'193
	N (ungewichtet)	6'694	2'558	709	9'961

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
 Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*


Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
2012	mindestens jede Woche	0.5	(0.7)	-	0.5
	jeden Monat	4.8	5.2	(3.6)	4.9
	< 1 mal im Monat	13.9	15.6	10.2	14.1
	nie in den letzten 12 Monaten	60.6	51.8	54.7	58.1
	abstinent	20.2	26.7	31.2	22.4
	N (gewichtet)	7'577	2'701	509	10'787
	N (ungewichtet)	7'281	3'008	843	11'132

Fragen: 'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?' und 'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
 Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

3 Medikamente

*Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmitteln
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*



Fragen: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?' und 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?' und 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	(0.8)	1.0	2.0	3.8	5.1	11.4	3.0
	mehrmals pro Woche	-	-	1.0	1.1	1.8	2.4	3.5	1.3
	etwa einmal pro Woche	(0.4)	-	(0.3)	(0.6)	1.3	2.3	2.9	1.0
	nie	99	98.8	97.7	96.3	93.1	90.3	82.2	94.7
	N (gewichtet)	2'828	3'376	3'624	4'116	3'052	2'427	2'144	21'567
	N (ungewichtet)	2'991	2'615	3'594	4'317	3'258	2'845	1'953	21'573
2007	täglich	-	(0.4)	1.1	2.2	3.2	6.3	13.4	2.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.6)	1.3	1.5	2.6	3.1	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	(0.7)	(0.9)	1.1	2.0	2.4	2.6	1.3
	nie	99.5	98.5	97.4	95.4	93.4	88.6	80.8	94.8
	N (gewichtet)	2'853	2'871	3'685	3'213	2'703	1'848	1'525	18'699
	N (ungewichtet)	1'807	2'503	3'805	2'999	3'112	2'491	1'997	18'714
2002	täglich	-	(0.3)	0.7	1.9	2.2	5.3	11.4	2.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.5)	0.9	1.0	2.1	3.4	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.4)	(0.6)	1.3	2.1	2.8	0.9
	nie	99.5	99.3	98.4	96.6	95.5	90.5	82.5	95.9
	N (gewichtet)	2'754	3'362	3'930	3'249	2'730	2'100	1'550	19'676
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'173	3'240	2'533	1'820	19'680
1997	täglich	-	(0.7)	(0.6)	1.6	3.7	6.9	17.3	3.1
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(0.7)	1.3	1.6	3.1	3.9	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	(0.4)	(0.6)	(1.1)	(1.0)	2.0	3.3	1.0
	nie	99.5	98.6	98.2	96.0	93.7	87.9	75.5	94.6
	N (gewichtet)	1'785	2'502	2'466	2'195	1'638	1'391	1'014	12'992
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'509	1'957	1'682	1'511	1'058	12'995
1992	täglich	-	-	(0.8)	2.1	3.9	6.8	17.9	2.9
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(0.3)	(1.2)	1.8	2.2	4.1	1.1
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.7)	1.0	1.6	1.8	3.9	1.0
	nie	99.3	99.2	98.2	95.7	92.7	89.1	74.1	95.0
	N (gewichtet)	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	914	15'267
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	955	15'270

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	-	(0.7)	1.3	2.3	2.3	6.1	1.5
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.9)	(1.3)	(1.3)	(1.7)	(2.8)	1.0
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(1.2)	(1.7)	(3.3)	0.8
	nie	99.4	99.6	98.0	97.0	95.2	94.3	87.8	96.6
	N (gewichtet)	1'439	1'712	1'814	2'082	1'527	1'156	839	10'568
	N (ungewichtet)	1'515	1'238	1'701	2'032	1'562	1'369	855	10'272
2007	täglich	-	-	(0.8)	(2.0)	2.7	4.4	8.1	1.9
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.2)	(2.3)	(2.1)	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.9)	(0.7)	(1.2)	(1.3)	(1.8)	0.9
	nie	99.5	98.5	97.8	96.9	95.0	92.0	88.0	96.4
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'608	1'340	860	600	9'128
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'416	1'398	1'008	758	8'398
2002	täglich	-	-	(0.4)	(1.1)	1.5	3.2	8.7	1.3
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(0.6)	(0.8)	(1.6)	(2.0)	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(1.5)	(3.0)	0.7
	nie	99.1	99.8	98.8	98.0	96.7	93.7	86.3	97.3
	N (gewichtet)	1'400	1'661	1'983	1'634	1'350	898	583	9'509
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'447	1'407	1'064	707	8'895
1997	täglich	-	-	-	(1.3)	(2.0)	(3.9)	13.4	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(2.0)	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.7)	-	-	(2.3)	-	0.7
	nie	99.7	99.2	98.5	97.2	96.7	91.9	81.7	96.7
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	367	6'251
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	täglich	-	-	(0.7)	(0.9)	2.9	4.6	9.6	1.7
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	(1.4)	(1.3)	(2.7)	0.7
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	nie	99.3	99.7	98.5	97.4	94.7	92.9	85.0	96.9
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	388	7'347
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	-	(1.3)	(1.2)	2.8	5.3	7.6	14.8	4.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(1.1)	(0.9)	2.3	3.1	3.9	1.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	(0.8)	(1.4)	2.8	2.7	1.1
	nie	98.7	98.0	97.4	95.6	91.0	86.6	78.7	92.9
	N (gewichtet)	1'389	1'664	1'811	2'034	1'525	1'272	1'305	10'999
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'893	2'285	1'696	1'476	1'098	11'301
2007	täglich	-	-	(1.4)	2.4	3.7	8.0	16.9	3.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.6)	(2.2)	1.8	2.9	3.8	1.5
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.9)	(1.5)	2.7	3.4	3.2	1.6
	nie	99.5	98.6	97.0	93.9	91.9	85.7	76.1	93.2
	N (gewichtet)	1'389	1'456	1'844	1'606	1'363	988	925	9'571
	N (ungewichtet)	889	1'377	2'031	1'583	1'714	1'483	1'239	10'316
2002	täglich	-	(0.5)	(1.1)	2.7	2.9	6.8	13.0	3.2
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.5)	(1.1)	(1.1)	2.5	4.2	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.4)	(1.0)	(1.6)	2.6	2.7	1.1
	nie	99.8	98.9	98.0	95.2	94.3	88.1	80.2	94.6
	N (gewichtet)	1'355	1'701	1'947	1'615	1'381	1'202	967	10'167
	N (ungewichtet)	843	1'659	2'142	1'726	1'833	1'469	1'113	10'785
1997	täglich	-	(0.9)	(1.1)	(1.9)	5.4	9.2	19.5	4.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.7)	(1.7)	(2.1)	3.9	4.8	1.7
	etwa einmal pro Woche	-	(0.7)	-	(1.5)	(1.7)	(1.9)	(3.8)	1.3
	nie	99.3	98.0	97.8	94.9	90.8	85.0	71.9	92.7
	N (gewichtet)	885	1'261	1'221	1'104	826	795	647	6'741
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'062	951	924	702	7'237
1992	täglich	-	-	(0.8)	3.2	4.9	8.8	24.0	4.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(1.2)	(2.1)	3.0	5.1	1.3
	etwa einmal pro Woche	-	-	(1.0)	(1.5)	(2.2)	(2.4)	(4.8)	1.4
	nie	99.3	98.8	98.0	94.1	90.7	85.8	66.1	93.3
	N (gewichtet)	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	525	7'920
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	623	8'425

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	2.4	4.3	4.2	3.0
	mehrmals pro Woche	1.4	1.1	(1.4)	1.3
	etwa einmal pro Woche	0.9	1.3	(0.9)	1.0
	nie	95.4	93.2	93.4	94.7
	N (gewichtet)	15'383	5'216	968	21'567
	N (ungewichtet)	14'278	5'700	1'595	21'573
2007	täglich	2.4	3.7	4.4	2.8
	mehrmals pro Woche	1.0	1.6	(0.8)	1.2
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.5	(1.3)	1.3
	nie	95.4	93.2	93.5	94.8
	N (gewichtet)	13'452	4'397	850	18'699
	N (ungewichtet)	11'466	5'713	1'535	18'714
2002	täglich	1.8	3.6	3.5	2.3
	mehrmals pro Woche	0.8	1.2	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.0	(1.4)	0.9
	nie	96.6	94.2	93.4	95.9
	N (gewichtet)	14'206	4'563	906	19'676
	N (ungewichtet)	13'201	4'930	1'549	19'680
1997	täglich	2.5	4.4	5.3	3.1
	mehrmals pro Woche	1.2	1.4	(1.3)	1.2
	etwa einmal pro Woche	0.9	1.4	(1.1)	1.0
	nie	95.4	92.8	92.3	94.6
	N (gewichtet)	9'285	3'084	622	12'992
	N (ungewichtet)	8'255	3'609	1'131	12'995
1992	täglich	2.1	5.3	4.2	2.9
	mehrmals pro Woche	0.9	1.4	(1.2)	1.1
	etwa einmal pro Woche	0.9	1.4	(0.9)	1.0
	nie	96.1	92.0	93.8	95.0
	N (gewichtet)	10'965	3'585	716	15'267
	N (ungewichtet)	10'332	4'108	830	15'270

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	1.2	2.2	(3.2)	1.5
	mehrmals pro Woche	1.1	(1.0)	-	1.0
	etwa einmal pro Woche	0.7	1.2	(1.3)	0.8
	nie	97.1	95.5	94.5	96.6
	N (gewichtet)	7'649	2'468	451	10'568
	N (ungewichtet)	6'884	2'650	738	10'272
2007	täglich	1.6	2.5	(3.2)	1.9
	mehrmals pro Woche	0.7	1.0	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.2	-	0.9
	nie	96.9	95.3	95.0	96.4
	N (gewichtet)	6'577	2'152	399	9'128
	N (ungewichtet)	5'190	2'550	658	8'398
2002	täglich	0.9	2.4	(3.0)	1.3
	mehrmals pro Woche	0.5	(1.0)	(1.3)	0.6
	etwa einmal pro Woche	0.7	(0.7)	-	0.7
	nie	97.9	95.9	94.9	97.3
	N (gewichtet)	6'977	2'108	424	9'509
	N (ungewichtet)	6'099	2'116	680	8'895
1997	täglich	1.4	2.8	(3.3)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.7)	(1.1)	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	(0.6)	(1.2)	-	0.7
	nie	97.4	94.9	95.1	96.7
	N (gewichtet)	4'533	1'441	277	6'251
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	täglich	1.1	3.2	(3.8)	1.7
	mehrmals pro Woche	0.6	(1.2)	-	0.7
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	(0.8)	-	0.6
	nie	97.7	94.7	95.4	96.9
	N (gewichtet)	5'307	1'702	338	7'347
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	3.6	6.2	5.1	4.3
	mehrmals pro Woche	1.7	1.2	(1.8)	1.6
	etwa einmal pro Woche	1.1	1.4	-	1.1
	nie	93.6	91.1	92.5	92.9
	N (gewichtet)	7'734	2'747	518	10'999
	N (ungewichtet)	7'394	3'050	857	11'301
2007	täglich	3.3	4.9	5.4	3.8
	mehrmals pro Woche	1.4	2.1	-	1.5
	etwa einmal pro Woche	1.5	1.8	(1.8)	1.6
	nie	93.9	91.1	92.2	93.2
	N (gewichtet)	6'875	2'245	451	9'571
	N (ungewichtet)	6'276	3'163	877	10'316
2002	täglich	2.6	4.7	3.9	3.2
	mehrmals pro Woche	1.1	1.4	(2.0)	1.2
	etwa einmal pro Woche	1.0	1.2	(2.0)	1.1
	nie	95.4	92.7	92.1	94.6
	N (gewichtet)	7'230	2'455	483	10'167
	N (ungewichtet)	7'102	2'814	869	10'785
1997	täglich	3.6	5.8	6.8	4.3
	mehrmals pro Woche	1.7	1.7	(1.8)	1.7
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.6	-	1.3
	nie	93.5	90.9	90.2	92.7
	N (gewichtet)	4'753	1'643	345	6'741
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	662	7'237
1992	täglich	3.0	7.1	(4.6)	4.0
	mehrmals pro Woche	1.2	1.6	-	1.3
	etwa einmal pro Woche	1.2	1.8	-	1.4
	nie	94.6	89.4	92.2	93.3
	N (gewichtet)	5'659	1'884	378	7'920
	N (ungewichtet)	5'668	2'261	496	8'425

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.6)	(0.7)	2.4	3.2	4.0	3.0	5.7	2.7
	mehrmals pro Woche	-	(0.8)	(0.6)	0.9	1.0	1.2	1.7	0.9
	etwa einmal pro Woche	(0.8)	(0.3)	(0.5)	(0.5)	(0.6)	1.2	(1.1)	0.7
	nie	98.4	98.2	96.5	95.4	94.4	94.5	91.5	95.8
	N (gewichtet)	2'828	3'376	3'624	4'110	3'056	2'424	2'137	21'555
	N (ungewichtet)	2'991	2'615	3'594	4'313	3'262	2'841	1'944	21'560
2007	täglich	(0.6)	1.2	2.0	2.7	4.3	4.2	5.1	2.6
	mehrmals pro Woche	-	(0.4)	(0.4)	(0.9)	1.2	1.2	1.9	0.8
	etwa einmal pro Woche	(0.9)	(0.3)	(0.5)	(1.0)	1.2	1.5	2.3	1.0
	nie	98.5	98.1	97.0	95.3	93.3	93.2	90.7	95.7
	N (gewichtet)	2'853	2'871	3'685	3'206	2'702	1'849	1'527	18'692
	N (ungewichtet)	1'807	2'502	3'804	2'995	3'113	2'489	1'996	18'706
2002	täglich	(0.4)	1.1	2.0	2.8	3.8	4.3	4.3	2.4
	mehrmals pro Woche	-	(0.5)	(0.3)	(0.6)	0.9	(1.2)	(1.6)	0.7
	etwa einmal pro Woche	-	(0.3)	(0.3)	(0.7)	1.1	(1.3)	(1.6)	0.7
	nie	98.8	98.1	97.5	95.8	94.3	93.3	92.5	96.2
	N (gewichtet)	2'754	3'361	3'930	3'248	2'731	2'101	1'547	19'672
	N (ungewichtet)	1'695	3'019	4'198	3'172	3'241	2'534	1'815	19'674
1997	täglich	-	1.5	1.8	3.2	3.8	3.6	5.6	2.6
	mehrmals pro Woche	-	(0.3)	(1.0)	(0.9)	(1.4)	(0.9)	(2.1)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(0.6)	(2.0)	(2.2)	0.8
	nie	98.8	97.8	96.5	95.2	94.1	93.4	90.1	95.7
	N (gewichtet)	1'785	2'502	2'465	2'197	1'638	1'391	1'013	12'991
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'508	1'958	1'681	1'511	1'057	12'993
1992	täglich	(1.1)	1.4	1.5	2.7	4.3	5.1	6.7	2.7
	mehrmals pro Woche	(0.8)	(0.4)	(0.3)	(0.7)	(1.2)	(1.4)	(1.9)	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	(0.6)	(0.4)	(0.4)	(1.2)	(0.7)	(2.4)	0.7
	nie	97.8	97.6	97.7	96.3	93.4	92.7	88.9	95.9
	N (gewichtet)	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	917	15'271
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	956	15'271

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.6)	-	2.4	2.7	3.2	1.9	2.8	2.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(1.0)	(0.9)	(1.0)	(1.6)	0.8
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	(1.0)	-	0.4
	nie	99.0	98.5	97.0	96.2	95.6	96.1	94.7	96.9
	N (gewichtet)	1'439	1'712	1'814	2'076	1'529	1'154	836	10'560
	N (ungewichtet)	1'515	1'238	1'701	2'029	1'564	1'366	851	10'264
2007	täglich	-	(1.0)	1.8	1.9	3.7	2.9	(3.3)	2.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(0.7)	(1.0)	-	(2.2)	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(0.7)	(0.8)	(2.1)	0.7
	nie	98.5	98.3	97.3	96.7	94.6	95.7	92.4	96.7
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'601	1'337	859	600	9'118
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'773	1'413	1'398	1'007	758	8'393
2002	täglich	-	(0.7)	(1.4)	2.2	2.6	3.7	(3.8)	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.4)	-	-	-	-	0.5
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	(1.0)	(1.4)	-	0.5
	nie	98.7	98.8	98.0	97.2	95.9	94.0	94.3	97.2
	N (gewichtet)	1'400	1'661	1'983	1'634	1'350	898	582	9'507
	N (ungewichtet)	852	1'360	2'057	1'447	1'408	1'064	705	8'893
1997	täglich	-	(1.3)	(1.8)	(1.7)	(2.7)	-	(2.6)	1.6
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	(2.6)	-	0.7
	nie	99.2	98.1	96.7	97.4	95.9	96.2	93.6	97.1
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	367	6'251
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	täglich	(1.1)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	3.4	(2.7)	(4.9)	1.8
	mehrmals pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	nie	98.0	97.8	98.1	97.5	95.0	95.6	92.7	97.0
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	388	7'347
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	(0.6)	(1.0)	2.4	3.7	4.8	4.0	7.6	3.3
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.9)	(0.8)	(1.2)	(1.5)	(1.8)	1.0
	etwa einmal pro Woche	(1.4)	-	(0.7)	(0.9)	(0.9)	(1.4)	(1.1)	0.9
	nie	97.8	97.8	95.9	94.6	93.1	93.1	89.5	94.7
	N (gewichtet)	1'389	1'664	1'811	2'034	1'527	1'270	1'301	10'996
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'893	2'284	1'698	1'475	1'093	11'296
2007	täglich	-	(1.5)	2.3	3.5	4.9	5.2	6.2	3.1
	mehrmals pro Woche	-	-	(0.4)	(1.2)	(1.3)	(1.7)	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	-	(0.6)	(1.4)	(1.7)	(2.1)	(2.5)	1.3
	nie	98.4	97.8	96.7	94.0	92.0	91.0	89.7	94.7
	N (gewichtet)	1'389	1'455	1'844	1'604	1'365	989	926	9'574
	N (ungewichtet)	889	1'376	2'031	1'582	1'715	1'482	1'238	10'313
2002	täglich	-	(1.5)	2.5	3.4	4.9	4.7	4.6	3.0
	mehrmals pro Woche	-	-	-	(1.1)	(1.3)	(1.5)	(1.7)	0.9
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	(1.1)	(1.1)	(1.2)	(2.2)	0.9
	nie	98.9	97.3	96.9	94.4	92.7	92.7	91.5	95.3
	N (gewichtet)	1'355	1'701	1'947	1'614	1'381	1'203	966	10'165
	N (ungewichtet)	843	1'659	2'141	1'725	1'833	1'470	1'110	10'781
1997	täglich	-	(1.8)	(1.8)	4.7	4.8	5.7	7.4	3.5
	mehrmals pro Woche	-	-	(1.4)	(1.3)	(2.0)	(1.4)	(2.1)	1.2
	etwa einmal pro Woche	-	-	-	(1.0)	-	(1.6)	(2.4)	1.0
	nie	98.3	97.4	96.3	93.0	92.4	91.4	88.1	94.4
	N (gewichtet)	885	1'261	1'219	1'107	826	795	645	6'740
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'353	1'063	950	924	701	7'235
1992	täglich	(1.1)	(1.5)	1.8	3.8	5.1	7.3	8.0	3.4
	mehrmals pro Woche	(1.0)	(0.5)	-	(0.6)	(1.6)	(1.8)	(2.9)	1.0
	etwa einmal pro Woche	-	(0.5)	-	-	(1.5)	-	(2.9)	0.8
	nie	97.6	97.5	97.3	95.1	91.8	90.1	86.2	94.8
	N (gewichtet)	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	529	7'924
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	2.1	4.3	4.2	2.7
	mehrmals pro Woche	0.7	1.3	(0.9)	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.5	1.0	(0.9)	0.7
	nie	96.7	93.5	94.1	95.8
	N (gewichtet)	15'376	5'213	967	21'555
	N (ungewichtet)	14'273	5'694	1'593	21'560
2007	täglich	2.0	4.0	3.9	2.6
	mehrmals pro Woche	0.6	1.0	(1.2)	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.6	(0.7)	1.0
	nie	96.5	93.4	94.2	95.7
	N (gewichtet)	13'449	4'393	850	18'692
	N (ungewichtet)	11'466	5'705	1'535	18'706
2002	täglich	1.6	4.9	3.0	2.4
	mehrmals pro Woche	0.6	0.9	(0.9)	0.7
	etwa einmal pro Woche	0.7	0.8	(0.9)	0.7
	nie	97.2	93.4	95.2	96.2
	N (gewichtet)	14'206	4'561	906	19'672
	N (ungewichtet)	13'199	4'927	1'548	19'674
1997	täglich	1.9	4.0	5.1	2.6
	mehrmals pro Woche	0.7	1.2	(1.4)	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.2	-	0.8
	nie	96.6	93.6	93.0	95.7
	N (gewichtet)	9'288	3'081	622	12'991
	N (ungewichtet)	8'255	3'607	1'131	12'993
1992	täglich	2.2	4.0	3.7	2.7
	mehrmals pro Woche	0.6	1.2	(1.2)	0.8
	etwa einmal pro Woche	0.5	1.1	-	0.7
	nie	96.7	93.7	94.6	95.9
	N (gewichtet)	10'969	3'586	716	15'271
	N (ungewichtet)	10'333	4'108	830	15'271

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'.

Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	1.5	3.3	(3.8)	2.0
	mehrmals pro Woche	0.6	(1.1)	-	0.8
	etwa einmal pro Woche	(0.3)	(0.6)	-	0.4
	nie	97.6	94.9	94.9	96.9
	N (gewichtet)	7'644	2'467	449	10'560
	N (ungewichtet)	6'881	2'647	736	10'264
2007	täglich	1.7	2.8	(2.4)	2.0
	mehrmals pro Woche	(0.5)	1.0	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	1.3	-	0.7
	nie	97.3	95.0	95.8	96.7
	N (gewichtet)	6'569	2'150	399	9'118
	N (ungewichtet)	5'188	2'547	658	8'393
2002	täglich	1.2	3.8	(1.2)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.7)	-	0.5
	etwa einmal pro Woche	(0.5)	-	-	0.5
	nie	97.9	95.1	97.0	97.2
	N (gewichtet)	6'977	2'107	424	9'507
	N (ungewichtet)	6'099	2'114	680	8'893
1997	täglich	1.2	2.7	(3.0)	1.6
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.9)	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.6)	(1.1)	-	0.7
	nie	97.7	95.3	96.5	97.1
	N (gewichtet)	4'533	1'441	277	6'251
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	täglich	1.4	3.0	(2.7)	1.8
	mehrmals pro Woche	(0.4)	(0.8)	-	0.6
	etwa einmal pro Woche	(0.4)	(1.1)	-	0.6
	nie	97.7	95.1	95.7	97.0
	N (gewichtet)	5'307	1'702	338	7'347
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*


Beruhigungsmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	2.6	5.1	4.5	3.3
	mehrmals pro Woche	0.8	1.4	-	1.0
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.2	-	0.9
	nie	95.7	92.2	93.3	94.7
	N (gewichtet)	7'732	2'746	518	10'996
	N (ungewichtet)	7'392	3'047	857	11'296
2007	täglich	2.3	5.2	5.2	3.1
	mehrmals pro Woche	0.8	1.1	(1.3)	0.9
	etwa einmal pro Woche	1.1	1.8	-	1.3
	nie	95.7	91.9	92.8	94.7
	N (gewichtet)	6'881	2'243	451	9'574
	N (ungewichtet)	6'278	3'158	877	10'313
2002	täglich	1.9	5.8	4.6	3.0
	mehrmals pro Woche	0.8	1.1	-	0.9
	etwa einmal pro Woche	0.8	1.1	(1.1)	0.9
	nie	96.5	92.0	93.6	95.3
	N (gewichtet)	7'229	2'454	482	10'165
	N (ungewichtet)	7'100	2'813	868	10'781
1997	täglich	2.6	5.2	6.7	3.5
	mehrmals pro Woche	1.0	1.5	(2.1)	1.2
	etwa einmal pro Woche	0.9	(1.2)	-	1.0
	nie	95.5	92.1	90.3	94.4
	N (gewichtet)	4'755	1'640	345	6'740
	N (ungewichtet)	4'515	2'058	662	7'235
1992	täglich	2.9	4.9	(4.6)	3.4
	mehrmals pro Woche	0.8	1.6	-	1.0
	etwa einmal pro Woche	0.6	(1.2)	-	0.8
	nie	95.7	92.4	93.6	94.8
	N (gewichtet)	5'662	1'884	378	7'924
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schmerzmitteln, nach Geschlecht
 Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*



Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	3.2	3.8	4.8	6.1	9.6	8.3	13.4	6.6
	mehrmals pro Woche	6.1	5.8	7.7	8.0	7.6	8.4	8.5	7.4
	etwa einmal pro Woche	9.8	10.1	11.5	9.0	7.8	8.0	6.8	9.2
	nie	81.0	80.3	75.9	76.9	75.0	75.3	71.3	76.8
	N (gewichtet)	2'828	3'374	3'624	4'117	3'056	2'426	2'139	21'564
	N (ungewichtet)	2'991	2'614	3'592	4'318	3'260	2'843	1'948	21'566
2007	täglich	2.5	3.3	4.4	5.9	7.9	8.3	13.1	5.8
	mehrmals pro Woche	3.1	5.0	5.1	6.5	5.3	6.8	8.3	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.3	9.9	10.2	9.3	8.4	6.8	7.4	8.9
	nie	86.1	81.8	80.3	78.4	78.4	78.1	71.2	79.9
	N (gewichtet)	2'853	2'871	3'685	3'207	2'705	1'848	1'528	18'697
	N (ungewichtet)	1'807	2'502	3'804	2'996	3'112	2'490	2'000	18'711
2002	täglich	2.3	2.9	3.9	4.4	5.1	5.6	8.7	4.3
	mehrmals pro Woche	2.4	4.4	4.2	4.4	4.6	5.1	4.9	4.2
	etwa einmal pro Woche	6.9	6.6	6.9	5.2	4.4	5.8	5.9	6.0
	nie	88.4	86.1	85.0	86.1	85.9	83.6	80.5	85.5
	N (gewichtet)	2'754	3'357	3'928	3'245	2'726	2'101	1'548	19'659
	N (ungewichtet)	1'694	3'017	4'198	3'168	3'238	2'534	1'817	19'666
1997	täglich	2.9	2.1	3.6	3.5	3.8	6.2	11.4	4.1
	mehrmals pro Woche	4.0	3.9	5.4	6.7	4.9	3.8	5.4	4.9
	etwa einmal pro Woche	8.8	8.5	9.3	7.2	6.3	5.5	5.4	7.7
	nie	84.3	85.4	81.7	82.5	84.9	84.5	77.7	83.3
	N (gewichtet)	1'785	2'502	2'466	2'197	1'638	1'391	1'014	12'994
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'509	1'958	1'682	1'511	1'057	12'995
1992	täglich	3.7	3.7	3.5	3.4	5.6	4.7	7.9	4.2
	mehrmals pro Woche	2.5	3.2	2.8	3.7	3.5	3.2	4.3	3.2
	etwa einmal pro Woche	5.4	5.6	5.1	4.9	4.2	4.0	5.5	5.0
	nie	88.3	87.6	88.7	88.0	86.7	88.1	82.2	87.6
	N (gewichtet)	2'302	3'185	2'777	2'526	1'797	1'767	918	15'272
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'869	2'397	2'000	1'707	956	15'272

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	2.0	3.6	4.7	5.0	8.8	7.4	9.5	5.5
	mehrmals pro Woche	4.0	4.3	6.2	5.1	5.5	5.8	6.3	5.2
	etwa einmal pro Woche	7.6	8.3	10.9	7.5	4.8	5.7	6.0	7.5
	nie	86.4	83.8	78.3	82.3	80.8	81.1	78.1	81.8
	N (gewichtet)	1'439	1'710	1'814	2'083	1'534	1'155	838	10'573
	N (ungewichtet)	1'515	1'237	1'701	2'033	1'564	1'368	853	10'271
2007	täglich	(2.2)	3.2	3.8	4.7	7.3	6.3	7.2	4.6
	mehrmals pro Woche	(2.1)	3.4	3.7	4.6	4.7	5.1	6.5	4.0
	etwa einmal pro Woche	6.7	8.7	8.3	7.0	5.8	5.1	6.3	7.1
	nie	89.0	84.7	84.2	83.7	82.3	83.5	80.0	84.3
	N (gewichtet)	1'464	1'416	1'841	1'602	1'338	857	601	9'118
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'414	1'397	1'006	759	8'394
2002	täglich	(1.7)	2.7	4.0	3.2	4.4	3.8	5.6	3.4
	mehrmals pro Woche	(1.3)	2.6	2.9	2.7	3.8	4.3	(3.5)	2.9
	etwa einmal pro Woche	5.2	4.1	4.9	4.0	3.9	4.3	5.3	4.5
	nie	91.8	90.7	88.2	90.1	87.9	87.6	85.6	89.2
	N (gewichtet)	1'400	1'659	1'983	1'634	1'347	898	582	9'502
	N (ungewichtet)	852	1'359	2'057	1'447	1'405	1'063	705	8'888
1997	täglich	(2.6)	(1.5)	3.7	(2.4)	(2.7)	(3.5)	(7.7)	3.0
	mehrmals pro Woche	(3.4)	3.8	3.5	4.9	(3.8)	(3.2)	(4.1)	3.8
	etwa einmal pro Woche	7.2	6.9	7.1	5.0	5.0	6.3	(3.3)	6.1
	nie	86.8	87.9	85.7	87.7	88.5	87.0	84.9	87.1
	N (gewichtet)	900	1'241	1'245	1'090	812	596	368	6'252
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	357	5'759
1992	täglich	3.8	3.4	3.0	2.8	6.5	(4.4)	(5.3)	3.9
	mehrmals pro Woche	(1.7)	2.2	1.9	(2.9)	(1.8)	(2.9)	(2.4)	2.2
	etwa einmal pro Woche	5.2	3.8	4.0	3.4	(3.0)	(2.9)	(3.6)	3.8
	nie	89.3	90.6	91.1	90.9	88.7	89.8	88.8	90.1
	N (gewichtet)	1'164	1'535	1'370	1'208	858	823	389	7'348
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'392	1'090	858	676	332	6'846

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Altersgruppe							Gesamt %
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	
2012	täglich	4.4	3.9	4.9	7.2	10.3	9.2	15.9	7.7
	mehrmals pro Woche	8.2	7.4	9.3	11.0	9.7	10.7	9.9	9.5
	etwa einmal pro Woche	12.0	11.9	12.2	10.4	10.8	10.1	7.3	10.8
	nie	75.4	76.8	73.6	71.4	69.1	69.9	66.9	72.1
	N gewichtet	1'389	1'664	1'810	2'034	1'522	1'271	1'302	10'992
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'891	2'285	1'696	1'475	1'095	11'295
2007	täglich	2.8	3.3	5.0	7.0	8.5	10.0	16.9	6.9
	mehrmals pro Woche	4.2	6.6	6.4	8.4	5.9	8.2	9.5	6.9
	etwa einmal pro Woche	9.9	11.0	12.2	11.6	10.9	8.3	8.2	10.6
	nie	83.2	79.0	76.5	73.0	74.7	73.4	65.5	75.6
	N gewichtet	1'389	1'455	1'844	1'605	1'367	991	928	9'579
	N (ungewichtet)	889	1'376	2'030	1'582	1'715	1'484	1'241	10'317
2002	täglich	(3.0)	3.1	3.7	5.6	5.9	6.9	10.6	5.1
	mehrmals pro Woche	3.6	6.2	5.5	6.1	5.3	5.6	5.7	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.6	9.0	8.9	6.4	4.8	6.9	6.3	7.4
	nie	84.8	81.7	81.9	82.0	84.0	80.6	77.4	82.0
	N gewichtet	1'354	1'698	1'946	1'611	1'380	1'203	966	10'158
	N (ungewichtet)	842	1'658	2'141	1'721	1'833	1'471	1'112	10'778
1997	täglich	(3.3)	2.8	3.5	4.6	4.9	8.2	13.6	5.2
	mehrmals pro Woche	4.6	4.0	7.3	8.5	6.1	4.4	6.2	5.9
	etwa einmal pro Woche	10.4	10.2	11.7	9.4	7.5	4.9	6.6	9.1
	nie	81.7	83.0	77.6	77.5	81.4	82.5	73.6	79.8
	N gewichtet	885	1'261	1'221	1'107	826	796	646	6'742
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	924	700	7'236
1992	täglich	3.7	3.9	3.9	3.9	4.8	5.0	9.9	4.5
	mehrmals pro Woche	3.4	4.1	3.6	4.5	5.0	3.3	5.8	4.1
	etwa einmal pro Woche	5.7	7.2	6.1	6.4	5.3	5.1	7.0	6.2
	nie	87.3	84.8	86.3	85.2	84.8	86.6	77.4	85.2
	N gewichtet	1'138	1'649	1'407	1'318	939	944	529	7'924
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weiteren Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	5.8	9.0	6.6	6.6
	mehrmals pro Woche	7.2	8.2	7.2	7.4
	etwa einmal pro Woche	8.8	10.2	9.4	9.2
	nie	78.2	72.7	76.8	76.8
	N (gewichtet)	15'382	5'214	968	21'564
	N (ungewichtet)	14'275	5'697	1'594	21'566
2007	täglich	5.0	8.2	6.3	5.8
	mehrmals pro Woche	5.3	6.2	4.9	5.5
	etwa einmal pro Woche	8.4	10.8	6.8	8.9
	nie	81.4	74.8	82.1	79.9
	N (gewichtet)	13'450	4'396	850	18'697
	N (ungewichtet)	11'464	5'711	1'536	18'711
2002	täglich	3.6	6.5	4.7	4.3
	mehrmals pro Woche	3.6	5.6	6.2	4.2
	etwa einmal pro Woche	5.4	8.0	5.0	6.0
	nie	87.4	79.9	84.1	85.5
	N (gewichtet)	14'192	4'561	906	19'659
	N (ungewichtet)	13'189	4'928	1'549	19'666
1997	täglich	3.6	5.6	4.7	4.1
	mehrmals pro Woche	4.2	6.9	6.2	4.9
	etwa einmal pro Woche	7.0	9.6	7.2	7.7
	nie	85.2	77.9	82.0	83.3
	N (gewichtet)	9'289	3'084	621	12'994
	N (ungewichtet)	8'256	3'609	1'130	12'995
1992	täglich	3.8	5.3	5.2	4.2
	mehrmals pro Woche	2.7	4.6	(2.8)	3.2
	etwa einmal pro Woche	4.9	5.9	(3.0)	5.0
	nie	88.6	84.2	89.1	87.6
	N (gewichtet)	10'968	3'588	716	15'272
	N (ungewichtet)	10'332	4'110	830	15'272

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	4.8	7.7	4.7	5.5
	mehrmals pro Woche	5.1	5.6	5.7	5.2
	etwa einmal pro Woche	7.2	8.7	6.3	7.5
	nie	82.9	77.9	83.4	81.8
	N (gewichtet)	7'656	2'467	450	10'573
	N (ungewichtet)	6'886	2'648	737	10'271
2007	täglich	4.1	6.2	4.8	4.6
	mehrmals pro Woche	3.8	4.5	4.0	4.0
	etwa einmal pro Woche	6.8	8.4	4.8	7.1
	nie	85.3	80.9	86.5	84.3
	N (gewichtet)	6'569	2'149	400	9'118
	N (ungewichtet)	5'187	2'547	660	8'394
2002	täglich	2.8	5.5	(3.5)	3.4
	mehrmals pro Woche	2.6	3.5	4.2	2.9
	etwa einmal pro Woche	4.1	6.0	(3.5)	4.5
	nie	90.5	85.0	88.8	89.2
	N (gewichtet)	6'971	2'107	423	9'502
	N (ungewichtet)	6'094	2'115	679	8'888
1997	täglich	2.6	4.3	(2.3)	3.0
	mehrmals pro Woche	3.3	5.1	(5.9)	3.8
	etwa einmal pro Woche	5.5	8.1	(6.3)	6.1
	nie	88.7	82.4	85.5	87.1
	N (gewichtet)	4'534	1'441	277	6'252
	N (ungewichtet)	3'741	1'549	469	5'759
1992	täglich	3.4	4.9	(6.3)	3.9
	mehrmals pro Woche	1.9	3.1	(2.8)	2.2
	etwa einmal pro Woche	3.7	4.2	-	3.8
	nie	91.0	87.8	88.7	90.1
	N (gewichtet)	5'306	1'704	338	7'348
	N (ungewichtet)	4'663	1'849	334	6'846

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	täglich	6.8	10.1	8.3	7.7
	mehrmals pro Woche	9.2	10.5	8.6	9.5
	etwa einmal pro Woche	10.4	11.5	12.1	10.8
	nie	73.6	68.0	71.0	72.1
	N (gewichtet)	7'726	2'748	518	10'992
	N (ungewichtet)	7'389	3'049	857	11'295
2007	täglich	5.9	10.1	7.6	6.9
	mehrmals pro Woche	6.6	7.9	5.7	6.9
	etwa einmal pro Woche	9.9	13.1	8.5	10.6
	nie	77.6	68.9	78.2	75.6
	N (gewichtet)	6'881	2'247	450	9'579
	N (ungewichtet)	6'277	3'164	876	10'317
2002	täglich	4.3	7.3	5.7	5.1
	mehrmals pro Woche	4.6	7.5	7.9	5.5
	etwa einmal pro Woche	6.8	9.7	6.3	7.4
	nie	84.3	75.5	80.0	82.0
	N (gewichtet)	7'221	2'454	483	10'158
	N (ungewichtet)	7'095	2'813	870	10'778
1997	täglich	4.6	6.7	6.7	5.2
	mehrmals pro Woche	5.0	8.4	6.4	5.9
	etwa einmal pro Woche	8.5	10.9	7.8	9.1
	nie	81.9	74.0	79.1	79.8
	N (gewichtet)	4'755	1'643	344	6'742
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	661	7'236
1992	täglich	4.2	5.6	(4.1)	4.5
	mehrmals pro Woche	3.5	6.0	(2.7)	4.1
	etwa einmal pro Woche	5.9	7.3	(3.8)	6.2
	nie	86.3	81.0	89.4	85.2
	N (gewichtet)	5'662	1'884	378	7'924
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: 'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'. Spaltenprozente.

Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	94.6	82.3	70.8	87.1
	nicht vom Arzt verordnet	5.4	17.7	29.2	12.9
	N (gewichtet)	638	284	211	1'133
	N (ungewichtet)	680	286	230	1'196
2007	vom Arzt verordnet	95.2	80.2	71.4	86.3
	nicht vom Arzt verordnet	4.8	19.8	28.6	13.7
	N (gewichtet)	531	215	232	977
	N (ungewichtet)	753	254	268	1'275
2002	vom Arzt verordnet	94.0	81.4	77.4	87.6
	selber gekauft	(6.0)	18.6	22.6	12.4
	N (gewichtet)	450	181	171	802
	N (ungewichtet)	584	216	197	997
1997	vom Arzt verordnet	94.8	81.7	72.7	87.6
	selber gekauft	(5.2)	18.3	27.3	12.4
	N (gewichtet)	403	162	131	696
	N (ungewichtet)	453	184	142	779
1992	vom Arzt verordnet	92.4	82.9	63.7	84.6
	selber gekauft	7.6	17.1	36.3	15.4
	N (gewichtet)	445	161	153	760
	N (ungewichtet)	541	191	171	903

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'
 2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		täglich %	Häufigkeit	etwa einmal pro Woche %	Gesamt %
			mehrmais pro Woche %		
2012	vom Arzt verordnet	93.6	85.4	70.4	85.5
	nicht vom Arzt verordnet	(6.4)	(14.6)	(29.6)	14.5
	N (gewichtet)	162	109	86	357
	N (ungewichtet)	190	105	88	383
2007	vom Arzt verordnet	98.5	82.6	64.2	86.2
	nicht vom Arzt verordnet	-	(17.4)	(35.8)	13.8
	N (gewichtet)	170	70	83	323
	N (ungewichtet)	231	80	83	394
2002	vom Arzt verordnet	96.0	82.8	84.9	90.0
	selber gekauft	-	(17.2)	(15.1)	(10.0)
	N (gewichtet)	128	61	63	252
	N (ungewichtet)	166	62	68	296
1997	vom Arzt verordnet	98.2	92.4	68.7	90.4
	selber gekauft	-	-	(31.3)	(9.6)
	N (gewichtet)	113	48	44	205
	N (ungewichtet)	113	50	44	207
1992	vom Arzt verordnet	87.1	82.7	(69.3)	82.6
	selber gekauft	(12.9)	(17.3)	(30.7)	17.4
	N (gewichtet)	127	55	44	225
	N (ungewichtet)	136	56	44	236

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'

2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schlafmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	95.0	80.4	71.1	87.9
	nicht vom Arzt verordnet	(5.0)	19.6	28.9	12.1
	N (gewichtet)	476	175	125	776
	N (ungewichtet)	490	181	142	813
2007	vom Arzt verordnet	93.7	79.0	75.3	86.3
	nicht vom Arzt verordnet	6.3	21.0	24.7	13.7
	N (gewichtet)	360	145	149	654
	N (ungewichtet)	522	174	185	881
2002	vom Arzt verordnet	93.2	80.7	72.9	86.5
	selber gekauft	(6.8)	(19.3)	27.1	13.5
	N (gewichtet)	322	120	108	550
	N (ungewichtet)	418	154	129	701
1997	vom Arzt verordnet	93.5	77.2	74.7	86.4
	selber gekauft	(6.5)	(22.8)	(25.3)	13.6
	N (gewichtet)	290	114	87	491
	N (ungewichtet)	340	134	98	572
1992	vom Arzt verordnet	94.5	83.1	61.5	85.5
	selber gekauft	(5.5)	(16.9)	38.5	14.5
	N (gewichtet)	318	106	110	534
	N (ungewichtet)	405	135	127	667

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'
 2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	98.0	76.3	64.5	88.4
	nicht vom Arzt verordnet	(2.0)	23.7	35.5	11.6
	N (gewichtet)	579	182	142	902
	N (ungewichtet)	655	185	159	999
2007	vom Arzt verordnet	92.5	69.8	66.7	82.8
	nicht vom Arzt verordnet	7.5	30.2	33.3	17.2
	N (gewichtet)	484	141	178	803
	N (ungewichtet)	633	183	192	1'008
2002	vom Arzt verordnet	95.2	70.3	65.8	85.3
	selber gekauft	(4.8)	29.7	34.2	14.7
	N (gewichtet)	475	135	136	747
	N (ungewichtet)	570	145	145	860
1997	vom Arzt verordnet	92.7	75.2	68.6	84.4
	selber gekauft	(7.3)	24.8	31.4	15.6
	N (gewichtet)	332	115	110	557
	N (ungewichtet)	368	130	114	612
1992	vom Arzt verordnet	89.6	69.2	60.0	80.9
	selber gekauft	10.4	30.8	40.0	19.1
	N (gewichtet)	407	122	102	632
	N (ungewichtet)	465	137	116	718

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'

2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	98.7	76.2	77.8	90.8
	nicht vom Arzt verordnet	-	(23.8)	(22.2)	9.2
	N (gewichtet)	211	79	40	330
	N (ungewichtet)	239	76	51	366
2007	vom Arzt verordnet	96.2	79.3	64.9	87.0
	nicht vom Arzt verordnet	-	(20.7)	(35.1)	13.0
	N (gewichtet)	184	56	57	297
	N (ungewichtet)	218	60	64	342
2002	vom Arzt verordnet	95.1	67.6	(71.4)	86.0
	selber gekauft	-	(32.4)	(28.6)	14.0
	N (gewichtet)	171	46	47	264
	N (ungewichtet)	182	47	41	270
1997	vom Arzt verordnet	93.5	(80.4)	(70.1)	85.1
	selber gekauft	-	-	(29.9)	(14.9)
	N (gewichtet)	99	35	45	179
	N (ungewichtet)	99	35	39	173
1992	vom Arzt verordnet	89.9	70.8	(56.5)	79.9
	selber gekauft	(10.1)	-	(43.5)	20.1
	N (gewichtet)	136	41	42	219
	N (ungewichtet)	149	42	41	232

Frage: 1992-2002: **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
 2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Beruhigungsmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	97.6	76.4	59.4	87.0
	nicht vom Arzt verordnet	(2.4)	(23.6)	40.6	13.0
	N (gewichtet)	368	103	102	572
	N (ungewichtet)	416	109	108	633
2007	vom Arzt verordnet	90.3	63.5	67.5	80.3
	nicht vom Arzt verordnet	9.7	36.5	32.5	19.7
	N (gewichtet)	300	85	122	506
	N (ungewichtet)	415	123	128	666
2002	vom Arzt verordnet	95.3	71.7	62.9	84.9
	selber gekauft	(4.7)	(28.3)	37.1	15.1
	N (gewichtet)	304	89	90	482
	N (ungewichtet)	388	98	104	590
1997	vom Arzt verordnet	92.4	72.9	67.6	84.0
	selber gekauft	(7.6)	(27.1)	(32.4)	16.0
	N (gewichtet)	233	80	65	378
	N (ungewichtet)	269	95	75	439
1992	vom Arzt verordnet	89.5	68.4	62.4	81.4
	selber gekauft	10.5	(31.6)	(37.6)	18.6
	N (gewichtet)	271	81	60	413
	N (ungewichtet)	316	95	75	486

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'

2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	90.8	57.4	29.0	55.7
	nicht vom Arzt verordnet	9.2	42.6	71.0	44.3
	N (gewichtet)	1'423	1'590	1'978	4'991
	N (ungewichtet)	1'399	1'592	1'952	4'943
2007	vom Arzt verordnet	90.8	57.3	29.8	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	9.2	42.7	70.2	45.2
	N (gewichtet)	1'081	1'022	1'659	3'763
	N (ungewichtet)	1'243	1'087	1'674	4'004
2002	vom Arzt verordnet	88.1	56.3	32.6	55.9
	selber gekauft	11.9	43.7	67.4	44.1
	N (gewichtet)	846	826	1'182	2'854
	N (ungewichtet)	905	872	1'237	3'014
1997	vom Arzt verordnet	86.6	45.6	23.2	45.4
	selber gekauft	13.4	54.4	76.8	54.6
	N (gewichtet)	534	638	995	2'166
	N (ungewichtet)	561	674	1'022	2'257
1992	vom Arzt verordnet	73.1	47.8	25.2	47.3
	selber gekauft	26.9	52.2	74.8	52.7
	N (gewichtet)	643	487	766	1'896
	N (ungewichtet)	670	515	783	1'968

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'
 2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet.

*Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		täglich %	Häufigkeit mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	Gesamt %
2012	vom Arzt verordnet				
	nicht vom Arzt verordnet	10.3	43.1	73.0	45.6
	N (gewichtet)	579	554	795	1'927
	N (ungewichtet)	560	529	752	1'841
2007	vom Arzt verordnet	92.8	57.1	28.8	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	7.2	42.9	71.2	45.2
	N (gewichtet)	418	365	645	1'428
	N (ungewichtet)	450	348	573	1'371
2002	vom Arzt verordnet	88.0	56.7	29.7	55.4
	selber gekauft	12.0	43.3	70.3	44.6
	N (gewichtet)	326	272	426	1'024
	N (ungewichtet)	319	275	417	1'011
1997	vom Arzt verordnet	86.6	45.2	18.9	42.1
	selber gekauft	(13.4)	54.8	81.1	57.9
	N (gewichtet)	184	239	384	807
	N (ungewichtet)	175	226	365	766
1992	vom Arzt verordnet	73.6	51.0	22.1	48.8
	selber gekauft	26.4	49.0	77.9	51.2
	N (gewichtet)	284	163	277	724
	N (ungewichtet)	263	170	268	701

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'
 2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'

Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012*

Schmerzmittel		täglich %	Häufigkeit		Gesamt %
			mehrmais pro Woche %	etwa einmal pro Woche %	
2012	vom Arzt verordnet	91.6	57.7	30.3	56.4
	nicht vom Arzt verordnet	8.4	42.3	69.7	43.6
	N (gewichtet)	844	1'036	1'183	3'064
	N (ungewichtet)	839	1'063	1'200	3'102
2007	vom Arzt verordnet	89.5	57.4	30.5	54.8
	nicht vom Arzt verordnet	10.5	42.6	69.5	45.2
	N (gewichtet)	663	657	1'015	2'335
	N (ungewichtet)	793	739	1'101	2'633
2002	vom Arzt verordnet	88.2	56.1	34.2	56.2
	selber gekauft	11.8	43.9	65.8	43.8
	N (gewichtet)	520	554	756	1'830
	N (ungewichtet)	586	597	820	2'003
1997	vom Arzt verordnet	86.7	45.8	25.9	47.4
	selber gekauft	13.3	54.2	74.1	52.6
	N (gewichtet)	349	399	611	1'359
	N (ungewichtet)	386	448	657	1'491
1992	vom Arzt verordnet	72.7	46.2	27.0	46.3
	selber gekauft	27.3	53.8	73.0	53.7
	N (gewichtet)	359	324	488	1'171
	N (ungewichtet)	407	345	515	1'267

Frage: 1992-2002: 'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'
 2007-2012: 'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'


Anmerkungen: Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet.

4 Illegalle Drogen

Allgemeiner Hinweis:

Personen, die illegale Drogen einnehmen, können je nach Schweregrad der Problematik, nur bedingt über die Modalitäten einer Bevölkerungsbefragung wie die SGB erreicht werden. Zudem kann der illegale Charakter der Substanzen und ihre mehr oder weniger negative soziale Wahrnehmung häufiger als bei anderen Substanzen wie Tabak oder Alkohol zu Antworten im Sinne der sozialen Erwünschtheit führen. Somit stellen die ermittelten Prävalenzen vermutlich Unterschätzungen dar und sind folglich mit Vorsicht zu interpretieren. Diese Antworttendenzen sind wahrscheinlich je nach Substanz unterschiedlich stark ausgeprägt.

*Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
15-24-Jährige, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*



Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegalle Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	ja	24.2	38.5	40.8	38.8	38.1	26.8	9.3	22.8
	nein	75.8	61.5	59.2	61.2	61.9	73.2	90.7	77.2
	N (gewichtet)	1'286	1'537	1'650	1'728	1'659	4'300	9'410	21'571
	N (ungewichtet)	1'544	1'445	1'186	1'429	1'610	4'283	10'074	21'571
2007	ja	23.6	38.8	38.6	33.6	28.0	22.7	6.4	19.7
	nein	76.4	61.2	61.4	66.4	72.0	77.3	93.6	80.3
	N (gewichtet)	1'582	1'273	1'375	1'487	1'717	3'626	7'634	18'695
	N (ungewichtet)	964	843	1'111	1'389	1'837	3'532	9'036	18'712
2002	ja	26.0	38.3	29.2	28.3	23.6	19.0	2.7	16.2
	nein	74.0	61.7	70.8	71.7	76.4	81.0	97.3	83.8
	N (gewichtet)	1'637	1'120	1'347	2'013	2'030	3'552	7'985	19'682
	N (ungewichtet)	916	779	1'142	1'877	2'277	3'526	9'169	19'686
1997	ja	26.8	35.6	29.0	25.1	22.1	12.9	1.3	14.5
	nein	73.2	64.4	71.0	74.9	77.9	87.1	98.7	85.5
	N (gewichtet)	861	925	1'108	1'391	1'328	2'255	5'128	12'996
	N (ungewichtet)	577	834	1'255	1'608	1'427	2'052	5'241	12'994
1992	ja	14.5	21.3	19.1	17.1	11.2	6.0	(0.3)	8.7
	nein	85.5	78.7	80.9	82.9	88.8	94.0	99.7	91.3
	N (gewichtet)	1'062	1'228	1'623	1'552	1'422	2'698	5'662	15'246
	N (ungewichtet)	681	1'111	1'801	1'728	1'533	2'593	5'801	15'248

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von mindestens einer illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

illegal Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	ja	30.2	46.1	46.2	45.9	47.6	33.0	12.7	28.6
	nein	69.8	53.9	53.8	54.1	52.4	67.0	87.3	71.4
	N (gewichtet)	653	781	863	849	877	2'115	4'425	10'562
	N (ungewichtet)	788	725	565	674	789	2'005	4'719	10'265
2007	ja	30.1	47.5	47.9	43.1	34.7	26.4	8.0	24.7
	nein	69.9	52.5	52.1	56.9	65.3	73.6	92.0	75.3
	N (gewichtet)	816	658	692	716	847	1'801	3'597	9'127
	N (ungewichtet)	505	416	496	629	827	1'691	3'833	8'397
2002	ja	31.1	45.7	38.3	36.3	28.2	24.0	3.2	20.8
	nein	68.9	54.3	61.7	63.7	71.8	76.0	96.8	79.2
	N (gewichtet)	844	560	655	1'004	1'047	1'802	3'599	9'510
	N (ungewichtet)	470	383	501	858	1'125	1'709	3'846	8'892
1997	ja	30.9	43.6	38.3	30.8	28.7	18.1	1.8	19.2
	nein	69.1	56.4	61.7	69.2	71.3	81.9	98.2	80.8
	N (gewichtet)	442	457	544	695	674	1'140	2'297	6'249
	N (ungewichtet)	296	388	589	757	651	973	2'099	5'753
1992	ja	19.2	28.8	24.6	21.8	15.2	8.0	(0.5)	11.8
	nein	80.8	71.2	75.4	78.2	84.8	92.0	99.5	88.2
	N (gewichtet)	518	635	805	728	714	1'298	2'640	7'338
	N (ungewichtet)	337	512	849	788	752	1'204	2'393	6'835

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegalle Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	ja	18.0	30.7	34.9	31.9	27.4	20.9	6.3	17.1
	nein	82.0	69.3	65.1	68.1	72.6	79.1	93.7	82.9
	N (gewichtet)	633	756	787	880	783	2'185	4'985	11'009
	N (ungewichtet)	756	720	621	755	821	2'278	5'355	11'306
2007	ja	16.8	29.4	29.1	24.8	21.5	18.9	4.9	15.0
	nein	83.2	70.6	70.9	75.2	78.5	81.1	95.1	85.0
	N (gewichtet)	766	616	682	771	869	1'826	4'037	9'567
	N (ungewichtet)	459	427	615	760	1'010	1'841	5'203	10'315
2002	ja	20.5	30.9	20.5	20.4	18.7	13.8	2.2	11.8
	nein	79.5	69.1	79.5	79.6	81.3	86.2	97.8	88.2
	N (gewichtet)	793	560	692	1'009	983	1'750	4'386	10'172
	N (ungewichtet)	446	396	641	1'019	1'152	1'817	5'323	10'794
1997	ja	22.4	27.8	20.0	19.3	15.3	7.6	1.0	10.1
	nein	77.6	72.2	80.0	80.7	84.7	92.4	99.0	89.9
	N (gewichtet)	419	468	564	696	654	1'115	2'831	6'747
	N (ungewichtet)	281	446	666	851	776	1'079	3'142	7'241
1992	ja	10.0	13.2	13.6	12.9	7.3	4.2	(0.2)	5.9
	nein	90.0	86.8	86.4	87.1	92.7	95.8	99.8	94.1
	N (gewichtet)	544	593	818	824	708	1'400	3'022	7'908
	N (ungewichtet)	344	599	952	940	781	1'389	3'408	8'413

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegalle Drogen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	ja	22.3	25.0	17.5	22.8
	nein	77.7	75.0	82.5	77.2
	N (gewichtet)	15'387	5'216	968	21'571
	N (ungewichtet)	14'277	5'700	1'594	21'571
2007	ja	19.6	21.8	10.9	19.7
	nein	80.4	78.2	89.1	80.3
	N (gewichtet)	13'443	4'397	854	18'695
	N (ungewichtet)	11'454	5'717	1'541	18'712
2002	ja	15.8	18.8	8.3	16.2
	nein	84.2	81.2	91.7	83.8
	N (gewichtet)	14'211	4'564	907	19'682
	N (ungewichtet)	13'204	4'931	1'551	19'686
1997	ja	14.8	14.8	8.6	14.5
	nein	85.2	85.2	91.4	85.5
	N (gewichtet)	9'289	3'085	622	12'996
	N (ungewichtet)	8'254	3'609	1'131	12'994
1992	ja	8.8	9.5	4.5	8.7
	nein	91.2	90.5	95.5	91.3
	N (gewichtet)	10'946	3'583	716	15'246
	N (ungewichtet)	10'312	4'106	830	15'248

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Gebrauch von mindestens einer illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

illegaler Drogen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	ja	28.2	31.1	20.9	28.6
	nein	71.8	68.9	79.1	71.4
	N (gewichtet)	7'648	2'465	450	10'562
	N (ungewichtet)	6'880	2'648	737	10'265
2007	ja	24.4	27.5	14.5	24.7
	nein	75.6	72.5	85.5	75.3
	N (gewichtet)	6'572	2'152	403	9'127
	N (ungewichtet)	5'181	2'552	664	8'397
2002	ja	19.9	25.6	11.0	20.8
	nein	80.1	74.4	89.0	79.2
	N (gewichtet)	6'976	2'111	423	9'510
	N (ungewichtet)	6'096	2'117	679	8'892
1997	ja	19.1	21.3	10.5	19.2
	nein	80.9	78.7	89.5	80.8
	N (gewichtet)	4'531	1'441	277	6'249
	N (ungewichtet)	3'736	1'548	469	5'753
1992	ja	12.2	11.6	(6.1)	11.8
	nein	87.8	88.4	93.9	88.2
	N (gewichtet)	5'298	1'701	338	7'338
	N (ungewichtet)	4'655	1'846	334	6'835

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
 Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegalle Drogen		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	ja	16.5	19.5	14.6	17.1
	nein	83.5	80.5	85.4	82.9
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	ja	15.0	16.3	7.8	15.0
	nein	85.0	83.7	92.2	85.0
	N (gewichtet)	6'871	2'245	451	9'567
	N (ungewichtet)	6'273	3'165	877	10'315
2002	ja	11.8	13.0	5.9	11.8
	nein	88.2	87.0	94.1	88.2
	N (gewichtet)	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	ja	10.7	9.2	7.0	10.1
	nein	89.3	90.8	93.0	89.9
	N (gewichtet)	4'759	1'644	345	6'747
	N (ungewichtet)	4'518	2'061	662	7'241
1992	ja	5.5	7.7	(3.1)	5.9
	nein	94.5	92.3	96.9	94.1
	N (gewichtet)	5'648	1'882	378	7'908
	N (ungewichtet)	5'657	2'260	496	8'413

Frage: 1992: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'
 1997-2012: 'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 2002-2012*

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt %
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	6 mal oder mehr im Leben	12.0	20.7	23.8	23.4	23.2	15.1	4.7	12.7
	2 bis 5 mal im Leben	8.5	13.7	14.0	12.6	11.8	8.8	2.9	7.5
	1 mal im Leben	3.3	4.8	3.8	3.4	3.3	3.3	1.5	2.7
	nie im Leben	76.1	60.8	58.4	60.6	61.7	72.9	90.9	77.1
	N (gewichtet)	1'251	1'481	1'570	1'663	1'580	4'128	8'961	20'633
	N (ungewichtet)	1'506	1'393	1'143	1'386	1'548	4'151	9'713	20'840
2007	6 mal oder mehr im Leben	11.3	25.0	27.2	21.1	16.9	12.5	3.0	11.5
	2 bis	8.8	9.7	9.2	9.6	7.5	7.3	2.2	5.8
	1 mal im Leben	4.2	5.0	3.2	4.2	4.0	3.7	1.3	2.9
	nie im Leben	75.6	60.2	60.4	65.0	71.5	76.5	93.6	79.8
	N (gewichtet)	1'509	1'164	1'284	1'402	1'612	3'402	7'158	17'530
	N (ungewichtet)	925	788	1'054	1'331	1'763	3'380	8'637	17'878
2002	6 mal oder mehr im Leben	16.2	25.9	17.9	16.7	14.4	10.5	1.1	9.6
	2 bis 5 mal im Leben	5.1	9.4	8.3	8.4	6.9	5.6	1.0	4.5
	1 mal im Leben	3.9	(4.5)	3.5	3.0	2.5	2.8	0.6	2.1
	nie im Leben	74.8	60.3	70.3	71.9	76.1	81.1	97.3	83.8
	N (gewichtet)	1'575	1'033	1'249	1'915	1'940	3'365	7'518	18'596
	N (ungewichtet)	881	724	1'083	1'809	2'198	3'377	8'762	18'834

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter
Männer, Vergleich 2002-2012*

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt %
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	6 mal oder mehr im Leben	16.6	26.0	27.7	29.3	31.3	19.5	6.8	17.0
	2 bis 5 mal im Leben	9.2	16.0	14.4	13.2	12.1	10.2	3.9	8.7
	1 mal im Leben	4.5	4.7	(4.0)	(4.1)	4.2	3.6	1.8	3.1
	nie im Leben	69.7	53.3	53.8	53.4	52.4	66.7	87.5	71.2
	N (gewichtet)	637	753	827	827	837	2'025	4'180	10'087
	N (ungewichtet)	770	702	544	660	759	1'937	4'513	9'885
2007	6 mal oder mehr im Leben	17.3	31.1	37.6	29.7	20.9	15.4	4.0	15.6
	2 bis 5 mal im Leben	8.8	10.8	9.3	10.7	8.6	8.1	2.7	6.6
	1 mal im Leben	(5.2)	(5.8)	(3.2)	(3.6)	5.0	3.9	1.4	3.2
	nie im Leben	68.7	52.2	49.8	56.0	65.5	72.6	91.9	74.6
	N (gewichtet)	777	595	633	685	801	1'687	3'323	8'501
	N (ungewichtet)	483	381	462	607	792	1'606	3'583	7'914
2002	6 mal oder mehr im Leben	19.9	32.5	23.4	24.6	18.0	14.8	1.6	13.4
	2 bis 5 mal im Leben	6.0	10.8	11.1	9.0	8.0	6.6	1.1	5.5
	1 mal im Leben	(4.6)	-	(4.0)	(2.9)	2.6	2.9	(0.6)	2.3
	nie im Leben	69.5	53.0	61.5	63.5	71.4	75.7	96.7	78.9
	N (gewichtet)	814	510	598	936	994	1'688	3'271	8'810
	N (ungewichtet)	457	348	466	812	1'072	1'613	3'557	8'325

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter Frauen, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt %
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	6 mal oder mehr im Leben	7.4	15.2	19.5	17.5	14.1	10.8	2.8	8.7
	2 bis 5 mal im Leben	7.9	11.4	13.5	12.0	11.5	7.4	2.1	6.4
	1 mal im Leben	(2.0)	4.8	(3.6)	(2.7)	(2.3)	2.9	1.3	2.3
	nie im Leben	82.8	68.6	63.5	67.8	72.1	78.9	93.8	82.7
	N (gewichtet)	614	728	743	835	742	2'103	4'781	10'546
	N (ungewichtet)	736	691	599	726	789	2'214	5'200	10'955
2007	6 mal oder mehr im Leben	(5.0)	18.7	17.0	13.0	13.0	9.7	2.1	7.7
	2 bis 5 mal im Leben	8.9	8.5	9.0	8.6	6.4	6.4	1.8	5.1
	1 mal im Leben	(3.2)	(4.2)	(3.2)	4.9	3.1	3.4	1.1	2.6
	nie im Leben	82.9	68.6	70.7	73.6	77.5	80.4	95.1	84.6
	N (gewichtet)	731	569	651	717	811	1'715	3'835	9'029
	N (ungewichtet)	442	407	592	724	971	1'774	5'054	9'964
2002	6 mal oder mehr im Leben	12.2	19.5	12.9	9.3	10.7	6.2	0.7	6.2
	2 bis 5 mal im Leben	(4.2)	8.1	5.7	7.8	5.9	4.6	0.9	3.7
	1 mal im Leben	(3.2)	(5.1)	(2.9)	(3.0)	(2.4)	2.6	0.5	1.9
	nie im Leben	80.4	67.3	78.5	79.9	81.1	86.5	97.9	88.2
	N (gewichtet)	761	524	651	980	946	1'677	4'247	9'786
	N (ungewichtet)	424	376	617	997	1'126	1'764	5'205	10'509

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Vergleich 2002-2012*

Cannabis		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	6 mal oder mehr im Leben	12.5	14.2	9.2	12.7
	2 bis 5 mal im Leben	7.4	7.9	6.2	7.5
	1 mal im Leben	2.5	3.4	2.5	2.7
	nie im Leben	77.6	74.5	82.2	77.1
	N (gewichtet)	14'738	4'970	925	20'633
	N (ungewichtet)	13814	5495	1531	20840
2007	6 mal oder mehr im Leben	11.3	13.4	6.4	11.5
	2 bis 5 mal im Leben	5.8	6.5	2.6	5.8
	1 mal im Leben	2.9	2.8	(2.1)	2.9
	nie im Leben	80.0	77.4	88.8	79.8
	N (gewichtet)	12'651	4'082	796	17'530
	N (ungewichtet)	11'004	5'417	1'457	17'878
2002	6 mal oder mehr im Leben	9.1	12.1	4.2	9.6
	2 bis 5 mal im Leben	4.7	4.5	2.4	4.5
	1 mal im Leben	2.1	2.4	(1.4)	2.1
	nie im Leben	84.2	81.0	92.0	83.8
	N (gewichtet)	13'415	4'349	833	18'596
	N (ungewichtet)	12'651	4'736	1'447	18'834

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion
Männer, Vergleich 2002-2012*

Cannabis		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	6 mal oder mehr im Leben	16.5	19.6	12.3	17.0
	2 bis 5 mal im Leben	8.8	8.6	6.6	8.7
	1 mal im Leben	2.9	3.9	(2.3)	3.1
	nie im Leben	71.8	67.9	78.8	71.2
	N (gewichtet)	7'325	2'334	428	10'087
	N (ungewichtet)	6'645	2'537	703	9'885
2007	6 mal oder mehr im Leben	15.1	18.2	8.9	15.6
	2 bis 5 mal im Leben	6.4	7.8	(3.6)	6.6
	1 mal im Leben	3.3	2.9	(2.9)	3.2
	nie im Leben	75.2	71.2	84.7	74.6
	N (gewichtet)	6'162	1'970	369	8'501
	N (ungewichtet)	4'927	2'375	612	7'914
2002	6 mal oder mehr im Leben	12.5	17.7	5.9	13.4
	2 bis 5 mal im Leben	5.5	5.7	(2.7)	5.5
	1 mal im Leben	2.2	2.8	(2.1)	2.3
	nie im Leben	79.8	73.8	89.3	78.9
	N (gewichtet)	6'466	1'972	372	8'810
	N (ungewichtet)	5'727	1'989	609	8'325

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion Frauen, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	6 mal oder mehr im Leben	8.5	9.4	6.5	8.7
	2 bis 5 mal im Leben	6.1	7.3	5.7	6.4
	1 mal im Leben	2.0	2.9	(2.6)	2.3
	nie im Leben	83.4	80.4	85.1	82.7
	<i>N (gewichtet)</i>	7'413	2'636	497	10'546
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'169	2'958	828	10'955
2007	6 mal oder mehr im Leben	7.6	8.8	4.3	7.7
	2 bis 5 mal im Leben	5.3	5.3	(1.8)	5.1
	1 mal im Leben	2.6	2.7	(1.5)	2.6
	nie im Leben	84.5	83.2	92.4	84.6
	<i>N (gewichtet)</i>	6'489	2'113	428	9'029
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'077	3'042	845	9'964
2002	6 mal oder mehr im Leben	6.0	7.5	(2.9)	6.2
	2 bis 5 mal im Leben	3.9	3.5	(2.1)	3.7
	1 mal im Leben	2.0	2.0	-	1.9
	nie im Leben	88.2	87.1	94.2	88.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'948	2'377	461	9'786
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'924	2'747	838	10'509

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'
 2002-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012**

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt %
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	3.8	3.6	3.7	(2.0)	(1.8)	0.9	(0.2)	1.3
	1 bis 3 mal im Monat	3.1	2.9	(2.5)	(2.0)	(1.0)	(0.3)	(0.1)	0.9
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	17.0	32.7	35.6	35.5	35.6	26.0	8.9	20.7
	nie im Leben	76.1	60.8	58.3	60.5	61.6	72.8	90.8	77.0
	N (gewichtet)	1'252	1'482	1'573	1'665	1'581	4'135	8'966	20'653
	N (ungewichtet)	1'507	1'394	1'144	-	1'549	4'156	9'721	20'858
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	(2.2)	5.4	4.2	2.4	(0.8)	1.0	(0.2)	1.4
	1 bis 3 mal im Monat	(2.2)	(2.5)	(2.5)	(1.3)	(0.8)	(0.5)	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	20.0	31.9	33.0	31.3	27.0	22.0	6.2	18.0
	nie im Leben	75.6	60.2	60.3	65.0	71.4	76.4	93.5	79.7
	N (gewichtet)	1'509	1'164	1'286	1'402	1'615	3'406	7'161	17'543
	N (ungewichtet)	925	788	1'055	-	-	3'387	8'640	17'893
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	7.0	7.0	3.6	2.3	1.6	0.9	(0.1)	1.8
	1 bis 3 mal im Monat	(2.1)	(3.5)	(1.2)	(1.2)	(0.8)	(0.5)	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	-	29.3	25.2	25.1	21.7	17.7	2.5	13.8
	nie im Leben	74.6	60.3	70.0	71.4	75.9	80.8	97.3	83.6
	N (gewichtet)	1'578	1'033	1'254	1'929	1'946	3'376	7'520	18'637
	N (ungewichtet)	884	724	1'090	1'818	2'208	3'394	8'766	18'884
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	5.9	6.4	2.4	(1.4)	(1.0)	-	-	1.4
	1 bis 3 mal im Monat	(3.3)	(3.6)	(1.1)	(0.7)	(0.6)	-	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	17.1	25.4	25.2	23.2	20.6	12.4	1.3	12.4
	nie im Leben	73.6	64.6	71.3	74.7	77.8	87.1	98.7	85.5
	N (gewichtet)	854	909	1'084	1'362	1'304	2'215	4'946	12'674
	N (ungewichtet)	571	822	1'238	1'588	1'411	2'025	5'103	12'758
1992	1 mal wöchentlich oder mehr	(3.3)	3.7	1.7	(1.3)	-			
	1 bis 3 mal im Monat	(2.6)	(2.0)	(1.1)	(0.8)	-			
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	9.0	16.6	16.9	15.0	10.1			
	nie im Leben	85.2	77.8	80.3	82.8	89.0			
	N (gewichtet)	1'017	1'139	1'556	1'498	1'365			
	N (ungewichtet)	650	1'056	1'749	1'681	1'476			

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'

1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.

Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter Männer, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt %
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	5.8	4.8	5.9	(3.0)	(2.9)	1.4	(0.3)	2.1
	1 bis 3 mal im Monat	4.5	(4.0)	(3.5)	(2.7)	(1.2)	-	-	1.3
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	20.0	37.9	37.0	40.9	43.5	31.8	12.0	25.5
	nie im Leben	69.7	53.2	53.6	53.4	52.3	66.5	87.5	71.1
	N (gewichtet)	638	754	830	827	838	2'032	4'183	10'102
	N (ungewichtet)	771	703	545	660	760	1'942	4'518	9'899
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	(3.8)	7.8	7.6	(4.2)	(1.3)	1.7	(0.4)	2.4
	1 bis 3 mal im Monat	(2.9)	(3.6)	(4.1)	(1.9)	(1.0)	(0.6)	-	1.2
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	24.6	36.4	38.5	37.8	32.3	25.2	7.8	21.8
	nie im Leben	68.7	52.2	49.8	56.0	65.4	72.5	91.8	74.6
	N (gewichtet)	777	595	633	685	802	1'688	3'327	8'507
	N (ungewichtet)	483	381	462	607	794	1'609	3'586	7'922
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	9.1	11.2	6.0	4.0	2.2	1.5	-	2.9
	1 bis 3 mal im Monat	2.7	5.8	1.6	1.7	1.0	0.9	-	1.2
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	18.7	29.9	31.3	31.6	25.7	22.2	3.1	17.3
	nie im Leben	69.5	53.0	61.1	62.7	71.1	75.4	96.6	78.6
	N (gewichtet)	814	510	602	947	998	1'696	3'272	8'839
	N (ungewichtet)	457	348	472	819	1'080	1'622	3'560	8'358
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	(8.2)	9.3	(4.2)	(2.1)	(1.9)	-	-	2.2
	1 bis 3 mal im Monat	(3.7)	(5.4)	(1.3)	0.8	-	-	-	1.0
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	19.1	28.6	32.9	28.2	26.5	17.3	1.8	16.3
	nie im Leben	69.0	56.8	61.7	68.9	70.9	81.8	98.2	80.5
	N (gewichtet)	436	452	533	679	663	1'122	2'192	6'076
	N (ungewichtet)	291	384	582	747	645	960	2'019	5'628
1992	1 mal wöchentlich oder mehr	(4.5)	5.8	(2.9)	(2.1)	-			
	1 bis 3 mal im Monat	-	(3.1)	(1.3)	(1.5)	-			
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	12.5	22.5	21.2	18.5	13.7			
	nie im Leben	80.3	68.7	74.6	77.9	84.9			
	N (gewichtet)	501	579	770	689	672			
	N (ungewichtet)	324	479	823	757	709			

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'

1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.

Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter Frauen, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	-	(2.3)	-	-	-	-	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	(1.7)	(1.8)	-	(1.3)	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	13.9	27.3	34.0	30.2	26.7	20.4	6.1	16.2
	nie im Leben	82.8	68.6	63.5	67.6	72.1	78.9	93.8	82.7
	N (gewichtet)	614	728	743	838	742	2'103	4'783	10'551
	N (ungewichtet)	736	691	599	727	789	2'214	5'203	10'959
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	-	(2.9)	-	-	-	-	-	0.5
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	15.1	27.2	27.7	25.0	21.7	19.0	4.8	14.5
	nie im Leben	82.9	68.6	70.5	73.6	77.3	80.3	95.1	84.5
	N (gewichtet)	731	569	653	717	813	1'718	3'835	9'036
	N (ungewichtet)	442	407	593	724	973	1'778	5'054	9'971
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	(4.6)	(2.8)	-	-	(1.0)	(0.4)	-	0.8
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	13.7	28.8	19.6	18.9	17.5	13.1	2.1	10.6
	nie im Leben	80.1	67.3	78.3	79.7	80.9	86.3	97.8	88.1
	N (gewichtet)	764	524	652	982	948	1'680	4'248	9'798
	N (ungewichtet)	427	376	618	999	1'128	1'772	5'206	10'526
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	(3.6)	(3.5)	-	-	-	-	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	(0.7)	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	15.1	22.4	17.8	18.3	14.4	7.4	0.8	8.9
	nie im Leben	78.4	72.3	80.6	80.4	84.9	92.5	99.1	90.0
	N (gewichtet)	418	457	552	683	641	1'093	2'754	6'598
	N (ungewichtet)	280	438	656	841	766	1'065	3'084	7'130
1992	1 mal wöchentlich oder mehr	-	(1.5)	-	-	-	-	-	
	1 bis 3 mal im Monat	(2.4)	-	-	-	-	-	-	
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	(5.6)	10.5	12.7	12.0	6.6			
	nie im Leben	89.9	87.2	85.8	87.1	93.1			
	N (gewichtet)	516	559	786	808	694			
	N (ungewichtet)	326	577	926	924	767			

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'

1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.

Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.

Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012*

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	1.2	1.8	-	1.3
	1 bis 3 mal im Monat	0.9	1.0	-	0.9
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	20.3	22.7	16.9	20.7
	nie im Leben	77.6	74.4	82.1	77.0
	N (gewichtet)	14'750	4'977	927	20'653
	N (ungewichtet)	13824	5501	1533	20858
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	1.3	1.7	(0.9)	1.4
	1 bis 3 mal im Monat	0.8	1.2	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	18.0	19.8	10.0	18.0
	nie im Leben	79.9	77.3	88.8	79.7
	N (gewichtet)	12'662	4'084	797	17'543
	N (ungewichtet)	11'015	5'420	1'458	17'893
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	1.8	2.4	-	1.8
	1 bis 3 mal im Monat	0.8	(0.7)	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	13.5	16.0	7.7	13.8
	nie im Leben	84.0	80.9	91.7	83.6
	N (gewichtet)	13'446	4'355	835	18'637
	N (ungewichtet)	12'689	4'745	1'450	18'884
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	1.5	1.3	-	1.4
	1 bis 3 mal im Monat	0.8	0.7	-	0.8
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	12.6	12.8	7.8	12.4
	nie im Leben	85.1	85.3	91.4	85.5
	N (gewichtet)	9'024	3'037	613	12'674
	N (ungewichtet)	8'076	3'563	1'119	12'758

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'
 1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
 Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozenten werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Männer, Vergleich 1992-2012**

Cannabis		Deutsch %	Sprachregion Französisch %	Italienisch %	Gesamt %
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	1.9	2.9	-	2.1
	1 bis 3 mal im Monat	1.3	1.5	-	1.3
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	25.0	27.9	19.9	25.5
	nie im Leben	71.7	67.7	78.6	71.1
	N (gewichtet)	7'333	2'340	430	10'102
	N (ungewichtet)	6'653	2'541	705	9'899
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	2.3	3.0	-	2.4
	1 bis 3 mal im Monat	1.2	1.5	-	1.2
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	21.5	24.4	13.2	21.8
	nie im Leben	75.1	71.1	84.7	74.6
	N (gewichtet)	6'168	1'971	369	8'507
	N (ungewichtet)	4'933	2'377	612	7'922
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	2.8	4.0	-	2.9
	1 bis 3 mal im Monat	1.3	-	-	1.2
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	16.4	21.5	10.1	17.3
	nie im Leben	79.5	73.6	88.8	78.6
	N (gewichtet)	6'488	1'977	374	8'839
	N (ungewichtet)	5'752	1'995	611	8'358
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	2.3	2.0	-	2.2
	1 bis 3 mal im Monat	1.0	(1.1)	-	1.0
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	16.1	18.2	9.1	16.3
	nie im Leben	80.6	78.6	89.3	80.5
	N (gewichtet)	4'390	1'413	273	6'076
	N (ungewichtet)	3'644	1'520	464	5'628

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'
 1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
 Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion Frauen, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	1 mal wöchentlich oder mehr	0.5	(0.9)	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	0.5	(0.6)	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	15.6	18.1	14.4	16.2
	nie im Leben	83.3	80.4	85.1	82.7
	N (gewichtet)	7'416	2'637	497	10'551
	N (ungewichtet)	7'171	2'960	828	10'959
2007	1 mal wöchentlich oder mehr	(0.5)	(0.5)	-	0.5
	1 bis 3 mal im Monat	(0.4)	(0.8)	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	14.7	15.6	7.2	14.5
	nie im Leben	84.5	83.1	92.3	84.5
	N (gewichtet)	6'494	2'113	428	9'036
	N (ungewichtet)	6'082	3'043	846	9'971
2002	1 mal wöchentlich oder mehr	0.8	(1.1)	-	0.8
	1 bis 3 mal im Monat	(0.4)	(0.5)	-	0.4
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	10.7	11.4	5.8	10.6
	nie im Leben	88.1	87.0	94.0	88.1
	N (gewichtet)	6'958	2'378	462	9'798
	N (ungewichtet)	6'937	2'750	839	10'526
1997	1 mal wöchentlich oder mehr	0.7	(0.6)	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	(0.6)	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	9.3	8.0	6.8	8.9
	nie im Leben	89.4	91.1	93.0	90.0
	N (gewichtet)	4'634	1'624	340	6'598
	N (ungewichtet)	4'432	2'043	655	7'130

Fragen: 2012: 'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'
 1992-2007: 'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?' und 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
 Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
 Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	5.1	1.1	2.6
	nein	94.9	98.9	97.4
	N (gewichtet)	7'852	13'703	21'555
	N (ungewichtet)	7'209	14'352	21'561
2007	ja	3.6	0.6	1.8
	nein	96.4	99.4	98.2
	N (gewichtet)	7'427	11'251	18'678
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698
2002	ja	2.2	0.4	1.1
	nein	97.8	99.6	98.9
	N (gewichtet)	8'142	11'536	19'678
	N (ungewichtet)	6'988	12'693	19'681
1997	ja	2.2	-	1.0
	nein	97.8	99.9	99.0
	N (gewichtet)	5'611	7'378	12'989
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985

Frage: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	6.0	1.6	3.3
	nein	94.0	98.4	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'014	6'532	10'546
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'536	6'719	10'255
2007	ja	5.0	0.8	2.5
	nein	95.0	99.2	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'868	5'518	8'386
2002	ja	2.9	(0.5)	1.5
	nein	97.1	99.5	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'334	5'554	8'888
1997	ja	2.8	-	1.3
	nein	97.2	99.9	98.7
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'434	6'244
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'680	3'069	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	4.2	0.7	1.9
	nein	95.8	99.3	98.1
	N (gewichtet)	3'838	7'171	11'009
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	ja	2.3	0.5	1.2
	nein	97.7	99.5	98.8
	N (gewichtet)	3'703	5'861	9'564
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	ja	1.5	(0.2)	0.7
	nein	98.5	99.8	99.3
	N (gewichtet)	4'036	6'135	10'171
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	ja	1.5	-	0.7
	nein	98.5	100.0	99.3
	N (gewichtet)	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Frage: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Ecstasy		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	2.5	3.0	2.0	2.6
	nein	97.5	97.0	98.0	97.4
	N (gewichtet)	15'373	5'214	968	21'555
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	ja	1.7	2.3	(0.6)	1.8
	nein	98.3	97.7	99.4	98.2
	N (gewichtet)	13'433	4'393	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698
2002	ja	1.1	1.4	-	1.1
	nein	98.9	98.6	99.5	98.9
	N (gewichtet)	14'209	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'202	4'929	1'550	19'681
1997	ja	1.0	1.0	(1.3)	1.0
	nein	99.0	99.0	98.7	99.0
	N (gewichtet)	9'285	3'082	622	12'989
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Ecstasy		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	3.1	3.6	(3.3)	3.3
	nein	96.9	96.4	96.7	96.7
	<i>N (gewichtet)</i>	7'633	2'463	450	10'546
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'872	2'646	737	10'255
2007	ja	2.3	3.5	-	2.5
	nein	97.7	96.5	99.0	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'175	2'550	661	8'386
2002	ja	1.4	2.2	-	1.5
	nein	98.6	97.8	99.5	98.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'975	2'109	423	9'506
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'095	2'115	678	8'888
1997	ja	1.3	(1.4)	-	1.3
	nein	98.7	98.6	98.8	98.7
	<i>N (gewichtet)</i>	4'527	1'440	277	6'244
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'734	1'546	469	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Ecstasy		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	1.8	2.3	(0.8)	1.9
	nein	98.2	97.7	99.2	98.1
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	ja	1.2	1.2	-	1.2
	nein	98.8	98.8	99.7	98.8
	N (gewichtet)	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	ja	0.7	(0.8)	-	0.7
	nein	99.3	99.2	99.5	99.3
	N (gewichtet)	7'234	2'453	484	10'171
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	ja	(0.6)	(0.6)	-	0.7
	nein	99.4	99.4	98.7	99.3
	N (gewichtet)	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	1.1	-	0.4
	ehemaliger Gebrauch	4.0	1.1	2.1
	nie	94.9	98.9	97.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'852	13'703	21'555
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'209	14'352	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.

Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	1.2	-	0.5
	ehemaliger Gebrauch	4.8	1.5	2.7
	nie	94.0	98.4	96.7
	N (gewichtet)	4'014	6'532	10'546
	N (ungewichtet)	3'536	6'719	10'255

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
 Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(1.0)	-	(0.4)
	ehemaliger Gebrauch	3.2	0.7	1.5
	nie	95.8	99.3	98.1
	N (gewichtet)	3'838	7'171	11'009
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
 Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Ecstasy		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französich %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.5	(0.4)	-	0.4
	ehemaliger Gebrauch	2.0	2.5	(1.9)	2.1
	nie	97.5	97.0	98.0	97.4
	N (gewichtet)	15'373	5'214	968	21'555
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.

Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Ecstasy		Deutsch	Sprachregion	Gesamt
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.6	(0.4)	-
	ehemaliger Gebrauch	2.5	3.2	(3.3)
	nie	96.9	96.4	96.7
	N (gewichtet)	7'633	2'463	450
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737
				10'546

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
 Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Ecstasy		Deutsch	Sprachregion	Gesamt
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.3)	(0.4)	-
	ehemaliger Gebrauch	1.5	1.9	(0.7)
	nie	98.2	97.7	99.2
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857
				11'009

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
 Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	5.4	2.2	3.4
	nein	94.6	97.8	96.6
	N (gewichtet)	7'850	13'703	21'553
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561
2007	ja	4.4	1.7	2.8
	nein	95.6	98.3	97.2
	N (gewichtet)	7'428	11'251	18'678
	N (ungewichtet)	6'138	12'560	18'698
2002	ja	2.9	0.9	1.7
	nein	97.1	99.1	98.3
	N (gewichtet)	8'141	11'536	19'676
	N (ungewichtet)	6'987	12'693	19'680
1997	ja	3.3	(0.3)	1.6
	nein	96.7	99.7	98.4
	N (gewichtet)	5'611	7'378	12'989
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985
1992	ja	2.7		
	nein	97.3		
	N (gewichtet)	6'868		
	N (ungewichtet)	6'837		

Frage: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012**

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
2012	ja	6.8	3.2	4.6
	nein	93.2	96.8	95.4
	<i>N (gewichtet)</i>	4'012	6'532	10'545
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'535	6'720	10'255
2007	ja	6.1	2.2	3.8
	nein	93.9	97.8	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'390	9'114
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'868	5'518	8'386
2002	ja	4.0	1.3	2.5
	nein	96.0	98.7	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	4'104	5'400	9'505
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'333	5'554	8'887
1997	ja	4.3	(0.5)	2.2
	nein	95.7	99.5	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'434	6'244
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'680	3'069	5'749
1992	ja	3.5		
	nein	96.5		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'389		
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'228		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012**

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	3.9	1.3	2.2
	nein	96.1	98.7	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	3'838	7'171	11'009
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'673	7'633	11'306
2007	ja	2.7	1.2	1.8
	nein	97.3	98.8	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'704	5'860	9'564
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'270	7'042	10'312
2002	ja	1.9	0.5	1.1
	nein	98.1	99.5	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	4'036	6'135	10'171
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'654	7'139	10'793
1997	ja	2.2	(0.2)	1.0
	nein	97.8	99.8	99.0
	<i>N (gewichtet)</i>	2'801	3'944	6'745
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'019	4'217	7'236
1992	ja	1.8		
	nein	98.2		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'479		
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'609		

Frage: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012**

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	3.3	3.6	2.8	3.4
	nein	96.7	96.4	97.2	96.6
	<i>N (gewichtet)</i>	15'371	5'214	968	21'553
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	ja	2.4	4.0	2.0	2.8
	nein	97.6	96.0	98.0	97.2
	<i>N (gewichtet)</i>	13'433	4'394	852	18'678
	<i>N (ungewichtet)</i>	11'445	5'715	1'538	18'698
2002	ja	1.5	2.6	(1.2)	1.7
	nein	98.5	97.4	98.8	98.3
	<i>N (gewichtet)</i>	14'209	4'560	907	19'676
	<i>N (ungewichtet)</i>	13'202	4'928	1'550	19'680
1997	ja	1.5	1.9	(1.8)	1.6
	nein	98.5	98.1	98.2	98.4
	<i>N (gewichtet)</i>	9'285	3'082	622	12'989
	<i>N (ungewichtet)</i>	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Kokain		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	4.5	4.9	(3.9)	4.6
	nein	95.5	95.1	96.1	95.4
	<i>N (gewichtet)</i>	7'632	2'463	450	10'545
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'872	2'646	737	10'255
2007	ja	3.2	5.7	(3.0)	3.8
	nein	96.8	94.3	97.0	96.2
	<i>N (gewichtet)</i>	6'564	2'149	401	9'114
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'175	2'550	661	8'386
2002	ja	2.1	3.8	(1.5)	2.5
	nein	97.9	96.2	98.5	97.5
	<i>N (gewichtet)</i>	6'975	2'108	423	9'505
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'095	2'114	678	8'887
1997	ja	2.0	2.8	(2.4)	2.2
	nein	98.0	97.2	97.6	97.8
	<i>N (gewichtet)</i>	4'527	1'440	277	6'244
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'734	1'546	469	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012**

Kokain		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	2.2	2.5	(1.8)	2.2
	nein	97.8	97.5	98.2	97.8
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	ja	1.6	2.4	(1.0)	1.8
	nein	98.4	97.6	99.0	98.2
	N (gewichtet)	6'869	2'245	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'270	3'165	877	10'312
2002	ja	0.9	1.6	(0.9)	1.1
	nein	99.1	98.4	99.1	98.9
	N (gewichtet)	7'234	2'453	484	10'171
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	ja	1.0	(1.0)	-	1.0
	nein	99.0	99.0	98.6	99.0
	N (gewichtet)	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012**

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	1.3	(0.1)	0.5
	ehemaliger Gebrauch	4.1	2.1	2.9
	nie	94.6	97.8	96.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'850	13'703	21'553
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'208	14'353	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	1.7	(0.2)	0.7
	ehemaliger Gebrauch	5.2	3.0	3.8
	nie	93.2	96.8	95.4
	N (gewichtet)	4'012	6'532	10'545
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.8)	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	3.0	1.3	1.9
	nie	96.1	98.7	97.8
	N (gewichtet)	3'838	7'171	11'009
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.5	(0.5)	-	0.5
	ehemaliger Gebrauch	2.8	3.1	2.6	2.9
	nie	96.7	96.4	97.2	96.6
	<i>N (gewichtet)</i>	15'371	5'214	968	21'553
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Kokain		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.8	(0.7)	-	0.7
	ehemaliger Gebrauch	3.7	4.3	(3.7)	3.8
	nie	95.5	95.1	96.1	95.4
	N (gewichtet)	7'632	2'463	450	10'545
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Kokain		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
			Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.3)	(0.4)	-	(0.3)
	ehemaliger Gebrauch	1.9	2.0	(1.6)	1.9
	nie	97.8	97.5	98.2	97.8
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	0.7	0.8	0.8
	nein	99.3	99.2	99.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'850	13'703	21'553
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'208	14'353	21'561
2007	ja	0.9	0.6	0.7
	nein	99.1	99.4	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	7'428	11'255	18'683
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'138	12'562	18'700
2002	ja	0.9	0.3	0.6
	nein	99.1	99.7	99.4
	<i>N (gewichtet)</i>	8'142	11'536	19'678
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'988	12'694	19'682
1997	ja	1.0	(0.1)	0.5
	nein	99.0	99.9	99.5
	<i>N (gewichtet)</i>	5'611	7'378	12'989
	<i>N (ungewichtet)</i>	5'699	7'286	12'985
1992	ja	1.3		
	nein	98.7		
	<i>N (gewichtet)</i>	6'869		
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'838		

Frage: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

Heroin		Altersgruppen		Gesamt %
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	1.1	1.1	1.1
	nein	98.9	98.9	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	4'012	6'532	10'545
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'535	6'720	10'255
2007	ja	1.4	0.8	1.1
	nein	98.6	99.2	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	3'724	5'394	9'118
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'868	5'519	8'387
2002	ja	1.3	0.5	0.9
	nein	98.7	99.5	99.1
	<i>N (gewichtet)</i>	4'106	5'400	9'506
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'334	5'554	8'888
1997	ja	1.4	-	0.7
	nein	98.6	99.9	99.3
	<i>N (gewichtet)</i>	2'810	3'434	6'244
	<i>N (ungewichtet)</i>	2'680	3'069	5'749
1992	ja	1.9		
	nein	98.1		
	<i>N (gewichtet)</i>	3'390		
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'229		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012*

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	(0.3)	0.5	0.4
	nein	99.7	99.5	99.6
	N (gewichtet)	3'838	7'171	11'009
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	ja	(0.5)	(0.3)	0.4
	nein	99.5	99.7	99.6
	N (gewichtet)	3'704	5'861	9'565
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313
2002	ja	(0.5)	(0.2)	0.3
	nein	99.5	99.8	99.7
	N (gewichtet)	4'036	6'136	10'172
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	ja	(0.7)	-	(0.3)
	nein	99.3	99.9	99.7
	N (gewichtet)	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	ja	(0.7)		
	nein	99.3		
	N (gewichtet)	3'479		
	N (ungewichtet)	3'609		

Frage: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französich %	Italienisch %	
2012	ja	0.7	1.0	(0.9)	0.8
	nein	99.3	99.0	99.1	99.2
	N (gewichtet)	15'371	5'214	968	21'553
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	ja	0.6	1.2	-	0.7
	nein	99.4	98.8	99.7	99.3
	N (gewichtet)	13'437	4'394	852	18'683
	N (ungewichtet)	11'447	5'715	1'538	18'700
2002	ja	0.5	0.7	-	0.6
	nein	99.5	99.3	99.6	99.4
	N (gewichtet)	14'210	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	ja	0.4	0.7	-	0.5
	nein	99.6	99.3	99.5	99.5
	N (gewichtet)	9'285	3'082	622	12'989
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französich %	Italienisch %	
2012	ja	0.9	1.7	-	1.1
	nein	99.1	98.3	99.0	98.9
	N (gewichtet)	7'632	2'463	450	10'545
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	ja	0.9	1.6	-	1.1
	nein	99.1	98.4	99.3	98.9
	N (gewichtet)	6'568	2'149	401	9'118
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387
2002	ja	0.8	(1.1)	-	0.9
	nein	99.2	98.9	99.5	99.1
	N (gewichtet)	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	ja	(0.5)	(1.2)	-	0.7
	nein	99.5	98.8	99.0	99.3
	N (gewichtet)	4'527	1'440	277	6'244
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Frage: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welche die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	0.4	(0.5)	-	0.4
	nein	99.6	99.5	99.2	99.6
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	ja	(0.3)	(0.7)	-	0.4
	nein	99.7	99.3	100.0	99.6
	N (gewichtet)	6'869	2'245	451	9'565
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313
2002	ja	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	nein	99.7	99.6	99.8	99.7
	N (gewichtet)	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	ja	(0.3)	(0.3)	-	(0.3)
	nein	99.7	99.7	99.8	99.7
	N (gewichtet)	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.

Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012**

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	-	-	(0.0)
	ehemaliger Gebrauch	0.7	0.8	0.7
	nie	99.3	99.2	99.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'850	13'703	21'553
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'208	14'353	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Heroin	Altersgruppen		Gesamt
	15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(1.0)	1.0
	nie	98.9	98.9
	<i>N (gewichtet)</i>	4'012	6'532
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'535	6'720
			10'545
			10'255

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Heroin	Altersgruppen		Gesamt
	15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.3)	0.5
	nie	99.7	99.5
	<i>N (gewichtet)</i>	3'838	7'171
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'673	7'633
			11'009
			11'306

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Heroin		Deutsch %	Sprachregion		Gesamt %
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten		Französich %	Italienisch %	
	ehemaliger Gebrauch	0.6	1.0	(0.8)	0.7
	nie	99.3	99.0	99.1	99.2
	N (gewichtet)	15'371	5'214	968	21'553
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	0.9	1.5	-	1.0
	nie	99.1	98.3	99.0	98.9
	N (gewichtet)	7'632	2'463	450	10'545
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	-	-	-	-
	ehemaliger Gebrauch	(0.4)	(0.5)	-	0.4
	nie	99.6	99.5	99.2	99.6
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Fragen: 'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?' und 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	5.3	1.8	3.1
	nein	94.7	98.2	96.9
	N (gewichtet)	7'850	13'704	21'554
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561
2007	ja	2.9	1.6	2.1
	nein	97.1	98.4	97.9
	N (gewichtet)	7'427	11'251	18'678
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698
2002	ja	2.4	1.1	1.6
	nein	97.6	98.9	98.4
	N (gewichtet)	8'142	11'536	19'678
	N (ungewichtet)	6'988	12'694	19'682
1997	ja	2.9	0.5	1.6
	nein	97.1	99.5	98.4
	N (gewichtet)	5'611	7'378	12'989
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
 Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt..
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt..
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	7.1	2.8	4.4
	nein	92.9	97.2	95.6
	N (gewichtet)	4'012	6'533	10'546
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255
2007	ja	4.1	2.2	3.0
	nein	95.9	97.8	97.0
	N (gewichtet)	3'724	5'390	9'114
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	ja	3.4	1.6	2.4
	nein	96.6	98.4	97.6
	N (gewichtet)	4'106	5'400	9'506
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	ja	4.0	(0.8)	2.2
	nein	96.0	99.2	97.8
	N (gewichtet)	2'810	3'434	6'244
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
 Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
 Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	ja	3.4	0.9	1.8
	nein	96.6	99.1	98.2
	N (gewichtet)	3'838	7'171	11'009
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	ja	1.7	1.0	1.3
	nein	98.3	99.0	98.7
	N (gewichtet)	3'703	5'861	9'564
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	ja	1.4	0.6	0.9
	nein	98.6	99.4	99.1
	N (gewichtet)	4'036	6'136	10'172
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	ja	1.9	(0.3)	1.0
	nein	98.1	99.7	99.0
	N (gewichtet)	2'801	3'944	6'745
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Deutsch %	Sprachregion Französich %	Italienisch %	Gesamt %
2012	ja	3.2	3.0	2.0	3.1
	nein	96.8	97.0	98.0	96.9
	N (gewichtet)	15'372	5'214	968	21'554
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	ja	2.1	2.3	(0.7)	2.1
	nein	97.9	97.7	99.3	97.9
	N (gewichtet)	13'433	4'393	852	18'678
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698
2002	ja	1.6	1.8	(0.7)	1.6
	nein	98.4	98.2	99.3	98.4
	N (gewichtet)	14'210	4'562	907	19'678
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	ja	1.6	1.6	(1.7)	1.6
	nein	98.4	98.4	98.3	98.4
	N (gewichtet)	9'285	3'082	622	12'989
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012*

andere illegale Drogen		Deutsch	Sprachregion		Gesamt
		%	Französisch	Italienisch	%
2012	ja	4.5	4.4	(2.8)	4.4
	nein	95.5	95.6	97.2	95.6
	N (gewichtet)	7'633	2'463	450	10'546
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	ja	3.0	3.4	-	3.0
	nein	97.0	96.6	99.0	97.0
	N (gewichtet)	6'564	2'149	401	9'114
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	ja	2.3	2.8	-	2.4
	nein	97.7	97.2	99.2	97.6
	N (gewichtet)	6'975	2'109	423	9'506
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	ja	2.2	2.2	(2.1)	2.2
	nein	97.8	97.8	97.9	97.8
	N (gewichtet)	4'527	1'440	277	6'244
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	ja	1.8	1.8	(1.3)	1.8
	nein	98.2	98.2	98.7	98.2
	N (gewichtet)	7'740	2'751	518	11'009
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	ja	1.3	1.3	-	1.3
	nein	98.7	98.7	99.7	98.7
	N (gewichtet)	6'869	2'244	451	9'564
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	ja	1.0	(0.9)	-	0.9
	nein	99.0	99.1	99.4	99.1
	N (gewichtet)	7'235	2'453	484	10'172
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	ja	0.9	(1.0)	-	1.0
	nein	99.1	99.0	98.6	99.0
	N (gewichtet)	4'758	1'642	345	6'745
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: 2012: 'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'
 2007: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen)?'
 1997, 2002: 'Haben Sie schon Methadon genommen?' und 'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?' und 'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Mescalin oder Psilocybin genommen?' und 'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt. Spaltenprozente. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.9	-	0.4
	ehemaliger Gebrauch	4.4	1.8	2.7
	nie	94.7	98.2	96.9
	<i>N (gewichtet)</i>	7'850	13'704	21'554
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'208	14'353	21'561

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	1.2	-	0.5
	ehemaliger Gebrauch	6.0	2.7	3.9
	nie	92.9	97.2	95.6
	<i>N (gewichtet)</i>	4'012	6'533	10'546
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'535	6'720	10'255

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39 %	40+ %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.6)	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	2.8	0.9	1.6
	nie	96.6	99.1	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	3'838	7'171	11'009
	<i>N (ungewichtet)</i>	3'673	7'633	11'306

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.4	(0.3)	-	0.4
	ehemaliger Gebrauch	2.8	2.7	1.8	2.7
	nie	96.8	97.0	98.0	96.9
	<i>N (gewichtet)</i>	15'372	5'214	968	21'554
	<i>N (ungewichtet)</i>	14'269	5'698	1'594	21'561

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	0.5	(0.5)	-	0.5
	ehemaliger Gebrauch	4.0	3.9	(2.6)	3.9
	nie	95.5	95.6	97.2	95.6
	<i>N (gewichtet)</i>	7'633	2'463	450	10'546
	<i>N (ungewichtet)</i>	6'872	2'646	737	10'255

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

*Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012*

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	
2012	Gebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.2)	-	-	(0.2)
	ehemaliger Gebrauch	1.6	1.7	(1.1)	1.6
	nie	98.2	98.2	98.7	98.2
	<i>N (gewichtet)</i>	7'740	2'751	518	11'009
	<i>N (ungewichtet)</i>	7'397	3'052	857	11'306

Frage: 'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
 Spaltenprozente.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

5 Multipler Substanzgebrauch

Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums

Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

Risikoklassen des Alkoholkonsums		Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %	hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %	hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %
2012	tägliches Rauchen	37.2	22.2	21.1	40.6	24.9	24.2	32.8	19.3	19.5
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	5.2	1.2	(0.7)	6.4	1.9	(1.4)	(3.7)	0.5	(0.4)
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	6.7	3.5	9.1	(2.7)	2.7	4.8	11.8	4.4	11.4
	N (gewichtet)	990	16'357	3'230	559	8'420	1'095	431	7'937	2'135
	N (ungewichtet)	1'067	16'538	3'181	581	8'303	987	486	8'235	2'194
2007	tägliches Rauchen	35.8	22.3	18.0	39.8	24.8	23.5	31.1	19.6	15.6
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	3.8	1.4	(0.5)	(5.8)	2.3	-	-	0.5	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	6.6	3.5	8.1	(4.4)	2.5	5.9	9.3	4.6	9.1
	N (gewichtet)	898	13'909	2'675	485	7'161	831	414	6'748	1'843
	N (ungewichtet)	988	14'031	2'802	507	6'654	730	481	7'377	2'072

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

Risikoklassen des Alkoholkonsums		Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %	hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %	hohes oder mittleres Risiko %	geringes Risiko %	abstinent %
2002	tägliches Rauchen	40.1	26.9	20.5	42.2	30.1	25.3	36.7	23.4	18.5
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	3.7	2.0	0.8	(4.9)	2.9	(2.3)	-	1.1	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	5.0	2.7	7.9	4.0	2.0	5.4	6.7	3.5	9.0
	N (gewichtet)	1'055	13'454	4'011	652	6'960	1'182	403	6'494	2'829
	N (ungewichtet)	1'142	13'563	4'078	667	6'622	1'028	475	6'941	3'050
1997	tägliches Rauchen	47.9	29.1	21.7	51.1	32.6	28.2	42.8	25.4	19.3
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	(2.2)	1.5	(0.5)	(3.0)	2.2	-	-	0.7	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	5.3	3.7	8.5	(3.4)	2.5	(4.7)	8.5	5.1	10.0
	N (gewichtet)	742	9'618	2'280	457	4'971	632	285	4'647	1'648
	N (ungewichtet)	785	9'619	2'321	457	4'593	562	328	5'026	1'759

Fragen: Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:

hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)

tägliches Rauchen (siehe S. 26)

mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. 243)

tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.

Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Rauchstatus	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %
2012	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	7.9	6.6	3.7	8.8	7.9	4.1	6.8	(4.7)	3.4
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	4.8	(1.7)	0.2	6.7	(2.5)	(0.3)	2.5	-	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	5.6	(1.4)	4.4	3.6	-	2.8	8.1	(2.1)	5.8
	N (gewichtet)	4'673	1'130	14'774	2'587	663	6'823	2'087	466	7'950
	N (ungewichtet)	4'622	1'111	15'053	2'437	634	6'800	2'185	477	8'253
2007	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	8.3	7.1	4.0	8.9	6.7	4.4	7.4	7.6	3.7
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	4.7	(3.2)	(0.3)	6.9	(4.7)	(0.5)	1.9	-	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	4.6	(1.5)	4.5	3.6	(1.3)	2.8	5.8	(1.8)	5.9
	N (gewichtet)	3'900	954	12'627	2'164	561	5'752	1'737	393	6'875
	N (ungewichtet)	3'921	923	12'977	1'972	525	5'394	1'949	398	7'583

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Rauchstatus	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %
2002	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	8.7	4.9	4.6	10.3	6.0	6.2	6.7	(3.1)	3.4
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	5.8	(3.5)	0.3	7.9	(4.5)	(0.5)	3.2	-	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	4.0	(1.4)	4.1	2.6	-	2.8	5.7	-	5.2
	N (gewichtet)	4'862	725	12'934	2'667	461	5'666	2'195	264	7'267
	N (ungewichtet)	4'938	711	13'134	2'465	431	5'421	2'473	280	7'713
1997	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	9.7	(4.0)	4.3	11.5	(5.1)	5.6	7.5	-	3.3
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	3.9	-	(0.2)	5.2	-	(0.4)	2.3	-	-
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	4.5	-	5.1	3.6	-	2.6	5.6	-	7.0
	N (gewichtet)	3'654	553	8'434	2'033	337	3'690	1'621	216	4'744
	N (ungewichtet)	3'744	533	8'448	1'923	305	3'384	1'821	228	5'064

Fragen: Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:

häufiges Rauchen (siehe S. 26)

hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)

mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. 243)

tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.

Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs

Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Häufigkeit Cannabisgebrauch	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %
2012	hohes oder mittleres Alkohol- risikokonsum	18.9	(12.7)	4.5	16.8	(14.1)	5.2	(26.2)	-	3.9
	tägliches Rauchen	81.9	64.1	21.5	81.2	62.7	23.9	(84.0)	(67.2)	19.2
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	(3.6)	-	4.5	(4.2)	-	2.9	-	-	6.1
	N (gewichtet)	274	191	20'111	213	135	9'726	61	57	10'385
	N (ungewichtet)	266	189	20'331	207	133	9'531	59	56	10'800
2007	hohes oder mittleres Alkohol- risikokonsum	13.9	(12.8)	4.9	(13.8)	(10.4)	5.5	-	(18.4)	4.5
	tägliches Rauchen	74.1	68.6	21.2	73.2	67.3	23.8	78.7	(71.5)	18.8
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	-	-	4.4	-	-	2.9	-	-	5.7
	N (gewichtet)	246	147	17'088	205	103	8'169	41	44	8'919
	N (ungewichtet)	204	138	17'479	164	94	7'633	40	44	9'846

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs
 Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Häufigkeit Cannabisgebrauch	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch %	1 bis 3 mal im Monat %	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie %
2002	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	11.5	(14.4)	5.5	(12.2)	(10.5)	7.2	-	-	4.0
	tägliches Rauchen	82.0	65.3	24.9	80.9	61.8	28.4	85.6	(73.7)	21.8
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	-	-	4.0	-	-	2.7	-	-	5.2
	N (gewichtet)	343	144	18'033	260	102	8'432	82	42	9'602
	N (ungewichtet)	286	125	18'372	215	87	8'015	71	38	10'357
1997	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	(9.3)	(11.1)	5.8	(10.5)	-	7.5	-	-	4.3
	tägliches Rauchen	82.7	80.9	27.7	79.9	83.8	32.0	91.4	75.5	23.9
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	-	-	4.7	-	-	2.8	-	-	6.5
	N (gewichtet)	172	97	12'371	132	62	5'866	41	35	6'505
	N (ungewichtet)	163	95	12'467	121	57	5'434	42	38	7'033

Fragen: Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:

mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. 243)

hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)

tägliches Rauchen (siehe S. 26)

tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.

Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.

Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln
 Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln	Gesamtpopulation		Männer		Frauen	
		tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %
2012	hohes oder mittleres Alkohol- risikokonsum	7.1	4.7	(5.1)	5.6	8.0	3.9
	tägliches Rauchen	28.1	22.5	31.8	25.5	26.5	19.4
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	-	1.3	(3.0)	2.1	-	0.6
	N (gewichtet)	932	19'645	292	9'781	640	9'864
	N (ungewichtet)	1'029	19'757	330	9'541	699	10'216
2007	hohes oder mittleres Alkohol- risikokonsum	7.8	5.0	(8.6)	5.6	7.4	4.4
	tägliches Rauchen	23.4	22.3	31.5	25.3	19.6	19.3
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	(1.4)	1.4	-	2.4	-	0.5
	N (gewichtet)	762	16'720	246	8'231	516	8'489
	N (ungewichtet)	1'083	16'738	327	7'564	756	9'174

Fortsetzung ↓

*Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)*

	Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln	Gesamtpopulation		Männer		Frauen	
		tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %
2002	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	7.2	5.6	11.3	7.3	5.3	4.1
	tägliches Rauchen	26.4	26.2	30.7	30.3	24.5	22.5
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	(0.6)	1.9	-	3.0	-	0.9
	N (gewichtet)	738	17'782	230	8'564	508	9'218
	N (ungewichtet)	926	17'857	270	8'047	656	9'810
1997	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	6.7	5.8	(9.1)	7.5	5.7	4.2
	tägliches Rauchen	27.6	29.0	43.2	33.3	21.4	24.9
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	(1.3)	1.4	-	2.1	-	0.6
	N (gewichtet)	594	12'046	169	5'891	425	6'156
	N (ungewichtet)	669	12'056	171	5'441	498	6'615

Fragen: Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. 243)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
 Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.
 Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
 Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

**Häufigste Kombinationen multiples Substanzgebrauchs gemäss definierten Risikoschwellen
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, 2012**

		Gesamtpopulation %	Männer %	Frauen %
2012	tägliches Rauchen + hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	1.4	1.8	1.0
	tägliches Rauchen + tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schafffmitteleinnahme	1.1	0.7	1.5
	tägliches Rauchen + mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	0.7	1.1	0.3
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme + hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	0.2	-	0.3
	tägliches Rauchen + hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum + mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	0.2	(0.2)	(0.1)
	tägliches Rauchen + mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch + Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.1)	(0.2)	-
	tägliches Rauchen + Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten	(0.1)	(0.2)	-
	tägliches Rauchen + tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schafffmitteleinnahme + hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum	(0.1)	-	(0.1)
	andere Kombinationen	0.2	0.4	0.1
	tägliches Rauchen (<i>ohne Kombination</i>)	18.8	21.1	16.6
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme (<i>ohne Kombination</i>)	3.0	1.9	4.1
	hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (<i>ohne Kombination</i>)	2.8	3.2	2.4
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (<i>ohne Kombination</i>)	0.2	(0.3)	-
	Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten (<i>ohne Kombination</i>)	(0.1)	(0.1)	-
TOTAL	Gebrauch einer oder mehrerer Substanzen unterhalb der definierten Risikoschwellen	60.8	61.7	59.9
	kein Gebrauch	10.1	6.9	13.1
	N (gewichtet)	20'572	10'070	10'502
	N (ungewichtet)	20'781	9'869	10'912

Fragen: Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:

tägliches Rauchen (siehe S. 26)
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. 243)
Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten (siehe S. 266)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs. Spaltenprozente.
Kategorien, welche keine Kombinationen gemäss den definierten Risikoschwellen darstellen, werden in grauer Farbe angegeben. Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben. Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.